

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito.

Siendo la edad crítica, para manejo de la desnutrición, para evitar que se cronifique los menores de 2 años, se realizará la vigilancia y análisis más profundos en este grupo de riesgo.

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 29 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-28/ 2018	SE 29/2018	SE 01-28/ 2018	SE 29/2018	
GUAYAS	315	1	56	1	373
PICHINCHA	197		26		223
MANABI	155		57		212
ESMERALDAS	145		54		199
EL ORO	92		27		119
CHIMBORAZO	66		14		80
NAPO	41	2	20		63
SANTO DOMINGO DE LOS ..	37		20		57
SANTA ELENA	35		21		56
COTOPAXI	49	1	4		54
TUNGURAHUA	46		6		52
SUCUMBIOS	34		13		47
LOJA	37		9		46
MORONA SANTIAGO	31	1	11		43
ORELLANA	30		12		42
IMBABURA	28		12		40
CAÑAR	31		6		37
LOS RIOS	25		5		30
AZUAY	21		7		28
BOLIVAR	17		7		24
ZAMORA CHINCHIPE	8		15		23
CARCHI	13		6		19
PASTAZA	7	2			9
Total	1.460	7	408	1	1.876

Fuente: Subsistema Sive-Alerta

Elaborado: SSVE

En la SE 29 del 2018, se han notificado 1.876 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 78,19% (1.467) casos corresponden a desnutrición aguda moderada y el 21,80% (409) casos corresponden a desnutrición aguda severa, como se aprecia en el cuadro N.1 y Mapa N.1, donde se grafica la distribución de casos a nivel nacional.

MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 29/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta

Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 29/2017

Diagnostico final	Grupo edad	Masculino	Femenino	% Masculino	% Femenino
E44 Desnutrición aguda moderada	de 0 a 11 meses	326	271	22,22%	18,47%
	de 1 a 2 años	442	428	30,13%	29,18%
E44 Desnutrición aguda severa	de 0 a 11 meses	125	93	30,56%	22,74%
	de 1 a 2 años	96	95	23,47%	23,23%

En relación a los grupos etáreos:

1. Para desnutrición aguda moderada.- El grupo más afectado es el de 1 a 2 años con el 59,31% (870 casos) notificados; mostrando un impacto mayor en el sexo masculino con un 30,13% (442 casos), a la SE 29/2018.

2. Para desnutrición aguda severa.- el grupo más afectado es el de 0 a 11 meses, con el 53,30% (218 casos) donde el 30,56% (125 casos), corresponde al sexo masculino mostrando ser el de mayor afectación a la SE 29/2018.

Sexo ■ Masculino ■ Femenino


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 29, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

Base de datos extraída: 25 / 07 / 2018 15:00

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 29/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 29/ 2018


Provincia	SE 01-28/2018		SE 29/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,47%	315	0,07%	1	21,54%	316
PICHINCHA	13,43%	197			13,43%	197
MANABI	10,57%	155			10,57%	155
ESMERALDAS	9,88%	145			9,88%	145
EL ORO	6,27%	92			6,27%	92
CHIMBORAZO	4,50%	66			4,50%	66
COTOPAXI	3,34%	49	0,07%	1	3,41%	50
TUNGURAHUA	3,14%	46			3,14%	46
NAPO	2,79%	41	0,14%	2	2,93%	43
LOJA	2,52%	37			2,52%	37
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,52%	37			2,52%	37
SANTA ELENA	2,39%	35			2,39%	35
SUCUMBIO	2,32%	34			2,32%	34
MORONA SANTIAGO	2,11%	31	0,07%	1	2,18%	32
CAÑAR	2,11%	31			2,11%	31
ORELLANA	2,04%	30			2,04%	30
IMBABURA	1,91%	28			1,91%	28
LOS RIOS	1,70%	25			1,70%	25
AZUAY	1,43%	21			1,43%	21
BOLIVAR	1,16%	17			1,16%	17
CARCHI	0,89%	13			0,89%	13
PASTAZA	0,48%	7	0,14%	2	0,61%	9
ZAMORA CHINCHIPE	0,55%	8			0,55%	8
Total	99,52%	1.460	0,48%	7	100,00%	1.467

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Se observa que la mayor cantidad de los casos reportados de Desnutrición Aguda Moderada, por provincias son: Guayas con 316 casos (21,54%), Pichincha con 197 casos (13,43%), Manabí con 155 casos (10,57%), Esmeraldas con 145 casos (9,88%), El Oro con 92 casos (6,27%), Chimborazo con 66 casos (4,50%), de los 1.467 casos notificados de desnutrición moderada a la SE 29/2018.

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 29/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 29/ 2018

Provincia	SE 01-28/2018		SE 29/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	13,69%	56	0,24%	1	13,94%	57
MANABI	13,94%	57			13,94%	57
ESMERALDAS	13,20%	54			13,20%	54
EL ORO	6,60%	27			6,60%	27
PICHINCHA	6,36%	26			6,36%	26
SANTA ELENA	5,13%	21			5,13%	21
NAPO	4,89%	20			4,89%	20
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI..	4,89%	20			4,89%	20
ZAMORA CHINCHIPE	3,67%	15			3,67%	15
CHIMBORAZO	3,42%	14			3,42%	14
SUCUMBIO	3,18%	13			3,18%	13
IMBABURA	2,93%	12			2,93%	12
ORELLANA	2,93%	12			2,93%	12
MORONA SANTIAGO	2,69%	11			2,69%	11
LOJA	2,20%	9			2,20%	9
AZUAY	1,71%	7			1,71%	7
BOLIVAR	1,71%	7			1,71%	7
CAÑAR	1,47%	6			1,47%	6
CARCHI	1,47%	6			1,47%	6
TUNGURAHUA	1,47%	6			1,47%	6
LOS RIOS	1,22%	5			1,22%	5
COTOPAXI	0,98%	4			0,98%	4
Total	99,76%	408	0,24%	1	100,00%	409

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Al analizar la Desnutrición Aguda Severa, se observa un mayor número de casos reportados, en las provincias de: Guayas con 57 casos (13,94%), Manabí con 57 casos (13,94%), Esmeraldas con 54 casos (13,20%), El Oro con 27 casos (6,60%), Pichincha con 26 (6,36%), Santa Elena con 21 casos (5,13%), de los 409 casos notificados a la SE 29/ 2018


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 29, 2018

Base de datos extraída: 25/ 07 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 29/ 2018



CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 29/ 2018


Provincia	D539 Mujer embarazada co..	
	Número de casos	% total
GUAYAS	603	24,90%
PICHINCHA	357	14,74%
LOS RÍOS	164	6,77%
MANABI	153	6,32%
SANTA ELENA	153	6,32%
ESMERALDAS	145	5,99%
CAÑAR	130	5,37%
EL ORO	125	5,16%
TUNGURAHUA	73	3,01%
AZUAY	69	2,85%
BOLIVAR	58	2,39%
LOJA	58	2,39%
CHIMBORAZO	54	2,23%
ZAMORA CHINCHIPE	49	2,02%
IMBABURA	39	1,61%
SUCUMBIOS	35	1,45%
COTOPAXI	31	1,28%
ORELLANA	28	1,16%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26	1,07%
CARCHI	25	1,03%
MORONA SANTIAGO	23	0,95%
NAPO	23	0,95%
ZONA NO DELIMITADA	1	0,04%
Total	2.422	100,00%

Fuente: Subsistema Sive-Alerta

Elaborado: SSVE

A la SE 29 del 2018 se han reportado 2.422 casos, siendo las provincias donde se registran el mayor número de casos : Guayas con 603 casos (24,90%), Pichincha con 357 casos (14,74%), Los Ríos con 164 casos (6,77%), Manabí con 153 casos (6,32%), Santa Elena con 153 casos (6,32%), Esmeraldas con 145 (5,99%).

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 29/2018



Al analizar los grupos de edad reportados, se evidencia que, el mayor número de casos se acumulan en el grupo etario de 15 - 19 años de edad con 1.187 casos (49,01%), notificados a la SE 29/2018

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.