



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 / 2018.

Base de datos extraída: 11/09/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 36 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-35	SE 36	SE 01-35	SE 36	
GUAYAS	380	5	73	1	459
PICHINCHA	248	7	36	1	292
MANABI	177	5	69	4	255
ESMERALDAS	175	3	60	1	239
EL ORO	108		30	1	139
CHIMBORAZO	77		19	3	99
COTOPAXI	61	5	4		70
NAPO	47		23		70
SANTA ELENA	45		22		67
SANTO DOMINGO DE LOS T..	42		23		65
LOJA	49	1	11		61
ORELLANA	43		17		60
TUNGURAHUA	48	1	8		57
SUCUMBIOS	39	1	15		55
MORONA SANTIAGO	37		11		48
CAÑAR	37	1	6		44
IMBABURA	31		12		43
LOS RIOS	33		10		43
AZUAY	24		7		31
ZAMORA CHINCHIPE	15	1	15		31
BOLIVAR	20	1	8		29
CARCHI	15	1	7		23
PASTAZA	12				12
Total	1.763	32	486	11	2.292


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 36/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 36/2018




Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

Base de datos extraída: 11 / 09 / 2018 15:00

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 36/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 36/ 2018

Provincia	SE 01-35		SE 36		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,17%	380	0,28%	5	21,45%	385
PICHINCHA	13,82%	248	0,39%	7	14,21%	255
MANABI	9,86%	177	0,28%	5	10,14%	182
ESMERALDAS	9,75%	175	0,17%	3	9,92%	178
EL ORO	6,02%	108			6,02%	108
CHIMBORAZO	4,29%	77			4,29%	77
COTOPAXI	3,40%	61	0,28%	5	3,68%	66
LOJA	2,73%	49	0,06%	1	2,79%	50
TUNGURAHUA	2,67%	48	0,06%	1	2,73%	49
NAPO	2,62%	47			2,62%	47
SANTA ELENA	2,51%	45			2,51%	45
ORELLANA	2,40%	43			2,40%	43
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,34%	42			2,34%	42
SUCUMBIOS	2,17%	39	0,06%	1	2,23%	40
CAÑAR	2,06%	37	0,06%	1	2,12%	38
MORONA SANTIAGO	2,06%	37			2,06%	37
LOS RIOS	1,84%	33			1,84%	33
IMBABURA	1,73%	31			1,73%	31
AZUAY	1,34%	24			1,34%	24
BOLIVAR	1,11%	20	0,06%	1	1,17%	21
CARCHI	0,84%	15	0,06%	1	0,89%	16
ZAMORA CHINCHIPE	0,84%	15	0,06%	1	0,89%	16
PASTAZA	0,67%	12			0,67%	12
Total	98,22%	1.763	1,78%	32	100,00%	1.795

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 36 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 36/ 2018

Provincia	SE 01-35		SE 36		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	15,02%	73	9,09%	1	14,89%	74
MANABI	14,20%	69	36,36%	4	14,69%	73
ESMERALDAS	12,35%	60	9,09%	1	12,27%	61
PICHINCHA	7,41%	36	9,09%	1	7,44%	37
EL ORO	6,17%	30	9,09%	1	6,24%	31
NAPO	4,73%	23			4,63%	23
SANTO DOMINGO DE ..	4,73%	23			4,63%	23
CHIMBORAZO	3,91%	19	27,27%	3	4,43%	22
SANTA ELENA	4,53%	22			4,43%	22
ORELLANA	3,50%	17			3,42%	17
SUCUMBIOS	3,09%	15			3,02%	15
ZAMORA CHINCHIPE	3,09%	15			3,02%	15
IMBABURA	2,47%	12			2,41%	12
LOJA	2,26%	11			2,21%	11
MORONA SANTIAGO	2,26%	11			2,21%	11
LOS RIOS	2,06%	10			2,01%	10
BOLIVAR	1,65%	8			1,61%	8
TUNGURAHUA	1,65%	8			1,61%	8
AZUAY	1,44%	7			1,41%	7
CARCHI	1,44%	7			1,41%	7
CAÑAR	1,23%	6			1,21%	6
COTOPAXI	0,82%	4			0,80%	4
Total	100,00%	486	100,00%	11	100,00%	497

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36, 2018

Base de datos extraída: 11/ 09 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 36/ 2018




CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 36/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-35	SE 36	SE 01-35	SE 36	Total	Total
GUAYAS	25,02%	18,37%	728	9	24,91%	737
PICHINCHA	15,40%	12,24%	448	6	15,34%	454
LOS RIOS	7,15%	12,24%	208	6	7,23%	214
SANTA ELENA	6,25%	10,20%	182	5	6,32%	187
ESMERALDAS	6,12%	10,20%	178	5	6,18%	183
MANABI	6,05%	10,20%	176	5	6,12%	181
CAÑAR	5,19%		151		5,10%	151
EL ORO	5,05%	2,04%	147	1	5,00%	148
TUNGURAHUA	2,92%	4,08%	85	2	2,94%	87
AZUAY	2,78%	2,04%	81	1	2,77%	82
BOLIVAR	2,34%	4,08%	68	2	2,37%	70
CHIMBORAZO	2,13%	4,08%	62	2	2,16%	64
LOJA	2,20%		64		2,16%	64
ZAMORA CHINCHIPE	1,99%	4,08%	58	2	2,03%	60
SUCUMBIOS	1,65%	2,04%	48	1	1,66%	49
IMBABURA	1,44%	2,04%	42	1	1,45%	43
COTOPAXI	1,13%		33		1,12%	33
SANTO DOMINGO ..	1,13%		33		1,12%	33
CARCHI	1,07%	2,04%	31	1	1,08%	32
ORELLANA	1,10%		32		1,08%	32
MORONA SANTIAG..	1,07%		31		1,05%	31
NAPO	0,82%		24		0,81%	24
Total general	100,00%	100,00%	2.910	49	100,00%	2.959

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 36/2018



NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.