



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39 / 2018.

Base de datos extraída: 02/10/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 39 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-38	SE 39	SE 01-38	SE 39	
GUAYAS	403	10	80	10	503
PICHINCHA	275	4	39	3	321
MANABI	197	3	74	2	276
ESMERALDAS	192	5	65	2	264
EL ORO	111		31		142
CHIMBORAZO	85	1	25	1	112
COTOPAXI	69	1	4		74
NAPO	49	1	24		74
SANTA ELENA	47	1	22		70
LOJA	55		12		67
SANTO DOMINGO DE LOS T..	44		23		67
ORELLANA	47		18		65
TUNGURAHUA	52		10	2	64
SUCUMBIOS	43		16		59
MORONA SANTIAGO	41	2	11		54
LOS RIOS	37		14		51
CAÑAR	39	1	7		47
IMBABURA	34		12		46
ZAMORA CHINCHIPE	19	1	15	1	36
AZUAY	25		7		32
BOLIVAR	23		8		31
CARCHI	17		8	1	26
PASTAZA	13				13
Total	1.917	30	525	22	2.494


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 39/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 39/2018




Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 39/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 39/ 2018

Provincia	SE 01-38		SE 39		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	20,70%	403	0,51%	10	21,21%	413
PICHINCHA	14,12%	275	0,21%	4	14,33%	279
MANABI	10,12%	197	0,15%	3	10,27%	200
ESMERALDAS	9,86%	192	0,26%	5	10,12%	197
EL ORO	5,70%	111			5,70%	111
CHIMBORAZO	4,37%	85	0,05%	1	4,42%	86
COTOPAXI	3,54%	69	0,05%	1	3,60%	70
LOJA	2,82%	55			2,82%	55
TUNGURAHUA	2,67%	52			2,67%	52
NAPO	2,52%	49	0,05%	1	2,57%	50
SANTA ELENA	2,41%	47	0,05%	1	2,47%	48
ORELLANA	2,41%	47			2,41%	47
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,26%	44			2,26%	44
MORONA SANTIAGO	2,11%	41	0,10%	2	2,21%	43
SUCUMBIO	2,21%	43			2,21%	43
CAÑAR	2,00%	39	0,05%	1	2,05%	40
LOS RIOS	1,90%	37			1,90%	37
IMBABURA	1,75%	34			1,75%	34
AZUAY	1,28%	25			1,28%	25
BOLIVAR	1,18%	23			1,18%	23
ZAMORA CHINCHIPE	0,98%	19	0,05%	1	1,03%	20
CARCHI	0,87%	17			0,87%	17
PASTAZA	0,67%	13			0,67%	13
Total	98,46%	1.917	1,54%	30	100,00%	1.947

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 39 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 39/ 2018

Provincia	SE 01-38		SE 39		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	15,24%	80	45,45%	10	16,45%	90
MANABI	14,10%	74	9,09%	2	13,89%	76
ESMERALDAS	12,38%	65	9,09%	2	12,25%	67
PICHINCHA	7,43%	39	13,64%	3	7,68%	42
EL ORO	5,90%	31			5,67%	31
CHIMBORAZO	4,76%	25	4,55%	1	4,75%	26
NAPO	4,57%	24			4,39%	24
SANTO DOMINGO DE ..	4,38%	23			4,20%	23
SANTA ELENA	4,19%	22			4,02%	22
ORELLANA	3,43%	18			3,29%	18
SUCUMBIO	3,05%	16			2,93%	16
ZAMORA CHINCHIPE	2,86%	15	4,55%	1	2,93%	16
LOS RIOS	2,67%	14			2,56%	14
IMBABURA	2,29%	12			2,19%	12
LOJA	2,29%	12			2,19%	12
TUNGURAHUA	1,90%	10	9,09%	2	2,19%	12
MORONA SANTIAGO	2,10%	11			2,01%	11
CARCHI	1,52%	8	4,55%	1	1,65%	9
BOLIVAR	1,52%	8			1,46%	8
AZUAY	1,33%	7			1,28%	7
CAÑAR	1,33%	7			1,28%	7
COTOPAXI	0,76%	4			0,73%	4
Total	100,00%	525	100,00%	22	100,00%	547

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39, 2018

Base de datos extraída: 02/ 10 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 39/ 2018




CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 39/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-38	SE 39	SE 01-38	SE 39	Total	Total
GUAYAS	25,49%	28,81%	808	17	25,55%	825
PICHINCHA	15,17%	16,95%	481	10	15,21%	491
LOS RIOS	7,19%	5,08%	228	3	7,15%	231
SANTA ELENA	6,21%		197		6,10%	197
ESMERALDAS	6,21%	11,86%	197	7	6,32%	204
MANABI	5,93%	10,17%	188	6	6,01%	194
EL ORO	4,86%	6,78%	154	4	4,89%	158
CAÑAR	5,02%	5,08%	159	3	5,02%	162
AZUAY	3,15%	1,69%	100	1	3,13%	101
TUNGURAHUA	2,81%	3,39%	89	2	2,82%	91
BOLIVAR	2,33%	1,69%	74	1	2,32%	75
CHIMBORAZO	2,11%		67		2,07%	67
LOJA	2,11%	1,69%	67	1	2,11%	68
ZAMORA CHINCHIPE	2,15%	3,39%	68	2	2,17%	70
SUCUMBIO	1,67%		53		1,64%	53
IMBABURA	1,42%		45		1,39%	45
ORELLANA	1,10%		35		1,08%	35
SANTO DOMINGO ..	1,07%	1,69%	34	1	1,08%	35
COTOPAXI	1,10%		35		1,08%	35
MORONA SANTIAG..	1,04%		33		1,02%	33
CARCHI	1,04%		33		1,02%	33
NAPO	0,79%	1,69%	25	1	0,81%	26
Total	100,00%	100,00%	3.170	59	100,00%	3.229

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 39/2018



NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.