



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 40 / 2018.

Base de datos extraída: 10/10/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 40 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-39	SE 40	SE 01-39	SE 40	
GUAYAS	429	5	92	3	529
PICHINCHA	280	3	42	5	330
MANABI	200	2	76	1	279
ESMERALDAS	199	3	69		271
EL ORO	111		31	1	143
CHIMBORAZO	89	2	26		117
COTOPAXI	70	2	4		76
NAPO	50	1	24		75
SANTO DOMINGO DE LOS T..	47	4	23		74
SANTA ELENA	48	1	22		71
ORELLANA	48	1	19	2	70
TUNGURAHUA	52	5	12	1	70
LOJA	54	2	12		68
MORONA SANTIAGO	49		17		66
CAÑAR	40	9	7	3	59
SUCUMBIOS	43		16		59
LOS RIOS	37	2	14		53
IMBABURA	34	2	12		48
ZAMORA CHINCHIPE	20		16	1	37
AZUAY	27		8		35
BOLIVAR	23		8		31
CARCHI	17	1	9	1	28
PASTAZA	13				13
Total	1.980	45	559	18	2.602


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 40 /2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 40/2018




Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 40, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 40/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 40/ 2018

Provincia	SE 01-39		SE 40		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,19%	429	0,25%	5	21,43%	434
PICHINCHA	13,83%	280	0,15%	3	13,98%	283
ESMERALDAS	9,83%	199	0,15%	3	9,98%	202
MANABI	9,88%	200	0,10%	2	9,98%	202
EL ORO	5,48%	111			5,48%	111
CHIMBORAZO	4,40%	89	0,10%	2	4,49%	91
COTOPAXI	3,46%	70	0,10%	2	3,56%	72
TUNGURAHUA	2,57%	52	0,25%	5	2,81%	57
LOJA	2,67%	54	0,10%	2	2,77%	56
NAPO	2,47%	50	0,05%	1	2,52%	51
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,32%	47	0,20%	4	2,52%	51
CAÑAR	1,98%	40	0,44%	9	2,42%	49
MORONA SANTIAGO	2,42%	49			2,42%	49
ORELLANA	2,37%	48	0,05%	1	2,42%	49
SANTA ELENA	2,37%	48	0,05%	1	2,42%	49
SUCUMBIO	2,12%	43			2,12%	43
LOS RIOS	1,83%	37	0,10%	2	1,93%	39
IMBABURA	1,68%	34	0,10%	2	1,78%	36
AZUAY	1,33%	27			1,33%	27
BOLIVAR	1,14%	23			1,14%	23
ZAMORA CHINCHIPE	0,99%	20			0,99%	20
CARCHI	0,84%	17	0,05%	1	0,89%	18
PASTAZA	0,64%	13			0,64%	13
Total	97,78%	1.980	2,22%	45	100,00%	2.025

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 40 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 40/ 2018

Provincia	SE 01-39		SE 40		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,46%	92	16,67%	3	16,46%	95
MANABI	13,60%	76	5,56%	1	13,34%	77
ESMERALDAS	12,34%	69			11,96%	69
PICHINCHA	7,51%	42	27,78%	5	8,15%	47
EL ORO	5,55%	31	5,56%	1	5,55%	32
CHIMBORAZO	4,65%	26			4,51%	26
NAPO	4,29%	24			4,16%	24
SANTO DOMINGO DE ..	4,11%	23			3,99%	23
SANTA ELENA	3,94%	22			3,81%	22
ORELLANA	3,40%	19	11,11%	2	3,64%	21
MORONA SANTIAGO	3,04%	17			2,95%	17
ZAMORA CHINCHIPE	2,86%	16	5,56%	1	2,95%	17
SUCUMBIO	2,86%	16			2,77%	16
LOS RIOS	2,50%	14			2,43%	14
TUNGURAHUA	2,15%	12	5,56%	1	2,25%	13
IMBABURA	2,15%	12			2,08%	12
LOJA	2,15%	12			2,08%	12
CAÑAR	1,25%	7	16,67%	3	1,73%	10
CARCHI	1,61%	9	5,56%	1	1,73%	10
AZUAY	1,43%	8			1,39%	8
BOLIVAR	1,43%	8			1,39%	8
COTOPAXI	0,72%	4			0,69%	4
Total	100,00%	559	100,00%	18	100,00%	577

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 40, 2018

Base de datos extraída: 10/ 10 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 40/ 2018




CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 40/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-39	SE 40	SE 01-39	SE 40	Total	Total
GUAYAS	25,92%	18,18%	853	8	25,82%	861
PICHINCHA	14,92%	25,00%	491	11	15,05%	502
LOS RIOS	7,02%	2,27%	231	1	6,96%	232
SANTA ELENA	5,99%		197		5,91%	197
ESMERALDAS	6,50%		214		6,42%	214
MANABI	5,89%	4,55%	194	2	5,88%	196
EL ORO	4,80%		158		4,74%	158
CAÑAR	5,01%	15,91%	165	7	5,16%	172
AZUAY	3,37%		111		3,33%	111
TUNGURAHUA	2,83%	6,82%	93	3	2,88%	96
BOLIVAR	2,28%		75		2,25%	75
CHIMBORAZO	2,13%	4,55%	70	2	2,16%	72
LOJA	2,07%	2,27%	68	1	2,07%	69
ZAMORA CHINCHIPE	2,13%	2,27%	70	1	2,13%	71
SUCUMBIO	1,61%	6,82%	53	3	1,68%	56
IMBABURA	1,37%		45		1,35%	45
ORELLANA	1,09%	6,82%	36	3	1,17%	39
SANTO DOMINGO ..	1,09%	2,27%	36	1	1,11%	37
COTOPAXI	1,15%		38		1,14%	38
MORONA SANTIAG..	1,03%		34		1,02%	34
CARCHI	1,00%		33		0,99%	33
NAPO	0,79%	2,27%	26	1	0,81%	27
Total	100,00%	100,00%	3.291	44	100,00%	3.335

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 40/2018



NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.