



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41 / 2018.

Base de datos extraída: 16/10/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 41 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-40	SE 41	SE 01-40	SE 41	
GUAYAS	440	12	96		548
PICHINCHA	284	3	47	1	335
MANABI	202	2	77	1	282
ESMERALDAS	206		69	2	277
EL ORO	111		32		143
CHIMBORAZO	91		26	2	119
NAPO	51	1	24	3	79
COTOPAXI	72	1	4		77
SANTO DOMINGO DE LOS T..	51	1	23		75
SANTA ELENA	49	2	22		73
ORELLANA	49	1	22		72
TUNGURAHUA	57	1	13		71
LOJA	56	2	12		70
MORONA SANTIAGO	51	1	17		69
CAÑAR	49	2	10		61
SUCUMBIOS	43	1	17		61
LOS RIOS	39	1	14		54
IMBABURA	36		12	1	49
ZAMORA CHINCHIPE	21	1	17		39
AZUAY	27	1	8	1	37
BOLIVAR	23		8		31
CARCHI	18	2	10	1	31
PASTAZA	13				13
Total	2.039	35	580	12	2.666


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 41 /2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 41/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 41/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 41/ 2018

Provincia	SE 01-40		SE 41		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,22%	440	0,58%	12	21,79%	452
PICHINCHA	13,69%	284	0,14%	3	13,84%	287
ESMERALDAS	9,93%	206			9,93%	206
MANABI	9,74%	202	0,10%	2	9,84%	204
EL ORO	5,35%	111			5,35%	111
CHIMBORAZO	4,39%	91			4,39%	91
COTOPAXI	3,47%	72	0,05%	1	3,52%	73
LOJA	2,70%	56	0,10%	2	2,80%	58
TUNGURAHUA	2,75%	57	0,05%	1	2,80%	58
MORONA SANTIAGO	2,46%	51	0,05%	1	2,51%	52
NAPO	2,46%	51	0,05%	1	2,51%	52
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,46%	51	0,05%	1	2,51%	52
CAÑAR	2,36%	49	0,10%	2	2,46%	51
SANTA ELENA	2,36%	49	0,10%	2	2,46%	51
ORELLANA	2,36%	49	0,05%	1	2,41%	50
SUCUMBIO	2,07%	43	0,05%	1	2,12%	44
LOS RIOS	1,88%	39	0,05%	1	1,93%	40
IMBABURA	1,74%	36			1,74%	36
AZUAY	1,30%	27	0,05%	1	1,35%	28
BOLIVAR	1,11%	23			1,11%	23
ZAMORA CHINCHIPE	1,01%	21	0,05%	1	1,06%	22
CARCHI	0,87%	18	0,10%	2	0,96%	20
PASTAZA	0,63%	13			0,63%	13
Total	98,31%	2.039	1,69%	35	100,00%	2.074

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 41 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 41/ 2018

Provincia	SE 01-40		SE 41		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,55%	96			16,22%	96
MANABI	13,28%	77	8,33%	1	13,18%	78
ESMERALDAS	11,90%	69	16,67%	2	11,99%	71
PICHINCHA	8,10%	47	8,33%	1	8,11%	48
EL ORO	5,52%	32			5,41%	32
CHIMBORAZO	4,48%	26	16,67%	2	4,73%	28
NAPO	4,14%	24	25,00%	3	4,56%	27
SANTO DOMINGO DE ..	3,97%	23			3,89%	23
ORELLANA	3,79%	22			3,72%	22
SANTA ELENA	3,79%	22			3,72%	22
MORONA SANTIAGO	2,93%	17			2,87%	17
SUCUMBIO	2,93%	17			2,87%	17
ZAMORA CHINCHIPE	2,93%	17			2,87%	17
LOS RIOS	2,41%	14			2,36%	14
IMBABURA	2,07%	12	8,33%	1	2,20%	13
TUNGURAHUA	2,24%	13			2,20%	13
LOJA	2,07%	12			2,03%	12
CARCHI	1,72%	10	8,33%	1	1,86%	11
CAÑAR	1,72%	10			1,69%	10
AZUAY	1,38%	8	8,33%	1	1,52%	9
BOLIVAR	1,38%	8			1,35%	8
COTOPAXI	0,69%	4			0,68%	4
Total	100,00%	580	100,00%	12	100,00%	592

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41, 2018

Base de datos extraída: 16/ 10 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 41/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 41/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-40	SE 41	SE 01-40	SE 41	Total	Total
GUAYAS	25,74%	18,37%	860	9	25,63%	869
PICHINCHA	15,18%	18,37%	507	9	15,22%	516
LOS RIOS	6,94%	8,16%	232	4	6,96%	236
SANTA ELENA	5,90%	10,20%	197	5	5,96%	202
ESMERALDAS	6,44%	4,08%	215	2	6,40%	217
MANABI	5,87%	16,33%	196	8	6,02%	204
EL ORO	4,79%	4,08%	160	2	4,78%	162
CAÑAR	5,18%		173		5,10%	173
AZUAY	3,17%	4,08%	106	2	3,19%	108
TUNGURAHUA	2,87%		96		2,83%	96
BOLIVAR	2,24%	6,12%	75	3	2,30%	78
CHIMBORAZO	2,16%	2,04%	72	1	2,15%	73
LOJA	2,07%		69		2,04%	69
ZAMORA CHINCHIPE	2,16%	4,08%	72	2	2,18%	74
SUCUMBIOS	1,71%		57		1,68%	57
IMBABURA	1,35%		45		1,33%	45
ORELLANA	1,17%		39		1,15%	39
SANTO DOMINGO ..	1,14%	2,04%	38	1	1,15%	39
COTOPAXI	1,14%	2,04%	38	1	1,15%	39
MORONA SANTIAG..	1,02%		34		1,00%	34
CARCHI	0,99%		33		0,97%	33
NAPO	0,81%		27		0,80%	27
Total	100,00%	100,00%	3.341	49	100,00%	3.390

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 41/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.