



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 44 / 2018.

Base de datos extraída: 06/11/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 44 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-43	SE 44	SE 01-43	SE 44	
GUAYAS	520	13	109	2	644
PICHINCHA	309	4	52	1	366
MANABI	222	3	85		310
ESMERALDAS	216	1	77	1	295
EL ORO	120		33		153
CHIMBORAZO	95	2	39	1	137
NAPO	54		43	1	98
COTOPAXI	88	2	5	2	97
SANTO DOMINGO DE LOS T..	55	5	23	2	85
MORONA SANTIAGO	60	2	17	1	80
SANTA ELENA	54	1	24		79
ORELLANA	54	1	22	1	78
TUNGURAHUA	61	1	13		75
CAÑAR	57	4	12		73
LOJA	59		13		72
SUCUMBIOS	45	1	19		65
LOS RIOS	42	1	16		59
IMBABURA	39		14		53
ZAMORA CHINCHIPE	24		18		42
AZUAY	29		10		39
BOLIVAR	24		8		32
CARCHI	21		11		32
PASTAZA	15				15
Total	2.263	41	663	12	2.979


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 44 /2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 44/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 44, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 44/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 44/ 2018

Provincia	SE 01-43		SE 44		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	22,57%	520	0,56%	13	23,13%	533
PICHINCHA	13,41%	309	0,17%	4	13,59%	313
MANABI	9,64%	222	0,13%	3	9,77%	225
ESMERALDAS	9,38%	216	0,04%	1	9,42%	217
EL ORO	5,21%	120			5,21%	120
CHIMBORAZO	4,12%	95	0,09%	2	4,21%	97
COTOPAXI	3,82%	88	0,09%	2	3,91%	90
MORONA SANTIAGO	2,60%	60	0,09%	2	2,69%	62
TUNGURAHUA	2,65%	61	0,04%	1	2,69%	62
CAÑAR	2,47%	57	0,17%	4	2,65%	61
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,39%	55	0,22%	5	2,60%	60
LOJA	2,56%	59			2,56%	59
ORELLANA	2,34%	54	0,04%	1	2,39%	55
SANTA ELENA	2,34%	54	0,04%	1	2,39%	55
NAPO	2,34%	54			2,34%	54
SUCUMBIO	1,95%	45	0,04%	1	2,00%	46
LOS RIOS	1,82%	42	0,04%	1	1,87%	43
IMBABURA	1,69%	39			1,69%	39
AZUAY	1,26%	29			1,26%	29
BOLIVAR	1,04%	24			1,04%	24
ZAMORA CHINCHIPE	1,04%	24			1,04%	24
CARCHI	0,91%	21			0,91%	21
PASTAZA	0,65%	15			0,65%	15
Total	98,22%	2.263	1,78%	41	100,00%	2.304

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 44 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 44 / 2018

Provincia	SE 01-43		SE 44		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,44%	109	16,67%	2	16,44%	111
MANABI	12,82%	85			12,59%	85
ESMERALDAS	11,61%	77	8,33%	1	11,56%	78
PICHINCHA	7,84%	52	8,33%	1	7,85%	53
NAPO	6,49%	43	8,33%	1	6,52%	44
CHIMBORAZO	5,88%	39	8,33%	1	5,93%	40
EL ORO	4,98%	33			4,89%	33
SANTO DOMINGO DE ..	3,47%	23	16,67%	2	3,70%	25
SANTA ELENA	3,62%	24			3,56%	24
ORELLANA	3,32%	22	8,33%	1	3,41%	23
SUCUMBIO	2,87%	19			2,81%	19
MORONA SANTIAGO	2,56%	17	8,33%	1	2,67%	18
ZAMORA CHINCHIPE	2,71%	18			2,67%	18
LOS RIOS	2,41%	16			2,37%	16
IMBABURA	2,11%	14			2,07%	14
LOJA	1,96%	13			1,93%	13
TUNGURAHUA	1,96%	13			1,93%	13
CAÑAR	1,81%	12			1,78%	12
CARCHI	1,66%	11			1,63%	11
AZUAY	1,51%	10			1,48%	10
BOLIVAR	1,21%	8			1,19%	8
COTOPAXI	0,75%	5	16,67%	2	1,04%	7
Total	100,00%	663	100,00%	12	100,00%	675

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 44, 2018

Base de datos extraída: 06/ 11 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 44/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 44/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número ..
	SE 01-43	SE 44	SE 01-43	SE 44	Total	Total
GUAYAS	25,79%	21,57%	931	11	25,73%	942
PICHINCHA	15,10%	3,92%	545	2	14,94%	547
LOS RIOS	6,87%	9,80%	248	5	6,91%	253
ESMERALDAS	6,34%		229		6,26%	229
MANABI	5,87%	3,92%	212	2	5,85%	214
SANTA ELENA	5,82%	13,73%	210	7	5,93%	217
CAÑAR	5,04%	11,76%	182	6	5,14%	188
EL ORO	4,79%	3,92%	173	2	4,78%	175
AZUAY	3,27%		118		3,22%	118
TUNGURAHUA	2,77%	3,92%	100	2	2,79%	102
ZAMORA CHIN..	2,19%	1,96%	79	1	2,19%	80
BOLIVAR	2,19%	1,96%	79	1	2,19%	80
CHIMBORAZO	2,13%	3,92%	77	2	2,16%	79
LOJA	1,94%	3,92%	70	2	1,97%	72
SUCUMBIO	1,83%	3,92%	66	2	1,86%	68
COTOPAXI	1,33%		48		1,31%	48
IMBABURA	1,27%		46		1,26%	46
ORELLANA	1,25%	3,92%	45	2	1,28%	47
SANTO DOMIN..	1,22%	1,96%	44	1	1,23%	45
MORONA SAN..	1,22%	3,92%	44	2	1,26%	46
CARCHI	0,97%		35		0,96%	35
NAPO	0,78%		28		0,76%	28
PASTAZA	0,03%	1,96%	1	1	0,05%	2
Total	100,00%	100,00%	3.610	51	100,00%	3.661

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 44/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.