

## DEFINICIONES OPERACIONALES

### Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

**Desnutrición aguda moderada:** Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

**Desnutrición aguda severa:** todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito.

Siendo la edad crítica, para manejo de la desnutrición, para evitar que se cronifique los menores de 2 años, se realizará la vigilancia y análisis más profundos en este grupo de riesgo.


Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 23 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-22/2018	SE 23/2018	SE 01-22/2018	SE 23/2018	
GUAYAS	211		39		250
PICHINCHA	147		21		168
MANABI	120		42		162
ESMERALDAS	79	3	29	1	112
EL ORO	74		18		92
CHIMBORAZO	45		11		56
NAPO	37		16		53
TUNGURAHUA	32		5	1	38
SANTA ELENA	23		12		35
SANTO DOMINGO DE LOS ..	21		13		34
SUCUMBIOS	27		7		34
IMBABURA	25		8		33
ORELLANA	23		9		32
COTOPAXI	29		2		31
MORONA SANTIAGO	23		8		31
CAÑAR	24		6		30
AZUAY	23		6		29
LOJA	20		7		27
LOS RIOS	20	1	5		26
ZAMORA CHINCHIPE	7		13		20
BOLIVAR	15		2		17
CARCHI	11		3		14
PASTAZA	1				1
<b>Total</b>	<b>1.037</b>	<b>4</b>	<b>282</b>	<b>2</b>	<b>1.325</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

En la SE 23 del 2018, se han notificado 1.325 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 78,57% (1.041) casos corresponden a desnutrición aguda moderada y el 21,43% (284) casos corresponden a desnutrición aguda severa, como se aprecia en el cuadro N.1 y Mapa N.1, donde se grafica la distribución de casos a nivel nacional.

MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 23/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 23/2017

Diagnostico final	Grupo edad	Masculino	Femenino	% Masculino	% Femenino
<b>E44 Desnutrición aguda moderada</b>	de 0 a 11 meses	264	226	25,36%	21,71%
	de 1 a 2 años	287	264	27,57%	25,36%
<b>E44 Desnutrición aguda severa</b>	de 0 a 11 meses	97	70	34,15%	24,65%
	de 1 a 2 años	61	56	21,48%	19,72%

En relación a los grupos etáreos:

1. Para desnutrición aguda moderada.- El grupo más afectado es el de 1 a 2 años con el 52,93% (551 casos) notificados; mostrando un impacto mayor en el sexo masculino con un 27,57% (287 casos), a la SE 23/2018.

2. Para desnutrición aguda severa.- el grupo más afectado es el de 0 a 11 meses, con el 58,80% (167 casos) donde el 34,15% (97 casos), corresponde al sexo masculino mostrando ser el de mayor afectación a la SE 23/2018.

Sexo ■ Masculino ■ Femenino


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23, 2018.

**Desnutrición Aguda Moderada**

Base de datos extraída: 12 / 06 / 2018 15:00

**MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 23/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
 Elaborado: SSVE

**CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 23/ 2018**


Provincia	SE 01-22/2018		SE 23/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	20,27%	211			20,27%	211
PICHINCHA	14,12%	147			14,12%	147
MANABI	11,53%	120			11,53%	120
ESMERALDAS	7,59%	79	0,29%	3	7,88%	82
EL ORO	7,11%	74			7,11%	74
CHIMBORAZO	4,32%	45			4,32%	45
NAPO	3,55%	37			3,55%	37
TUNGURAHUA	3,07%	32			3,07%	32
COTOPAXI	2,79%	29			2,79%	29
SUCUMBIO	2,59%	27			2,59%	27
IMBABURA	2,40%	25			2,40%	25
CAÑAR	2,31%	24			2,31%	24
AZUAY	2,21%	23			2,21%	23
MORONA SANTIAGO	2,21%	23			2,21%	23
ORELLANA	2,21%	23			2,21%	23
SANTA ELENA	2,21%	23			2,21%	23
LOS RIOS	1,92%	20	0,10%	1	2,02%	21
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,02%	21			2,02%	21
LOJA	1,92%	20			1,92%	20
BOLIVAR	1,44%	15			1,44%	15
CARCHI	1,06%	11			1,06%	11
ZAMORA CHINCHIPE	0,67%	7			0,67%	7
PASTAZA	0,10%	1			0,10%	1
<b>Total</b>	<b>99,62%</b>	<b>1.037</b>	<b>0,38%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.041</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
 Elaborado: SSVE

Se observa que la mayor cantidad de los casos reportados de Desnutrición Aguda Moderada, por provincias son: Guayas con 211 casos (20,27%), Pichincha con 147 casos (14,12%), Manabí con 120 casos (11,53%), Esmeraldas con 82 casos (7,88%), El Oro con 74 casos (7,11 %), Chimborazo con 45 casos (4,32%), de los 1.041 casos notificados de desnutrición moderada a la SE 23/2018.

**Desnutrición Aguda Severa**

**MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 23/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
 Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 23/ 2018**

Provincia	SE 01-22/2018		SE 23/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
MANABI	14,79%	42			14,79%	42
GUAYAS	13,73%	39			13,73%	39
ESMERALDAS	10,21%	29	0,35%	1	10,56%	30
PICHINCHA	7,39%	21			7,39%	21
EL ORO	6,34%	18			6,34%	18
NAPO	5,63%	16			5,63%	16
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI..	4,58%	13			4,58%	13
ZAMORA CHINCHIPE	4,58%	13			4,58%	13
SANTA ELENA	4,23%	12			4,23%	12
CHIMBORAZO	3,87%	11			3,87%	11
ORELLANA	3,17%	9			3,17%	9
IMBABURA	2,82%	8			2,82%	8
MORONA SANTIAGO	2,82%	8			2,82%	8
LOJA	2,46%	7			2,46%	7
SUCUMBIO	2,46%	7			2,46%	7
AZUAY	2,11%	6			2,11%	6
CAÑAR	2,11%	6			2,11%	6
TUNGURAHUA	1,76%	5	0,35%	1	2,11%	6
LOS RIOS	1,76%	5			1,76%	5
CARCHI	1,06%	3			1,06%	3
BOLIVAR	0,70%	2			0,70%	2
COTOPAXI	0,70%	2			0,70%	2
<b>Total</b>	<b>99,30%</b>	<b>282</b>	<b>0,70%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>284</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
 Elaborado: SSVE

Al analizar la Desnutrición Aguda Severa, se observa un mayor número de casos reportados, en las provincias de: Manabí con 42 casos (14,79 %), Guayas con 39 casos (13,73%), Esmeraldas con 30 casos (10,56%), Pichincha con 21 (7,39%), El Oro con 18 casos (6,34%), Napo con 16 casos (5,63%), de los 284 casos notificados a la SE 23/ 2018


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23, 2018**

Base de datos extraída: 12/ 06 /2018. 15:00 pm

**Mujer embarazada con bajo peso**

**Definición.-** Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

**MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 23/ 2018**




**CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 23/ 2018**

Provincia	Mujer embarazada con baj..	
	Número de casos	% total
GUAYAS	473	24,24%
PICHINCHA	305	15,63%
MANABI	130	6,66%
LOS RIOS	122	6,25%
SANTA ELENA	119	6,10%
CAÑAR	110	5,64%
ESMERALDAS	109	5,59%
EL ORO	105	5,38%
AZUAY	60	3,08%
TUNGURAHUA	59	3,02%
BOLIVAR	48	2,46%
LOJA	44	2,26%
CHIMBORAZO	39	2,00%
ZAMORA CHINCHIPE	33	1,69%
IMBABURA	31	1,59%
SUCUMBIOS	30	1,54%
ORELLANA	24	1,23%
COTOPAXI	23	1,18%
CARCHI	22	1,13%
MORONA SANTIAGO	22	1,13%
NAPO	21	1,08%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	21	1,08%
ZONA NO DELIMITADA	1	0,05%
<b>Total</b>	<b>1.951</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
 Elaborado: SSVE

A la SE 23 del 2018 se han reportado 1.951 casos, siendo las provincias donde se registran el mayor número de casos : Guayas con 473 casos (24,24%), Pichincha con 305 casos (15,63%), Manabí con 130 casos ( 6,66%), los Rios con 122 (6,25 %), Santa Elena con 119 casos (6,10%).

**Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 23/2018**



Al analizar los grupos de edad reportados, se evidencia que, el mayor número de casos se acumulan en el grupo etario de 15 - 19 años de edad con 962 casos (49,31%), notificados a la SE 23/2018

**NOTA ACLARATORIA:** El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.