

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito.

Siendo la edad crítica, para manejo de la desnutrición, para evitar que se cronifique los menores de 2 años, se realizará la vigilancia y análisis más profundos en este grupo de riesgo.


Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 26 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-25/2018	SE 26/2018	SE 01-25/2018	SE 26/2018	
GUAYAS	286	1	47		334
PICHINCHA	178		22	1	201
MANABI	143		52		195
ESMERALDAS	139	1	50		190
EL ORO	88	1	25	1	115
CHIMBORAZO	60		14		74
NAPO	39		17		56
SANTO DOMINGO DE LOS ..	34		19		53
SANTA ELENA	32		17		49
TUNGURAHUA	41		6		47
SUCUMBIOS	34		12		46
COTOPAXI	41		3		44
IMBABURA	27		12		39
MORONA SANTIAGO	29		9	1	39
ORELLANA	28		11		39
CAÑAR	29	2	6		37
LOJA	28		8		36
LOS RIOS	24		5		29
AZUAY	20		8		28
BOLIVAR	17		5		22
ZAMORA CHINCHIPE	7		13		20
CARCHI	13		5		18
PASTAZA	5				5
Total	1.342	5	366	3	1.716

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

En la SE 26 del 2018, se han notificado 1.716 casos de desnutrición aguda, de los cuales, el 78,50% (1.347) casos corresponden a desnutrición aguda moderada y el 21,50% (369) casos corresponden a desnutrición aguda severa, como se aprecia en el cuadro N.1 y Mapa N.1, donde se grafica la distribución de casos a nivel nacional.

MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 26/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 26/2017

Diagnostico final	Grupo edad	Masculino	Femenino	% Masculino	% Femenino
E44 Desnutrición aguda moderada	de 0 a 11 meses	307	249	22,79%	18,49%
	de 1 a 2 años	404	387	29,99%	28,73%
E44 Desnutrición aguda severa	de 0 a 11 meses	113	85	30,62%	23,04%
	de 1 a 2 años	85	86	23,04%	23,31%

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

En relación a los grupos etáreos:

- 1. Para desnutrición aguda moderada.-** El grupo más afectado es el de 1 a 2 años con el 58,72% (791 casos) notificados; mostrando un impacto mayor en el sexo masculino con un 29,99% (404 casos), a la SE 26/2018.
- 2. Para desnutrición aguda severa.-** el grupo más afectado es el de 0 a 11 meses, con el 53,66% (198 casos) donde el 30,62% (113 casos), corresponde al sexo masculino mostrando ser el de mayor afectación a la SE 26/2018.


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 26, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

Base de datos extraída: 03 / 07 / 2018 15:00

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 26/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 26 / 2018


Provincia	SE 01-25/2018		SE 26/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,23%	286	0,07%	1	21,31%	287
PICHINCHA	13,21%	178			13,21%	178
MANABI	10,62%	143			10,62%	143
ESMERALDAS	10,32%	139	0,07%	1	10,39%	140
EL ORO	6,53%	88	0,07%	1	6,61%	89
CHIMBORAZO	4,45%	60			4,45%	60
COTOPAXI	3,04%	41			3,04%	41
TUNGURAHUA	3,04%	41			3,04%	41
NAPO	2,90%	39			2,90%	39
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,52%	34			2,52%	34
SUCUMBIOS	2,52%	34			2,52%	34
SANTA ELENA	2,38%	32			2,38%	32
CAÑAR	2,15%	29	0,15%	2	2,30%	31
MORONA SANTIAGO	2,15%	29			2,15%	29
LOJA	2,08%	28			2,08%	28
ORELLANA	2,08%	28			2,08%	28
IMBABURA	2,00%	27			2,00%	27
LOS RIOS	1,78%	24			1,78%	24
AZUAY	1,48%	20			1,48%	20
BOLIVAR	1,26%	17			1,26%	17
CARCHI	0,97%	13			0,97%	13
ZAMORA CHINCHIPE	0,52%	7			0,52%	7
PASTAZA	0,37%	5			0,37%	5
Total	99,63%	1.342	0,37%	5	100,00%	1.347

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Se observa que la mayor cantidad de los casos reportados de Desnutrición Aguda Moderada, por provincias son: Guayas con 287 casos (21,31%), Pichincha con 178 casos (13,21%), Manabí con 143 casos (10,62%), Esmeraldas con 140 casos (10,39%), El Oro con 89 casos (6,61%), Chimborazo con 60 casos (4,45%), de los 1.347 casos notificados de desnutrición moderada a la SE 26/2018.

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 26/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 26/ 2018

Provincia	SE 01-25/2018		SE 26/2018		Total	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
MANABI	14,09%	52			14,09%	52
ESMERALDAS	13,55%	50			13,55%	50
GUAYAS	12,74%	47			12,74%	47
EL ORO	6,78%	25	0,27%	1	7,05%	26
PICHINCHA	5,96%	22	0,27%	1	6,23%	23
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI..	5,15%	19			5,15%	19
NAPO	4,61%	17			4,61%	17
SANTA ELENA	4,61%	17			4,61%	17
CHIMBORAZO	3,79%	14			3,79%	14
ZAMORA CHINCHIPE	3,52%	13			3,52%	13
IMBABURA	3,25%	12			3,25%	12
SUCUMBIOS	3,25%	12			3,25%	12
ORELLANA	2,98%	11			2,98%	11
MORONA SANTIAGO	2,44%	9	0,27%	1	2,71%	10
AZUAY	2,17%	8			2,17%	8
LOJA	2,17%	8			2,17%	8
CAÑAR	1,63%	6			1,63%	6
TUNGURAHUA	1,63%	6			1,63%	6
BOLIVAR	1,36%	5			1,36%	5
CARCHI	1,36%	5			1,36%	5
LOS RIOS	1,36%	5			1,36%	5
COTOPAXI	0,81%	3			0,81%	3
Total	99,19%	366	0,81%	3	100,00%	369

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Al analizar la Desnutrición Aguda Severa, se observa un mayor número de casos reportados, en las provincias de: Manabí con 52 casos (14,09%), Esmeraldas con 50 casos (13,55%), Guayas con 47 casos (12,74%), El Oro con 26 casos (7,05%), Pichincha con 23 (6,23%), Santo Domingo con 19 casos (5,15%), de los 369 casos notificados a la SE 26/ 2018


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 26, 2018

Base de datos extraída: 03/ 07 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 26/ 2018



CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 26/ 2018


Provincia	D539 Mujer embarazada co..	
	Número de casos	% total
GUAYAS	538	24,50%
PICHINCHA	333	15,16%
SANTA ELENA	141	6,42%
MANABI	139	6,33%
LOS RIOS	138	6,28%
ESMERALDAS	137	6,24%
CAÑAR	118	5,37%
EL ORO	117	5,33%
TUNGURAHUA	65	2,96%
AZUAY	64	2,91%
BOLIVAR	53	2,41%
LOJA	49	2,23%
CHIMBORAZO	47	2,14%
ZAMORA CHINCHIPE	41	1,87%
IMBABURA	38	1,73%
SUCUMBIOS	31	1,41%
COTOPAXI	29	1,32%
ORELLANA	25	1,14%
CARCHI	24	1,09%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24	1,09%
MORONA SANTIAGO	22	1,00%
NAPO	22	1,00%
ZONA NO DELIMITADA	1	0,05%
Total	2.196	100,00%

Fuente: Subsistema Sive-Alerta

Elaborado: SSVE

A la SE 26 del 2018 se han reportado 2.196 casos, siendo las provincias donde se registran el mayor número de casos : Guayas con 538 casos (24,50%), Pichincha con 333 casos (15,16%), Santa Elena con 141 casos (6,42%), Manabí con 139 casos (6,33%), los Ríos con 138 (6,28 %), Esmeraldas con 137 (6,24 %), .

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 26/2018



Al analizar los grupos de edad reportados, se evidencia que, el mayor número de casos se acumulan en el grupo etario de 15 - 19 años de edad con 1.073 casos (48,86%), notificados a la SE 26/2018

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.