



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 37 / 2018.

Base de datos extraída: 18/09/2018. 15:00 pm

### DEFINICIONES OPERACIONALES

#### Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


**Desnutrición aguda moderada:** Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

**Desnutrición aguda severa:** todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 37 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	
GUAYAS	371	2	72	2	447
PICHINCHA	255	7	37	1	300
MANABI	182	6	73	2	263
ESMERALDAS	182	2	61	3	248
EL ORO	109		31		140
CHIMBORAZO	77	4	22	2	105
NAPO	47		23	1	71
COTOPAXI	66		4		70
SANTA ELENA	45	1	22		68
SANTO DOMINGO DE LOS T..	42		23		65
LOJA	51	1	11		63
ORELLANA	43		17		60
TUNGURAHUA	49	2	8	1	60
SUCUMBIOS	41	1	15		57
MORONA SANTIAGO	37	1	11		49
CAÑAR	38	1	7		46
IMBABURA	31	3	12		46
LOS RIOS	33	2	10		45
AZUAY	24	1	7		32
ZAMORA CHINCHIPE	16	1	15		32
BOLIVAR	21	1	8		30
CARCHI	16	1	7		24
PASTAZA	12				12
Total	1.788	37	496	12	2.333


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 37/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 37/2018




Sexo ■ Masculino ■ Femenino

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 37, 2018.**

**Desnutrición Aguda Moderada**

Base de datos extraída: 19 / 09 / 2018 15:00

**MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 37/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 37/ 2018**

Provincia	SE 01-36		SE 37		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	20,33%	371	0,11%	2	20,44%	373
PICHINCHA	13,97%	255	0,38%	7	14,36%	262
MANABI	9,97%	182	0,33%	6	10,30%	188
ESMERALDAS	9,97%	182	0,11%	2	10,08%	184
EL ORO	5,97%	109			5,97%	109
CHIMBORAZO	4,22%	77	0,22%	4	4,44%	81
COTOPAXI	3,62%	66			3,62%	66
LOJA	2,79%	51	0,05%	1	2,85%	52
TUNGURAHUA	2,68%	49	0,11%	2	2,79%	51
NAPO	2,58%	47			2,58%	47
SANTA ELENA	2,47%	45	0,05%	1	2,52%	46
ORELLANA	2,36%	43			2,36%	43
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,30%	42			2,30%	42
SUCUMBIO	2,25%	41	0,05%	1	2,30%	42
CAÑAR	2,08%	38	0,05%	1	2,14%	39
MORONA SANTIAGO	2,03%	37	0,05%	1	2,08%	38
LOS RIOS	1,81%	33	0,11%	2	1,92%	35
IMBABURA	1,70%	31	0,16%	3	1,86%	34
AZUAY	1,32%	24	0,05%	1	1,37%	25
BOLIVAR	1,15%	21	0,05%	1	1,21%	22
CARCHI	0,88%	16	0,05%	1	0,93%	17
ZAMORA CHINCHIPE	0,88%	16	0,05%	1	0,93%	17
PASTAZA	0,66%	12			0,66%	12
<b>Total</b>	<b>97,97%</b>	<b>1.788</b>	<b>2,03%</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.825</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Desnutrición Aguda Severa**

**MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 37 / 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 37/ 2018**

Provincia	SE 01-36		SE 37		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
MANABI	14,72%	73	16,67%	2	14,76%	75
GUAYAS	14,52%	72	16,67%	2	14,57%	74
ESMERALDAS	12,30%	61	25,00%	3	12,60%	64
PICHINCHA	7,46%	37	8,33%	1	7,48%	38
EL ORO	6,25%	31			6,10%	31
CHIMBORAZO	4,44%	22	16,67%	2	4,72%	24
NAPO	4,64%	23	8,33%	1	4,72%	24
SANTO DOMINGO DE ..	4,64%	23			4,53%	23
SANTA ELENA	4,44%	22			4,33%	22
ORELLANA	3,43%	17			3,35%	17
SUCUMBIO	3,02%	15			2,95%	15
ZAMORA CHINCHIPE	3,02%	15			2,95%	15
IMBABURA	2,42%	12			2,36%	12
LOJA	2,22%	11			2,17%	11
MORONA SANTIAGO	2,22%	11			2,17%	11
LOS RIOS	2,02%	10			1,97%	10
TUNGURAHUA	1,61%	8	8,33%	1	1,77%	9
BOLIVAR	1,61%	8			1,57%	8
AZUAY	1,41%	7			1,38%	7
CAÑAR	1,41%	7			1,38%	7
CARCHI	1,41%	7			1,38%	7
COTOPAXI	0,81%	4			0,79%	4
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>496</b>	<b>100,00%</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>	<b>508</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 37, 2018**

Base de datos extraída: 18/ 09 /2018. 15:00 pm

**Mujer embarazada con bajo peso**

**Definición.-** Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

**MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 37/ 2018**




**CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 37/ 2018**

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	Total	Total
GUAYAS	25,28%	24,39%	756	20	25,25%	776
PICHINCHA	15,18%	20,73%	454	17	15,33%	471
LOS RIOS	7,19%	3,66%	215	3	7,09%	218
SANTA ELENA	6,25%	7,32%	187	6	6,28%	193
ESMERALDAS	6,19%	6,10%	185	5	6,18%	190
MANABI	6,05%	2,44%	181	2	5,96%	183
EL ORO	5,02%	3,66%	150	3	4,98%	153
CAÑAR	5,05%	2,44%	151	2	4,98%	153
AZUAY	2,81%	13,41%	84	11	3,09%	95
TUNGURAHUA	2,91%	2,44%	87	2	2,90%	89
BOLIVAR	2,34%	3,66%	70	3	2,38%	73
CHIMBORAZO	2,14%	2,44%	64	2	2,15%	66
LOJA	2,14%	1,22%	64	1	2,12%	65
ZAMORA CHINCHIPE	2,01%	2,44%	60	2	2,02%	62
SUCUMBOS	1,67%	3,66%	50	3	1,72%	53
IMBABURA	1,47%		44		1,43%	44
ORELLANA	1,14%		34		1,11%	34
SANTO DOMINGO ..	1,10%		33		1,07%	33
COTOPAXI	1,10%		33		1,07%	33
MORONA SANTIAG..	1,07%		32		1,04%	32
CARCHI	1,07%		32		1,04%	32
NAPO	0,84%		25		0,81%	25
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.991</b>	<b>82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.073</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 37/2018**



**NOTA ACLARATORIA:** El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.