



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 38 / 2018.

Base de datos extraída: 25/09/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 38 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-37	SE 38	SE 01-37	SE 38	
GUAYAS	374	5	74	2	455
PICHINCHA	265	6	39		310
MANABI	188	6	75		269
ESMERALDAS	186	1	64	1	252
EL ORO	109	2	31		142
CHIMBORAZO	81	4	24	1	110
NAPO	48	1	24		73
COTOPAXI	66		4		70
SANTA ELENA	47		22		69
LOJA	52	3	11	1	67
ORELLANA	43	4	17	1	65
SANTO DOMINGO DE LOS T..	42		23		65
TUNGURAHUA	51	1	9	1	62
SUCUMBIOS	42		15		57
LOS RIOS	35	2	10	4	51
MORONA SANTIAGO	40		11		51
CAÑAR	39		7		46
IMBABURA	34		12		46
ZAMORA CHINCHIPE	18	1	15		34
AZUAY	25		7		32
BOLIVAR	22	1	8		31
CARCHI	17		7	1	25
PASTAZA	12				12
Total	1.836	37	509	12	2.394


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 38/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 38/2018




Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 38, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

Base de datos extraída: 25 / 09 / 2018 15:00

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 38/ 2018



CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 38/ 2018


Provincia	SE 01-37		SE 38		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	19,97%	374	0,27%	5	20,23%	379
PICHINCHA	14,15%	265	0,32%	6	14,47%	271
MANABI	10,04%	188	0,32%	6	10,36%	194
ESMERALDAS	9,93%	186	0,05%	1	9,98%	187
EL ORO	5,82%	109	0,11%	2	5,93%	111
CHIMBORAZO	4,32%	81	0,21%	4	4,54%	85
COTOPAXI	3,52%	66			3,52%	66
LOJA	2,78%	52	0,16%	3	2,94%	55
TUNGURAHUA	2,72%	51	0,05%	1	2,78%	52
NAPO	2,56%	48	0,05%	1	2,62%	49
ORELLANA	2,30%	43	0,21%	4	2,51%	47
SANTA ELENA	2,51%	47			2,51%	47
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,24%	42			2,24%	42
SUCUMBIOS	2,24%	42			2,24%	42
MORONA SANTIAGO	2,14%	40			2,14%	40
CAÑAR	2,08%	39			2,08%	39
LOS RIOS	1,87%	35	0,11%	2	1,98%	37
IMBABURA	1,82%	34			1,82%	34
AZUAY	1,33%	25			1,33%	25
BOLIVAR	1,17%	22	0,05%	1	1,23%	23
ZAMORA CHINCHIPE	0,96%	18	0,05%	1	1,01%	19
CARCHI	0,91%	17			0,91%	17
PASTAZA	0,64%	12			0,64%	12
Total	98,02%	1.836	1,98%	37	100,00%	1.873

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 38 / 2018



CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 38/ 2018

Provincia	SE 01-37		SE 38		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	14,54%	74	16,67%	2	14,59%	76
MANABI	14,73%	75			14,40%	75
ESMERALDAS	12,57%	64	8,33%	1	12,48%	65
PICHINCHA	7,66%	39			7,49%	39
EL ORO	6,09%	31			5,95%	31
CHIMBORAZO	4,72%	24	8,33%	1	4,80%	25
NAPO	4,72%	24			4,61%	24
SANTO DOMINGO DE ..	4,52%	23			4,41%	23
SANTA ELENA	4,32%	22			4,22%	22
ORELLANA	3,34%	17	8,33%	1	3,45%	18
SUCUMBIOS	2,95%	15			2,88%	15
ZAMORA CHINCHIPE	2,95%	15			2,88%	15
LOS RIOS	1,96%	10	33,33%	4	2,69%	14
IMBABURA	2,36%	12			2,30%	12
LOJA	2,16%	11	8,33%	1	2,30%	12
MORONA SANTIAGO	2,16%	11			2,11%	11
TUNGURAHUA	1,77%	9	8,33%	1	1,92%	10
BOLIVAR	1,57%	8			1,54%	8
CARCHI	1,38%	7	8,33%	1	1,54%	8
AZUAY	1,38%	7			1,34%	7
CAÑAR	1,38%	7			1,34%	7
COTOPAXI	0,79%	4			0,77%	4
Total	100,00%	509	100,00%	12	100,00%	521

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 38, 2018

Base de datos extraída: 25/ 09 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 38/ 2018




CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 38/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-37	SE 38	SE 01-37	SE 38	Total	Total
GUAYAS	25,36%	26,42%	784	14	25,37%	798
PICHINCHA	15,39%	9,43%	476	5	15,29%	481
LOS RIOS	7,05%	18,87%	218	10	7,25%	228
SANTA ELENA	6,24%	5,66%	193	3	6,23%	196
ESMERALDAS	6,18%	9,43%	191	5	6,23%	196
MANABI	5,95%	7,55%	184	4	5,98%	188
EL ORO	4,95%	1,89%	153	1	4,90%	154
CAÑAR	4,98%	5,66%	154	3	4,99%	157
AZUAY	3,07%	1,89%	95	1	3,05%	96
TUNGURAHUA			89		2,83%	89
BOLIVAR	2,36%	1,89%	73	1	2,35%	74
CHIMBORAZO			66		2,10%	66
LOJA	2,13%	1,89%	66	1	2,13%	67
ZAMORA CHINCHIPE	2,01%	5,66%	62	3	2,07%	65
SUCUMBIO			53		1,69%	53
IMBABURA	1,42%	1,89%	44	1	1,43%	45
ORELLANA			35		1,11%	35
SANTO DOMINGO ..	1,07%		33		1,05%	33
COTOPAXI	1,07%		33		1,05%	33
MORONA SANTIAG..	1,07%		33		1,05%	33
CARCHI	1,03%	1,89%	32	1	1,05%	33
NAPO		0,81%	25		0,79%	25
Total	100,00%	100,00%	3.092	53	100,00%	3.145

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
 Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 38/2018



NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.