



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 42 / 2018.

Base de datos extraída: 23/10/2018. 15:00 pm

### DEFINICIONES OPERACIONALES

#### Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


**Desnutrición aguda moderada:** Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

**Desnutrición aguda severa:** todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 42 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-41	SE 42	SE 01-41	SE 42	
GUAYAS	455	6	96		557
PICHINCHA	291	3	48	3	345
MANABI	204	9	78	5	296
ESMERALDAS	208	1	73	2	284
EL ORO	113	3	32		148
CHIMBORAZO	91	2	28	10	131
NAPO	53	1	27	3	84
COTOPAXI	74	5	4		83
SANTA ELENA	53		24		77
ORELLANA	52	2	22		76
SANTO DOMINGO DE LOS T..	52	1	23		76
MORONA SANTIAGO	57		17		74
TUNGURAHUA	58	1	13		72
LOJA	58	1	12		71
CAÑAR	51	4	10		65
SUCUMBIOS	45		18		63
LOS RIOS	40	1	14	1	56
IMBABURA	36	1	13		50
AZUAY	27	2	9	1	39
ZAMORA CHINCHIPE	22		17		39
BOLIVAR	23		8		31
CARCHI	20		11		31
PASTAZA	13				13
<b>Total</b>	<b>2.096</b>	<b>43</b>	<b>597</b>	<b>25</b>	<b>2.761</b>


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 42 /2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 42/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 42, 2018.**

**Desnutrición Aguda Moderada**

**MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 42/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 42/ 2018**

Provincia	SE 01-41		SE 42		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	21,27%	455	0,28%	6	21,55%	461
PICHINCHA	13,60%	291	0,14%	3	13,74%	294
MANABI	9,54%	204	0,42%	9	9,96%	213
ESMERALDAS	9,72%	208	0,05%	1	9,77%	209
EL ORO	5,28%	113	0,14%	3	5,42%	116
CHIMBORAZO	4,25%	91	0,09%	2	4,35%	93
COTOPAXI	3,46%	74	0,23%	5	3,69%	79
LOJA	2,71%	58	0,05%	1	2,76%	59
TUNGURAHUA	2,71%	58	0,05%	1	2,76%	59
MORONA SANTIAGO	2,66%	57			2,66%	57
CAÑAR	2,38%	51	0,19%	4	2,57%	55
NAPO	2,48%	53	0,05%	1	2,52%	54
ORELLANA	2,43%	52	0,09%	2	2,52%	54
SANTA ELENA	2,48%	53			2,48%	53
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,43%	52	0,05%	1	2,48%	53
SUCUMBIO	2,10%	45			2,10%	45
LOS RIOS	1,87%	40	0,05%	1	1,92%	41
IMBABURA	1,68%	36	0,05%	1	1,73%	37
AZUAY	1,26%	27	0,09%	2	1,36%	29
BOLIVAR	1,08%	23			1,08%	23
ZAMORA CHINCHIPE	1,03%	22			1,03%	22
CARCHI	0,94%	20			0,94%	20
PASTAZA	0,61%	13			0,61%	13
<b>Total</b>	<b>97,99%</b>	<b>2.096</b>	<b>2,01%</b>	<b>43</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.139</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Desnutrición Aguda Severa**

**MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 42 / 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 42/ 2018**

Provincia	SE 01-41		SE 42		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,08%	96			15,43%	96
MANABI	13,07%	78	20,00%	5	13,34%	83
ESMERALDAS	12,23%	73	8,00%	2	12,06%	75
PICHINCHA	8,04%	48	12,00%	3	8,20%	51
CHIMBORAZO	4,69%	28	40,00%	10	6,11%	38
EL ORO	5,36%	32			5,14%	32
NAPO	4,52%	27	12,00%	3	4,82%	30
SANTA ELENA	4,02%	24			3,86%	24
SANTO DOMINGO DE ...	3,85%	23			3,70%	23
ORELLANA	3,69%	22			3,54%	22
SUCUMBIO	3,02%	18			2,89%	18
MORONA SANTIAGO	2,85%	17			2,73%	17
ZAMORA CHINCHIPE	2,85%	17			2,73%	17
LOS RIOS	2,35%	14	4,00%	1	2,41%	15
IMBABURA	2,18%	13			2,09%	13
TUNGURAHUA	2,18%	13			2,09%	13
LOJA	2,01%	12			1,93%	12
CARCHI	1,84%	11			1,77%	11
AZUAY	1,51%	9	4,00%	1	1,61%	10
CAÑAR	1,68%	10			1,61%	10
BOLIVAR	1,34%	8			1,29%	8
COTOPAXI	0,67%	4			0,64%	4
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>597</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>622</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 42, 2018**

Base de datos extraída: 23/ 10 /2018. 15:00 pm

**Mujer embarazada con bajo peso**

**Definición.-** Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

**MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 42/ 2018**




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 42/ 2018**

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total	Número de casos
	SE 01-41	SE 42	SE 01-41	SE 42	Total	Total
GUAYAS	25,79%	11,29%	882	7	25,53%	889
PICHINCHA	15,20%	14,52%	520	9	15,19%	529
LOS RIOS	6,93%	6,45%	237	4	6,92%	241
SANTA ELENA	5,91%	6,45%	202	4	5,92%	206
ESMERALDAS	6,40%	6,45%	219	4	6,40%	223
MANABI	5,96%	9,68%	204	6	6,03%	210
EL ORO	4,77%	6,45%	163	4	4,80%	167
CAÑAR	5,06%	8,06%	173	5	5,11%	178
AZUAY	3,27%	4,84%	112	3	3,30%	115
TUNGURAHUA	2,81%	4,84%	96	3	2,84%	99
BOLIVAR	2,28%		78		2,24%	78
CHIMBORAZO	2,13%	4,84%	73	3	2,18%	76
LOJA	2,02%	1,61%	69	1	2,01%	70
ZAMORA CHINCHIPE	2,16%	4,84%	74	3	2,21%	77
SUCUMBIO	1,67%	1,61%	57	1	1,67%	58
IMBABURA	1,32%	1,61%	45	1	1,32%	46
ORELLANA	1,14%	1,61%	39	1	1,15%	40
SANTO DOMINGO ..	1,14%	3,23%	39	2	1,18%	41
COTOPAXI	1,14%	1,61%	39	1	1,15%	40
MORONA SANTIAG..	1,14%		39		1,12%	39
CARCHI	0,96%		33		0,95%	33
NAPO	0,79%		27		0,78%	27
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.420</b>	<b>62</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.482</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 42/2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**NOTA ACLARATORIA:** El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.