



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 45 / 2018.

Base de datos extraída: 13/11/2018. 15:00 pm

### DEFINICIONES OPERACIONALES

#### Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

**Desnutrición aguda moderada:** Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

**Desnutrición aguda severa:** todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 45 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 45 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-44	SE 45	SE 01-44	SE 45	
GUAYAS	542	17	114	6	679
PICHINCHA	314	12	54		380
MANABI	229	1	87	1	318
ESMERALDAS	217		78		295
EL ORO	121		33		154
CHIMBORAZO	97	2	40		139
COTOPAXI	92	2	7	1	102
NAPO	54	1	44	2	101
ORELLANA	56	4	25	2	87
MORONA SANTIAGO	68		18		86
SANTO DOMINGO DE LOS T..	61		25		86
SANTA ELENA	55		25	1	81
TUNGURAHUA	62	1	13	1	77
LOJA	60	2	13		75
CAÑAR	61		12		73
SUCUMBIOS	47		20		67
LOS RIOS	43	2	16		61
IMBABURA	39		14	1	54
ZAMORA CHINCHIPE	25		19		44
AZUAY	29	3	10	1	43
CARCHI	21	2	11	2	36
BOLIVAR	25		8		33
PASTAZA	15				15
<b>Total</b>	<b>2.333</b>	<b>49</b>	<b>686</b>	<b>18</b>	<b>3.086</b>



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 45/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 45, 2018.**

**Desnutrición Aguda Moderada**

**MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 45/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 45/ 2018**

Provincia	SE 01-44		SE 45		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	22,75%	542	0,71%	17	23,47%	559
PICHINCHA	13,18%	314	0,50%	12	13,69%	326
MANABI	9,61%	229	0,04%	1	9,66%	230
ESMERALDAS	9,11%	217			9,11%	217
EL ORO	5,08%	121			5,08%	121
CHIMBORAZO	4,07%	97	0,08%	2	4,16%	99
COTOPAXI	3,86%	92	0,08%	2	3,95%	94
MORONA SANTIAGO	2,85%	68			2,85%	68
TUNGURAHUA	2,60%	62	0,04%	1	2,64%	63
LOJA	2,52%	60	0,08%	2	2,60%	62
CAÑAR	2,56%	61			2,56%	61
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,56%	61			2,56%	61
ORELLANA	2,35%	56	0,17%	4	2,52%	60
NAPO	2,27%	54	0,04%	1	2,31%	55
SANTA ELENA	2,31%	55			2,31%	55
SUCUMBIO	1,97%	47			1,97%	47
LOS RIOS	1,81%	43	0,08%	2	1,89%	45
IMBABURA	1,64%	39			1,64%	39
AZUAY	1,22%	29	0,13%	3	1,34%	32
BOLIVAR	1,05%	25			1,05%	25
ZAMORA CHINCHIPE	1,05%	25			1,05%	25
CARCHI	0,88%	21	0,08%	2	0,97%	23
PASTAZA	0,63%	15			0,63%	15
<b>Total</b>	<b>97,94%</b>	<b>2.333</b>	<b>2,06%</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.382</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Desnutrición Aguda Severa**

**MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 45 / 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 45 / 2018**

Provincia	SE 01-44		SE 45		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,62%	114	33,33%	6	17,05%	120
MANABI	12,68%	87	5,56%	1	12,50%	88
ESMERALDAS	11,37%	78			11,08%	78
PICHINCHA	7,87%	54			7,67%	54
NAPO	6,41%	44	11,11%	2	6,53%	46
CHIMBORAZO	5,83%	40			5,68%	40
EL ORO	4,81%	33			4,69%	33
ORELLANA	3,64%	25	11,11%	2	3,84%	27
SANTA ELENA	3,64%	25	5,56%	1	3,69%	26
SANTO DOMINGO DE ..	3,64%	25			3,55%	25
SUCUMBIO	2,92%	20			2,84%	20
ZAMORA CHINCHIPE	2,77%	19			2,70%	19
MORONA SANTIAGO	2,62%	18			2,56%	18
LOS RIOS	2,33%	16			2,27%	16
IMBABURA	2,04%	14	5,56%	1	2,13%	15
TUNGURAHUA	1,90%	13	5,56%	1	1,99%	14
CARCHI	1,60%	11	11,11%	2	1,85%	13
LOJA	1,90%	13			1,85%	13
CAÑAR	1,75%	12			1,70%	12
AZUAY	1,46%	10	5,56%	1	1,56%	11
BOLIVAR	1,17%	8			1,14%	8
COTOPAXI	1,02%	7	5,56%	1	1,14%	8
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>686</b>	<b>100,00%</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>	<b>704</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 45, 2018**

Base de datos extraída: 13/ 11 /2018. 15:00 pm

**Mujer embarazada con bajo peso**

**Definición.-** Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

**MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 45/ 2018**




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 45/ 2018**

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-44	SE 45	SE 01-44	SE 45	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,76%	18,67%	952	14	25,62%	966		
PICHINCHA	14,88%	21,33%	550	16	15,01%	566		
LOS RIOS	6,90%	5,33%	255	4	6,87%	259		
ESMERALDAS	6,28%		232		6,15%	232		
MANABI	6,14%	5,33%	227	4	6,13%	231		
SANTA ELENA	5,87%	13,33%	217	10	6,02%	227		
CAÑAR	5,11%	8,00%	189	6	5,17%	195		
EL ORO	4,76%	4,00%	176	3	4,75%	179		
AZUAY	3,19%	6,67%	118	5	3,26%	123		
TUNGURAHUA	2,76%		102		2,70%	102		
ZAMORA CHIN..	2,19%	1,33%	81	1	2,17%	82		
BOLIVAR	2,16%	12,00%	80	9	2,36%	89		
CHIMBORAZO	2,14%		79		2,09%	79		
LOJA	1,95%		72		1,91%	72		
SUCUMBIOS	1,84%	1,33%	68	1	1,83%	69		
COTOPAXI	1,30%		48		1,27%	48		
IMBABURA	1,24%		46		1,22%	46		
ORELLANA	1,27%		47		1,25%	47		
SANTO DOMIN..	1,22%		45		1,19%	45		
MORONA SAN..	1,27%	1,33%	47	1	1,27%	48		
CARCHI	0,95%		35		0,93%	35		
NAPO	0,76%		28		0,74%	28		
PASTAZA	0,05%	1,33%	2	1	0,08%	3		
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.696</b>	<b>75</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.771</b>		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 45/2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**NOTA ACLARATORIA:** El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.