



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 47 / 2018.

Base de datos extraída: 27/11/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 47 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 47 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-46	SE 47	SE 01-46	SE 47	
GUAYAS	580	14	122	4	720
PICHINCHA	337	7	56	3	403
MANABI	233	13	91	2	339
ESMERALDAS	222	1	78		301
EL ORO	122		33	1	156
CHIMBORAZO	100		41	1	142
COTOPAXI	97		10	1	108
NAPO	55		47		102
MORONA SANTIAGO	74	1	19	2	96
SANTA ELENA	58	7	27	2	94
SANTO DOMINGO DE LOS T..	65		25	3	93
ORELLANA	61	3	27		91
TUNGURAHUA	63		16		79
LOJA	64		13		77
SUCUMBIOS	50	2	22	1	75
CAÑAR	61		12		73
LOS RIOS	47		16		63
IMBABURA	39		15	1	55
ZAMORA CHINCHIPE	25	2	20		47
AZUAY	32	1	11		44
BOLIVAR	28	1	8		37
CARCHI	24		13		37
PASTAZA	15				15
Total	2.452	52	722	21	3.247



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 47/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 47, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 47/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 47/ 2018

Provincia	SE 01-46		SE 47		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,16%	580	0,56%	14	23,72%	594
PICHINCHA	13,46%	337	0,28%	7	13,74%	344
MANABI	9,31%	233	0,52%	13	9,82%	246
ESMERALDAS	8,87%	222	0,04%	1	8,91%	223
EL ORO	4,87%	122			4,87%	122
CHIMBORAZO	3,99%	100			3,99%	100
COTOPAXI	3,87%	97			3,87%	97
MORONA SANTIAGO	2,96%	74	0,04%	1	3,00%	75
SANTA ELENA	2,32%	58	0,28%	7	2,60%	65
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,60%	65			2,60%	65
LOJA	2,56%	64			2,56%	64
ORELLANA	2,44%	61	0,12%	3	2,56%	64
TUNGURAHUA	2,52%	63			2,52%	63
CAÑAR	2,44%	61			2,44%	61
NAPO	2,20%	55			2,20%	55
SUCUMBIO	2,00%	50	0,08%	2	2,08%	52
LOS RIOS	1,88%	47			1,88%	47
IMBABURA	1,56%	39			1,56%	39
AZUAY	1,28%	32	0,04%	1	1,32%	33
BOLIVAR	1,12%	28	0,04%	1	1,16%	29
ZAMORA CHINCHIPE	1,00%	25	0,08%	2	1,08%	27
CARCHI	0,96%	24			0,96%	24
PASTAZA	0,60%	15			0,60%	15
Total	97,92%	2.452	2,08%	52	100,00%	2.504

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 47 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 47 / 2018

Provincia	SE 01-46		SE 47		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,90%	122	19,05%	4	16,96%	126
MANABI	12,60%	91	9,52%	2	12,52%	93
ESMERALDAS	10,80%	78			10,50%	78
PICHINCHA	7,76%	56	14,29%	3	7,94%	59
NAPO	6,51%	47			6,33%	47
CHIMBORAZO	5,68%	41	4,76%	1	5,65%	42
EL ORO	4,57%	33	4,76%	1	4,58%	34
SANTA ELENA	3,74%	27	9,52%	2	3,90%	29
SANTO DOMINGO DE ..	3,46%	25	14,29%	3	3,77%	28
ORELLANA	3,74%	27			3,63%	27
SUCUMBIO	3,05%	22	4,76%	1	3,10%	23
MORONA SANTIAGO	2,63%	19	9,52%	2	2,83%	21
ZAMORA CHINCHIPE	2,77%	20			2,69%	20
IMBABURA	2,08%	15	4,76%	1	2,15%	16
LOS RIOS	2,22%	16			2,15%	16
TUNGURAHUA	2,22%	16			2,15%	16
CARCHI	1,80%	13			1,75%	13
LOJA	1,80%	13			1,75%	13
CAÑAR	1,66%	12			1,62%	12
AZUAY	1,52%	11			1,48%	11
COTOPAXI	1,39%	10	4,76%	1	1,48%	11
BOLIVAR	1,11%	8			1,08%	8
Total	100,00%	722	100,00%	21	100,00%	743

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 47, 2018

Base de datos extraída: 27/ 11 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 47/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 47/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-46	SE 47	SE 01-46	SE 47	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,78%	9,26%	1.001	5	25,55%	1.006		
PICHINCHA	14,96%	12,96%	581	7	14,94%	588		
LOS RIOS	6,90%	11,11%	268	6	6,96%	274		
ESMERALDAS	6,03%	5,56%	234	3	6,02%	237		
MANABI	6,18%	12,96%	240	7	6,27%	247		
SANTA ELENA	6,08%	5,56%	236	3	6,07%	239		
CAÑAR	5,10%	5,56%	198	3	5,11%	201		
EL ORO	4,74%	1,85%	184	1	4,70%	185		
AZUAY	3,27%	1,85%	127	1	3,25%	128		
TUNGURAHUA	2,68%	9,26%	104	5	2,77%	109		
ZAMORA CHIN..	2,14%	1,85%	83	1	2,13%	84		
BOLIVAR	2,32%	7,41%	90	4	2,39%	94		
CHIMBORAZO	2,03%		79		2,01%	79		
LOJA	1,91%		74		1,88%	74		
SUCUMBIOS	1,88%	5,56%	73	3	1,93%	76		
COTOPAXI	1,29%		50		1,27%	50		
IMBABURA	1,24%	1,85%	48	1	1,24%	49		
ORELLANA	1,26%		49		1,24%	49		
SANTO DOMIN..	1,16%	3,70%	45	2	1,19%	47		
MORONA SAN..	1,31%		51		1,30%	51		
CARCHI	0,93%	1,85%	36	1	0,94%	37		
NAPO	0,72%		28		0,71%	28		
PASTAZA	0,10%	1,85%	4	1	0,13%	5		
Total	100,00%	100,00%	3.883	54	100,00%	3.937		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 47/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.