



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 48 / 2018.

Base de datos extraída: 04/12/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 48 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 48 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-47	SE 48	SE 01-47	SE 48	
GUAYAS	601	14	126	11	752
PICHINCHA	346	10	60	1	417
MANABI	246	4	92	1	343
ESMERALDAS	223	3	79		305
EL ORO	122		35		157
CHIMBORAZO	101		42		143
COTOPAXI	97	3	11		111
NAPO	55		48		103
MORONA SANTIAGO	77	2	21		100
SANTA ELENA	65		29		94
SANTO DOMINGO DE LOS T..	65		28		93
ORELLANA	64		27		91
TUNGURAHUA	63		16		79
LOJA	64		13		77
SUCUMBIOS	52		23		75
CAÑAR	61		12		73
LOS RIOS	47	1	16		64
IMBABURA	39	1	16	1	57
ZAMORA CHINCHIPE	27		20		47
AZUAY	33	1	11	1	46
CARCHI	24		13	1	38
BOLIVAR	29		8		37
PASTAZA	16	1			17
Total	2.517	40	746	16	3.319



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 48/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 48, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 48/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 48/ 2018

Provincia	SE 01-47		SE 48		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,50%	601	0,55%	14	24,05%	615
PICHINCHA	13,53%	346	0,39%	10	13,92%	356
MANABI	9,62%	246	0,16%	4	9,78%	250
ESMERALDAS	8,72%	223	0,12%	3	8,84%	226
EL ORO	4,77%	122			4,77%	122
CHIMBORAZO	3,95%	101			3,95%	101
COTOPAXI	3,79%	97	0,12%	3	3,91%	100
MORONA SANTIAGO	3,01%	77	0,08%	2	3,09%	79
SANTA ELENA	2,54%	65			2,54%	65
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,54%	65			2,54%	65
LOJA	2,50%	64			2,50%	64
ORELLANA	2,50%	64			2,50%	64
TUNGURAHUA	2,46%	63			2,46%	63
CAÑAR	2,39%	61			2,39%	61
NAPO	2,15%	55			2,15%	55
SUCUMBIO	2,03%	52			2,03%	52
LOS RIOS	1,84%	47	0,04%	1	1,88%	48
IMBABURA	1,53%	39	0,04%	1	1,56%	40
AZUAY	1,29%	33	0,04%	1	1,33%	34
BOLIVAR	1,13%	29			1,13%	29
ZAMORA CHINCHIPE	1,06%	27			1,06%	27
CARCHI	0,94%	24			0,94%	24
PASTAZA	0,63%	16	0,04%	1	0,66%	17
Total	98,44%	2.517	1,56%	40	100,00%	2.557

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 48 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 48 / 2018

Provincia	SE 01-47		SE 48		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	16,89%	126	68,75%	11	17,98%	137
MANABI	12,33%	92	6,25%	1	12,20%	93
ESMERALDAS	10,59%	79			10,37%	79
PICHINCHA	8,04%	60	6,25%	1	8,01%	61
NAPO	6,43%	48			6,30%	48
CHIMBORAZO	5,63%	42			5,51%	42
EL ORO	4,69%	35			4,59%	35
SANTA ELENA	3,89%	29			3,81%	29
SANTO DOMINGO DE ...	3,75%	28			3,67%	28
ORELLANA	3,62%	27			3,54%	27
SUCUMBIO	3,08%	23			3,02%	23
MORONA SANTIAGO	2,82%	21			2,76%	21
ZAMORA CHINCHIPE	2,68%	20			2,62%	20
IMBABURA	2,14%	16	6,25%	1	2,23%	17
LOS RIOS	2,14%	16			2,10%	16
TUNGURAHUA	2,14%	16			2,10%	16
CARCHI	1,74%	13	6,25%	1	1,84%	14
LOJA	1,74%	13			1,71%	13
AZUAY	1,47%	11	6,25%	1	1,57%	12
CAÑAR	1,61%	12			1,57%	12
COTOPAXI	1,47%	11			1,44%	11
BOLIVAR	1,07%	8			1,05%	8
Total	100,00%	746	100,00%	16	100,00%	762

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 48, 2018

Base de datos extraída: 04/ 12 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 48/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 48/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-47	SE 48	SE 01-47	SE 48	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,68%	23,81%	1.015	15	25,65%	1.030		
PICHINCHA	14,93%	11,11%	590	7	14,87%	597		
LOS RIOS	6,93%	7,94%	274	5	6,95%	279		
ESMERALDAS	6,02%	3,17%	238	2	5,98%	240		
MANABI	6,22%	11,11%	246	7	6,30%	253		
SANTA ELENA	6,05%	4,76%	239	3	6,03%	242		
CAÑAR	5,08%	9,52%	201	6	5,15%	207		
EL ORO	4,68%		185		4,61%	185		
AZUAY	3,26%	1,59%	129	1	3,24%	130		
TUNGURAHUA	2,76%		109		2,71%	109		
ZAMORA CHIN..	2,15%	1,59%	85	1	2,14%	86		
BOLIVAR	2,38%	1,59%	94	1	2,37%	95		
CHIMBORAZO	2,05%	3,17%	81	2	2,07%	83		
LOJA	1,87%	7,94%	74	5	1,97%	79		
SUCUMBIOS	1,95%		77		1,92%	77		
COTOPAXI	1,26%	3,17%	50	2	1,29%	52		
IMBABURA	1,24%		49		1,22%	49		
ORELLANA	1,24%	3,17%	49	2	1,27%	51		
SANTO DOMIN..	1,19%	1,59%	47	1	1,20%	48		
MORONA SAN..	1,29%	4,76%	51	3	1,34%	54		
CARCHI	0,94%		37		0,92%	37		
NAPO	0,71%		28		0,70%	28		
PASTAZA	0,13%		5		0,12%	5		
Total	100,00%	100,00%	3.953	63	100,00%	4.016		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 48/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.