



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 49 / 2018.

Base de datos extraída: 11/12/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 49 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 49 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-48	SE 49	SE 01-48	SE 49	
GUAYAS	617	15	137	8	777
PICHINCHA	357	3	61		421
MANABI	250	3	93	2	348
ESMERALDAS	227		79		306
EL ORO	122		35		157
CHIMBORAZO	103	3	42	1	149
COTOPAXI	101	1	11		113
MORONA SANTIAGO	81	2	21	1	105
NAPO	57		48		105
ORELLANA	64	7	27	1	99
SANTA ELENA	65	2	30		97
SANTO DOMINGO DE LOS T..	65	1	28		94
TUNGURAHUA	63	2	16		81
LOJA	64		13		77
SUCUMBIOS	52		23		75
CAÑAR	61		12		73
LOS RIOS	48	2	16		66
IMBABURA	40	3	17		60
ZAMORA CHINCHIPE	27	1	20		48
AZUAY	34		12		46
BOLIVAR	29	1	8		38
CARCHI	24		14		38
PASTAZA	17				17
Total	2.568	46	763	13	3.390



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 49/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 49, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 49/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 49/ 2018

Provincia	SE 01-48		SE 49		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,60%	617	0,57%	15	24,18%	632
PICHINCHA	13,66%	357	0,11%	3	13,77%	360
MANABI	9,56%	250	0,11%	3	9,68%	253
ESMERALDAS	8,68%	227			8,68%	227
EL ORO	4,67%	122			4,67%	122
CHIMBORAZO	3,94%	103	0,11%	3	4,06%	106
COTOPAXI	3,86%	101	0,04%	1	3,90%	102
MORONA SANTIAGO	3,10%	81	0,08%	2	3,18%	83
ORELLANA	2,45%	64	0,27%	7	2,72%	71
SANTA ELENA	2,49%	65	0,08%	2	2,56%	67
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,49%	65	0,04%	1	2,52%	66
TUNGURAHUA	2,41%	63	0,08%	2	2,49%	65
LOJA	2,45%	64			2,45%	64
CAÑAR	2,33%	61			2,33%	61
NAPO	2,18%	57			2,18%	57
SUCUMBIO	1,99%	52			1,99%	52
LOS RIOS	1,84%	48	0,08%	2	1,91%	50
IMBABURA	1,53%	40	0,11%	3	1,64%	43
AZUAY	1,30%	34			1,30%	34
BOLIVAR	1,11%	29	0,04%	1	1,15%	30
ZAMORA CHINCHIPE	1,03%	27	0,04%	1	1,07%	28
CARCHI	0,92%	24			0,92%	24
PASTAZA	0,65%	17			0,65%	17
Total	98,24%	2.568	1,76%	46	100,00%	2.614

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 49 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 49 / 2018

Provincia	SE 01-48		SE 49		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	17,96%	137	61,54%	8	18,69%	145
MANABI	12,19%	93	15,38%	2	12,24%	95
ESMERALDAS	10,35%	79			10,18%	79
PICHINCHA	7,99%	61			7,86%	61
NAPO	6,29%	48			6,19%	48
CHIMBORAZO	5,50%	42	7,69%	1	5,54%	43
EL ORO	4,59%	35			4,51%	35
SANTA ELENA	3,93%	30			3,87%	30
ORELLANA	3,54%	27	7,69%	1	3,61%	28
SANTO DOMINGO DE ..	3,67%	28			3,61%	28
SUCUMBIO	3,01%	23			2,96%	23
MORONA SANTIAGO	2,75%	21	7,69%	1	2,84%	22
ZAMORA CHINCHIPE	2,62%	20			2,58%	20
IMBABURA	2,23%	17			2,19%	17
LOS RIOS	2,10%	16			2,06%	16
TUNGURAHUA	2,10%	16			2,06%	16
CARCHI	1,83%	14			1,80%	14
LOJA	1,70%	13			1,68%	13
AZUAY	1,57%	12			1,55%	12
CAÑAR	1,57%	12			1,55%	12
COTOPAXI	1,44%	11			1,42%	11
BOLIVAR	1,05%	8			1,03%	8
Total	100,00%	763	100,00%	13	100,00%	776

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 49, 2018

Base de datos extraída: 11/ 12 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 49/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 49/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-48	SE 49	SE 01-48	SE 49	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,62%	16,33%	1.030	8	25,51%	1.038		
PICHINCHA	14,90%	16,33%	599	8	14,92%	607		
LOS RIOS	6,94%	6,12%	279	3	6,93%	282		
ESMERALDAS	5,97%	2,04%	240	1	5,92%	241		
MANABI	6,29%	12,24%	253	6	6,37%	259		
SANTA ELENA	6,02%	6,12%	242	3	6,02%	245		
CAÑAR	5,15%	4,08%	207	2	5,14%	209		
EL ORO	4,60%	4,08%	185	2	4,60%	187		
AZUAY	3,23%		130		3,19%	130		
TUNGURAHUA	2,71%		109		2,68%	109		
ZAMORA CHIN..	2,14%	8,16%	86	4	2,21%	90		
BOLIVAR	2,39%	4,08%	96	2	2,41%	98		
CHIMBORAZO	2,09%	6,12%	84	3	2,14%	87		
LOJA	1,97%	4,08%	79	2	1,99%	81		
SUCUMBIOS	1,92%	2,04%	77	1	1,92%	78		
COTOPAXI	1,29%		52		1,28%	52		
IMBABURA	1,22%		49		1,20%	49		
ORELLANA	1,27%	4,08%	51	2	1,30%	53		
SANTO DOMIN..	1,19%		48		1,18%	48		
MORONA SAN..	1,34%	2,04%	54	1	1,35%	55		
CARCHI	0,92%	2,04%	37	1	0,93%	38		
NAPO	0,70%		28		0,69%	28		
PASTAZA	0,12%		5		0,12%	5		
Total	100,00%	100,00%	4.020	49	100,00%	4.069		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 49/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.