



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 50 / 2018.

Base de datos extraída: 18/12/2018. 15:00 pm

### DEFINICIONES OPERACIONALES

#### Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

**Desnutrición aguda moderada:** Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

**Desnutrición aguda severa:** todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 50 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 50 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-49	SE 50	SE 01-49	SE 50	
GUAYAS	632	6	145	1	784
PICHINCHA	361	6	61	1	429
MANABI	253	2	95	1	351
ESMERALDAS	229		79		308
EL ORO	124		35		159
CHIMBORAZO	106		43		149
COTOPAXI	102	3	11	1	117
MORONA SANTIAGO	86	2	22	1	111
NAPO	58		49		107
ORELLANA	72		28		100
SANTA ELENA	67	1	30		98
SANTO DOMINGO DE LOS T..	67	2	28		97
TUNGURAHUA	65		16		81
LOJA	64	1	13		78
SUCUMBIOS	52		23		75
CAÑAR	61	1	12		74
LOS RIOS	50	1	16		67
IMBABURA	43	1	17		61
ZAMORA CHINCHIPE	29	1	20	1	51
AZUAY	34		12		46
CARCHI	24	1	14		39
BOLIVAR	30		8		38
PASTAZA	17				17
Total	2.626	28	777	6	3.437



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 50/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 50, 2018.**

**Desnutrición Aguda Moderada**

**MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 50/ 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 50/ 2018**

Provincia	SE 01-49		SE 50		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,81%	632	0,23%	6	24,04%	638
PICHINCHA	13,60%	361	0,23%	6	13,83%	367
MANABI	9,53%	253	0,08%	2	9,61%	255
ESMERALDAS	8,63%	229			8,63%	229
EL ORO	4,67%	124			4,67%	124
CHIMBORAZO	3,99%	106			3,99%	106
COTOPAXI	3,84%	102	0,11%	3	3,96%	105
MORONA SANTIAGO	3,24%	86	0,08%	2	3,32%	88
ORELLANA	2,71%	72			2,71%	72
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,52%	67	0,08%	2	2,60%	69
SANTA ELENA	2,52%	67	0,04%	1	2,56%	68
LOJA	2,41%	64	0,04%	1	2,45%	65
TUNGURAHUA	2,45%	65			2,45%	65
CAÑAR	2,30%	61	0,04%	1	2,34%	62
NAPO	2,19%	58			2,19%	58
SUCUMBIO	1,96%	52			1,96%	52
LOS RIOS	1,88%	50	0,04%	1	1,92%	51
IMBABURA	1,62%	43	0,04%	1	1,66%	44
AZUAY	1,28%	34			1,28%	34
BOLIVAR	1,13%	30			1,13%	30
ZAMORA CHINCHIPE	1,09%	29	0,04%	1	1,13%	30
CARCHI	0,90%	24	0,04%	1	0,94%	25
PASTAZA	0,64%	17			0,64%	17
<b>Total</b>	<b>98,94%</b>	<b>2.626</b>	<b>1,06%</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.654</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Desnutrición Aguda Severa**

**MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 50 / 2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 50 / 2018**

Provincia	SE 01-49		SE 50		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	18,66%	145	16,67%	1	18,65%	146
MANABI	12,23%	95	16,67%	1	12,26%	96
ESMERALDAS	10,17%	79			10,09%	79
PICHINCHA	7,85%	61	16,67%	1	7,92%	62
NAPO	6,31%	49			6,26%	49
CHIMBORAZO	5,53%	43			5,49%	43
EL ORO	4,50%	35			4,47%	35
SANTA ELENA	3,86%	30			3,83%	30
ORELLANA	3,60%	28			3,58%	28
SANTO DOMINGO DE ..	3,60%	28			3,58%	28
MORONA SANTIAGO	2,83%	22	16,67%	1	2,94%	23
SUCUMBIO	2,96%	23			2,94%	23
ZAMORA CHINCHIPE	2,57%	20	16,67%	1	2,68%	21
IMBABURA	2,19%	17			2,17%	17
LOS RIOS	2,06%	16			2,04%	16
TUNGURAHUA	2,06%	16			2,04%	16
CARCHI	1,80%	14			1,79%	14
LOJA	1,67%	13			1,66%	13
AZUAY	1,54%	12			1,53%	12
CAÑAR	1,54%	12			1,53%	12
COTOPAXI	1,42%	11	16,67%	1	1,53%	12
BOLIVAR	1,03%	8			1,02%	8
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>777</b>	<b>100,00%</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>783</b>

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 50, 2018**

Base de datos extraída: 18/ 12 /2018. 15:00 pm

**Mujer embarazada con bajo peso**

**Definición.-** Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

**MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 50/ 2018**




Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 50/ 2018**

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-49	SE 50	SE 01-49	SE 50	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,48%	23,33%	1.041	14	25,45%	1.055		
PICHINCHA	14,91%	10,00%	609	6	14,84%	615		
LOS RIOS	6,90%	6,67%	282	4	6,90%	286		
ESMERALDAS	5,95%	1,67%	243	1	5,89%	244		
MANABI	6,34%	10,00%	259	6	6,39%	265		
SANTA ELENA	6,00%	16,67%	245	10	6,15%	255		
CAÑAR	5,21%	5,00%	213	3	5,21%	216		
EL ORO	4,68%	1,67%	191	1	4,63%	192		
AZUAY	3,18%	1,67%	130	1	3,16%	131		
TUNGURAHUA	2,67%		109		2,63%	109		
ZAMORA CHIN..	2,20%	1,67%	90	1	2,20%	91		
BOLIVAR	2,40%		98		2,36%	98		
CHIMBORAZO	2,13%	3,33%	87	2	2,15%	89		
LOJA	1,98%	5,00%	81	3	2,03%	84		
SUCUMBIOS	1,91%	1,67%	78	1	1,91%	79		
COTOPAXI	1,27%		52		1,25%	52		
IMBABURA	1,20%	3,33%	49	2	1,23%	51		
ORELLANA	1,30%		53		1,28%	53		
SANTO DOMIN..	1,18%	1,67%	48	1	1,18%	49		
MORONA SAN..	1,37%	3,33%	56	2	1,40%	58		
CARCHI	0,93%	3,33%	38	2	0,97%	40		
NAPO	0,69%		28		0,68%	28		
PASTAZA	0,12%		5		0,12%	5		
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.085</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.145</b>		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 50/2018**



Fuente: Subsistema Sive-Alerta  
Elaborado: SSVE

**NOTA ACLARATORIA:** El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.