



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 51 / 2018.

Base de datos extraída: 28/12/2018. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 51 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 51 /2018


	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-50	SE 51	SE 01-50	SE 51	
GUAYAS	641	6	147	1	795
PICHINCHA	367	9	62	1	439
MANABI	255	1	96	1	353
ESMERALDAS	236	1	79		316
EL ORO	124		35		159
CHIMBORAZO	106		43		149
COTOPAXI	108	3	13		124
MORONA SANTIAGO	90	3	23		116
ORELLANA	75	4	28	6	113
NAPO	58		49		107
SANTA ELENA	68	3	30	1	102
SANTO DOMINGO DE LOS T..	69	1	28	1	99
TUNGURAHUA	67	3	16		86
LOJA	65	2	13		80
SUCUMBIOS	52		25	1	78
CAÑAR	62		12		74
LOS RIOS	51	1	16		68
IMBABURA	44		17		61
ZAMORA CHINCHIPE	30		21		51
AZUAY	34		12		46
CARCHI	25		14		39
BOLIVAR	30		8		38
PASTAZA	17				17
Total	2.674	37	787	12	3.510



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 51/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 51, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 51/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 51/ 2018

Provincia1	SE 01-50		SE 51		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,64%	641	0,22%	6	23,87%	647
PICHINCHA	13,54%	367	0,33%	9	13,87%	376
MANABI	9,41%	255	0,04%	1	9,44%	256
ESMERALDAS	8,71%	236	0,04%	1	8,74%	237
EL ORO	4,57%	124			4,57%	124
COTOPAXI	3,98%	108	0,11%	3	4,09%	111
CHIMBORAZO	3,91%	106			3,91%	106
MORONA SANTIAGO	3,32%	90	0,11%	3	3,43%	93
ORELLANA	2,77%	75	0,15%	4	2,91%	79
SANTA ELENA	2,51%	68	0,11%	3	2,62%	71
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,55%	69	0,04%	1	2,58%	70
TUNGURAHUA	2,47%	67	0,11%	3	2,58%	70
LOJA	2,40%	65	0,07%	2	2,47%	67
CAÑAR	2,29%	62			2,29%	62
NAPO	2,14%	58			2,14%	58
LOS RIOS	1,88%	51	0,04%	1	1,92%	52
SUCUMBIO	1,92%	52			1,92%	52
IMBABURA	1,62%	44			1,62%	44
AZUAY	1,25%	34			1,25%	34
BOLIVAR	1,11%	30			1,11%	30
ZAMORA CHINCHIPE	1,11%	30			1,11%	30
CARCHI	0,92%	25			0,92%	25
PASTAZA	0,63%	17			0,63%	17
Total	98,64%	2.674	1,36%	37	100,00%	2.711

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 51 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 51 / 2018

Provincia1	SE 01-50		SE 51		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	18,68%	147	8,33%	1	18,52%	148
MANABI	12,20%	96	8,33%	1	12,14%	97
ESMERALDAS	10,04%	79			9,89%	79
PICHINCHA	7,88%	62	8,33%	1	7,88%	63
NAPO	6,23%	49			6,13%	49
CHIMBORAZO	5,46%	43			5,38%	43
EL ORO	4,45%	35			4,38%	35
ORELLANA	3,56%	28	50,00%	6	4,26%	34
SANTA ELENA	3,81%	30	8,33%	1	3,88%	31
SANTO DOMINGO DE ..	3,56%	28	8,33%	1	3,63%	29
SUCUMBIO	3,18%	25	8,33%	1	3,25%	26
MORONA SANTIAGO	2,92%	23			2,88%	23
ZAMORA CHINCHIPE	2,67%	21			2,63%	21
IMBABURA	2,16%	17			2,13%	17
LOS RIOS	2,03%	16			2,00%	16
TUNGURAHUA	2,03%	16			2,00%	16
CARCHI	1,78%	14			1,75%	14
COTOPAXI	1,65%	13			1,63%	13
LOJA	1,65%	13			1,63%	13
AZUAY	1,52%	12			1,50%	12
CAÑAR	1,52%	12			1,50%	12
BOLIVAR	1,02%	8			1,00%	8
Total	100,00%	787	100,00%	12	100,00%	799

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 51, 2018

Base de datos extraída: 28/ 12 /2018. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 51/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 51/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-50	SE 51	SE 01-50	SE 51	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,68%	25,00%	1.070	10	25,68%	1.080		
PICHINCHA	14,81%	2,50%	617	1	14,69%	618		
LOS RIOS	6,87%	5,00%	286	2	6,85%	288		
ESMERALDAS	5,90%	5,00%	246	2	5,90%	248		
MANABI	6,36%	12,50%	265	5	6,42%	270		
SANTA ELENA	6,12%	5,00%	255	2	6,11%	257		
CAÑAR	5,18%	10,00%	216	4	5,23%	220		
EL ORO	4,61%	2,50%	192	1	4,59%	193		
AZUAY	3,17%	2,50%	132	1	3,16%	133		
TUNGURAHUA	2,62%	2,50%	109	1	2,62%	110		
ZAMORA CHIN..	2,21%	2,50%	92	1	2,21%	93		
BOLIVAR	2,35%	2,50%	98	1	2,35%	99		
CHIMBORAZO	2,14%		89		2,12%	89		
LOJA	2,02%	5,00%	84	2	2,04%	86		
SUCUMBIOS	1,90%		79		1,88%	79		
COTOPAXI	1,20%	5,00%	50	2	1,24%	52		
IMBABURA	1,22%	2,50%	51	1	1,24%	52		
ORELLANA	1,27%		53		1,26%	53		
SANTO DOMIN..	1,18%		49		1,17%	49		
MORONA SAN..	1,42%	5,00%	59	2	1,45%	61		
CARCHI	0,96%	5,00%	40	2	1,00%	42		
NAPO	0,67%		28		0,67%	28		
PASTAZA	0,14%		6		0,14%	6		
Total	100,00%	100,00%	4.166	40	100,00%	4.206		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 51/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.