



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 52 / 2018.

Base de datos extraída: 03/01/2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 52 /2018 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 52 /2018

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-51	SE 52	SE 01-51	SE 52	
GUAYAS	653	10	149		812
PICHINCHA	377		65		442
MANABI	257	3	97	1	358
ESMERALDAS	237		79		316
EL ORO	124	1	35	1	161
CHIMBORAZO	106		43		149
COTOPAXI	111		13	1	125
MORONA SANTIAGO	93		23	2	118
ORELLANA	79	2	34		115
NAPO	59		49		108
SANTA ELENA	71		31		102
SANTO DOMINGO DE LOS T..	70	1	29	1	101
TUNGURAHUA	70		16		86
LOJA	67		13		80
SUCUMBIOS	53		26		79
CAÑAR	62		12		74
LOS RIOS	52		16		68
IMBABURA	44		17		61
ZAMORA CHINCHIPE	30		22		52
AZUAY	35		12		47
BOLIVAR	30	1	8		39
CARCHI	25		14		39
PASTAZA	17				17
Total	2.722	18	803	6	3.549



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 52/2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 52, 2018.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 52/ 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 52/ 2018

Provincia1	SE 01-51		SE 52		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	23,83%	653	0,36%	10	24,20%	663
PICHINCHA	13,76%	377			13,76%	377
MANABI	9,38%	257	0,11%	3	9,49%	260
ESMERALDAS	8,65%	237			8,65%	237
EL ORO	4,53%	124	0,04%	1	4,56%	125
COTOPAXI	4,05%	111			4,05%	111
CHIMBORAZO	3,87%	106			3,87%	106
MORONA SANTIAGO	3,39%	93			3,39%	93
ORELLANA	2,88%	79	0,07%	2	2,96%	81
SANTA ELENA	2,59%	71			2,59%	71
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2,55%	70	0,04%	1	2,59%	71
TUNGURAHUA	2,55%	70			2,55%	70
LOJA	2,45%	67			2,45%	67
CAÑAR	2,26%	62			2,26%	62
NAPO	2,15%	59			2,15%	59
SUCUMBIO	1,93%	53			1,93%	53
LOS RIOS	1,90%	52			1,90%	52
IMBABURA	1,61%	44			1,61%	44
AZUAY	1,28%	35			1,28%	35
BOLIVAR	1,09%	30	0,04%	1	1,13%	31
ZAMORA CHINCHIPE	1,09%	30			1,09%	30
CARCHI	0,91%	25			0,91%	25
PASTAZA	0,62%	17			0,62%	17
Total	99,34%	2.722	0,66%	18	100,00%	2.740

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 52 / 2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 52 / 2018

Provincia1	SE 01-51		SE 52		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
GUAYAS	18,56%	149			18,42%	149
MANABI	12,08%	97	16,67%	1	12,11%	98
ESMERALDAS	9,84%	79			9,77%	79
PICHINCHA	8,09%	65			8,03%	65
NAPO	6,10%	49			6,06%	49
CHIMBORAZO	5,35%	43			5,32%	43
EL ORO	4,36%	35	16,67%	1	4,45%	36
ORELLANA	4,23%	34			4,20%	34
SANTA ELENA	3,86%	31			3,83%	31
SANTO DOMINGO DE ..	3,61%	29	16,67%	1	3,71%	30
SUCUMBIO	3,24%	26			3,21%	26
MORONA SANTIAGO	2,86%	23	33,33%	2	3,09%	25
ZAMORA CHINCHIPE	2,74%	22			2,72%	22
IMBABURA	2,12%	17			2,10%	17
LOS RIOS	1,99%	16			1,98%	16
TUNGURAHUA	1,99%	16			1,98%	16
CARCHI	1,74%	14			1,73%	14
COTOPAXI	1,62%	13	16,67%	1	1,73%	14
LOJA	1,62%	13			1,61%	13
AZUAY	1,49%	12			1,48%	12
CAÑAR	1,49%	12			1,48%	12
BOLIVAR	1,00%	8			0,99%	8
Total	100,00%	803	100,00%	6	100,00%	809

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 52, 2018

Base de datos extraída: 03/ 01 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 52/ 2018




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 52/ 2018

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-51	SE 52	SE 01-51	SE 52	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	25,69%	9,09%	1.083	3	25,56%	1.086		
PICHINCHA	14,71%		620		14,60%	620		
LOS RIOS	6,83%	3,03%	288	1	6,80%	289		
ESMERALDAS	5,91%	3,03%	249	1	5,89%	250		
MANABI	6,41%	9,09%	270	3	6,43%	273		
SANTA ELENA	6,10%	12,12%	257	4	6,14%	261		
CAÑAR	5,22%	21,21%	220	7	5,34%	227		
EL ORO	4,58%		193		4,54%	193		
AZUAY	3,16%		133		3,13%	133		
TUNGURAHUA	2,61%		110		2,59%	110		
ZAMORA CHIN..	2,25%	3,03%	95	1	2,26%	96		
BOLIVAR	2,35%	6,06%	99	2	2,38%	101		
CHIMBORAZO	2,11%		89		2,10%	89		
LOJA	2,04%	18,18%	86	6	2,17%	92		
SUCUMBIOS	1,87%		79		1,86%	79		
COTOPAXI	1,23%		52		1,22%	52		
IMBABURA	1,23%		52		1,22%	52		
ORELLANA	1,26%	15,15%	53	5	1,37%	58		
SANTO DOMIN..	1,16%		49		1,15%	49		
MORONA SAN..	1,47%		62		1,46%	62		
CARCHI	1,00%		42		0,99%	42		
NAPO	0,66%		28		0,66%	28		
PASTAZA	0,14%		6		0,14%	6		
Total	100,00%	100,00%	4.215	33	100,00%	4.248		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 52/2018



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.