



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE- ALERTA  
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  
ECUADOR, SE 1-28, 2019



Actualizado: 18/07/2019

## INTRODUCCIÓN

Las enfermedades que causan un gran impacto en salud pública, son las enfermedades inmunoprevenibles, aquellas que pueden prevenirse con el uso de las vacunas. Actualmente se ha logrado disminuir la carga de estas enfermedades y la mortalidad en la infancia por la introducción de las vacunas. Se ha conseguido erradicar la viruela, próximamente la poliomielitis y se tienen como objetivo la eliminación del Sarampión. De aquí la importancia de realizar de forma oportuna la vacunación a los niños, niñas, adolescentes y adultos acorde al esquema nacional establecido por la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI). En el Ecuador se realiza la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles como: Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Tosferina, Difteria, Meningitis Meningocócica, Poliomielitis, Tétanos, Varicela, Hepatitis B.

En el Ecuador el último caso registrado de Difteria fue en el año 2014 en Cotopaxi – Zumbahua, en el cual se aisló cepa no toxigénica de Difteria. En 1990, se reportó el último caso de Poliomielitis en el cantón Durán- Guayas. Todos los países de la Región de las Américas se encuentran en el proceso de ejecución del Plan Estratégico de Erradicación Mundial de la Poliomielitis 2013–2018. El último caso de rubeola que se presentó en el país fue en el 2004 en el cantón Cuenca- Azuay. El último caso de Tétanos neonatal fue notificado en el 2017 en el cantón Latacunga - Cotopaxi.

### Casos de enfermedades inmunoprevenibles reportados a nivel nacional. Ecuador. 2016 – 2019\*

Evento	2016	2017	2018	2019*
Varicela	11511	12469	13727	8792
Parotiditis	1352	1472	2685	1679
Hepatitis B	590	486	611	172
Tétanos	38	59	68	14
Tosferina	17	57	29	37
Meningitis Meningocócica	0	1	1	6
Sarampión	1	0	19	0
Tétanos Neonatal	1	1	0	0

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).

Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica.  
2019\* Información obtenida hasta la SE 28

### Enfermedades Inmunoprevenibles

#### Tabla de contenido:

1. Parotiditis
2. Varicela
3. Hepatitis B

### Tema Central:

#### Meningitis Meningocócica:

En la mayoría de los países, Neisseria Meningitidis (meningococo) es reconocida como la principal causa de meningitis y septicemia fulminante, como un problema importante de salud pública. Los datos limitados sugieren que en Asia, la mayoría de las enfermedades Meningocócica son causadas por meningococos que pertenecen al serogrupo A o C. La mayoría de las infecciones Meningocócica invasivas son causadas por organismos que expresan uno de los polisacáridos capsulares de serogrupo A, B, C, X, W135 o Y que pueden causar epidemias. Los meningococos de estos serogrupos tienen el potencial de causar enfermedades endémicas y brotes, pero su prevalencia relativa varía considerablemente con el tiempo y la ubicación geográfica. En el cinturón de la meningitis africana, que se considera que tiene la mayor incidencia anual de enfermedad meningocócica en el mundo el serogrupo A ha sido la causa más importante de la enfermedad, aunque los brotes causados por los serogrupos C y W135, y más recientemente por el serogrupo X, también se ha producido. (1)

En el Ecuador durante este año se han notificado 6 casos confirmados por laboratorio (INSPI) de meningitis meningocócica (Neisseria meningitidis). Los serogrupos encontrados por el laboratorio de referencia nacional (INSPI) fueron: 4 del C y 2 del B. En el año 2018 se reportó un caso confirmado de meningitis meningocócica del serogrupo C, y en los años 2013 y 2017 se reportan un caso de meningitis meningocócica del serogrupo B para cada año. El grupo etario más afectado dentro del periodo 2013 -2019 (hasta la SE 28) es en el grupo etario de 51 a 65 años con tres casos y de 21 – 50 años con dos casos. Para el año 2019, de los seis casos notificados corresponden a las edades de: 4 meses, 12, 18, 40, 52 y 64 años con 1 caso cada uno, existe un fallecido por meningitis meningocócica.

1. World Health Organisation. Weekly epidemiological record Meningococcal vaccines: Who position paper. PLoS Negl Trop Dis [Internet]. 2011;4(47):73–80. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2910704&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA




## INMUNOPREVENIBLES PAROTIDITIS CIE - 10 B26.0† <-> B26.9 Ecuador, SE 01-28, 2019

La parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible que afecta fundamentalmente a las glándulas salivales; si bien, antes de la introducción de la vacuna, se trata de una infección infantil benigna, cuya incidencia máxima se registraba entre los 5 a 9 años de edad, en la actualidad la presencia de casos de parotiditis se ha desplazado a grupos de mayor edad, con la particularidad que suele ser más grave al presentar mayor frecuencia de complicaciones. La encefalitis secundaria a parotiditis es rara (1 a 2 por cada 10 000 casos), pero puede dejar secuelas permanentes, como parálisis, convulsiones e hidrocefalia. La letalidad de esta encefalitis es de aproximadamente 1% (1). En el Ecuador para el año 2019 se cambia la modalidad de vigilancia de agrupada a individual con el fin de caracterizar epidemiológica a la enfermedad. En el año 2016 se reportaron 1344 casos de parotiditis, en el 2017 se notifican 1472 casos y en el 2018 se notificaron 2685 casos, alcanzando una tasa de incidencia de 15.70 por cada 100.00 habitantes en relación a los años anteriores 2016 y 2017, con 8.13 y 8.54 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En el 2019 hasta la SE 28 se reportan 1.679 casos de Parotiditis a nivel nacional. La provincia que reporta el mayor número de casos es Pichincha con 55.44% (931) de los casos notificados a nivel nacional. En la SE 28 se reportan 40 casos de parotiditis, siendo la provincia de Pichincha quien notifica el 60% (24 casos) de casos en esta semana. Los grupos de edad más afectados son de 16 a 20 años, seguido del grupo de 21 a 49.

Casos de Parotiditis, por provincia de atención Ecuador, semanas epidemiológicas 01 a 28, año 2019

Provincia	SE 01-27	SE 28	Total
PICHINCHA	907	24	931
MORONA SANTIAGO	119		119
TUNGURAHUA	107	8	115
GUAYAS	62	2	64
CHIMBORAZO	62	1	63
COTOPAXI	58		58
MANABI	52	1	53
NAPO	45	3	48
BOLIVAR	37		37
AZUAY	32		32
ORELLANA	27		27
SANTO DOMINGO DE LOS ..	20	1	21
CARCHI	19		19
ZAMORA CHINCHIPE	17		17
IMBABURA	16		16
PASTAZA	16		16
LOJA	11		11
ESMERALDAS	8		8
SUCUMBIOS	8		8
CAÑAR	5		5
SANTA ELENA	5		5
LOS RIOS	4		4
EL ORO	2		2
<b>Total</b>	<b>1.639</b>	<b>40</b>	<b>1.679</b>


Casos de Parotiditis, por provincia de atención Ecuador, año 2019 (hasta SE 01-28)



Fuente: SIVE-ALERTA


Fuente: SIVE-ALERTA

Caso de Parotiditis, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2019 (hasta SE 01-28)



Fuente: SIVE-ALERTA

Tendencia de B260-B269 Parotiditis infecciosa por semana epidemiológica (SE), años 2017 - 2019



1. Chin J, American Public Health Association. El control de las enfermedades transmisibles. Decimonove. L HD, editor. ops; 2011. 748 p



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## INMUNOPREVENIBLES VARICELA CIE-10 B01.0† <-> B01.9 Ecuador, SE 01 - 28, 2019


La varicela aunque es considerada una enfermedad benigna, en ocasiones puede presentarse complicaciones por la aparición de neumonía o encefalitis inducidas por el VZV, que a veces pueden llevar a secuelas persistentes o a la muerte; con una tasa de letalidad por 100 000 defunciones en los adultos sanos 30 a 40 veces mayor que en los niños de 5-9 años. La incidencia global de varicela en América Latina y el Caribe en menores de 15 años es de 42,9 casos por cada 1 000 individuos, con una mortalidad 0,5 muertes por millón de niños entre 5 y 14 años (1).

En el Ecuador, la modalidad de vigilancia de esta enfermedad es agrupada. Desde el año 2016 el número de casos reportados a nivel nacional fue de 11.439, para el año 2018 se reportan 13.769 casos, evidenciándose un incremento del 20.37% (2.330). En el 2019 hasta la SE 28 se han reportado 8.792 casos a nivel nacional, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la Provincia de Pichincha acumulando el 21.37% (1.879), de casos notificados a nivel nacional. Los casos de Varicela notificados en la SE 28 son 186 casos, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha con 52 casos, seguidos de Guayas con 31 casos. Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, de 5 a 10 años y de 21 a 49 años.

Casos de Varicela, por provincia de atención Ecuador, SE 01 a 28, año 2019


Provincia	SE 01-27	SE 28	Total
PICHINCHA	1.827	52	1.879
GUAYAS	1.512	31	1.543
MANABI	746	14	760
COTOPAXI	505	9	514
CHIMBORAZO	447	10	457
AZUAY	403	7	410
LOS RIOS	374	8	382
TUNGURAHUA	351	3	354
EL ORO	324	9	333
ESMERALDAS	301	2	303
SANTO DOMINGO DE LOS ..	257	10	267
IMBABURA	258	4	262
CAÑAR	197	4	201
MORONA SANTIAGO	169	1	170
LOJA	157	4	161
SUCUMBIOS	134	5	139
NAPO	125	5	130
ORELLANA	124	2	126
PASTAZA	113	2	115
SANTA ELENA	92	1	93
CARCHI	64	2	66
BOLIVAR	60	1	61
ZAMORA CHINCHIPE	53		53
GALAPAGOS	13		13
<b>Total general</b>	<b>8.606</b>	<b>186</b>	<b>8.792</b>

Casos de Varicela, por provincia de atención Ecuador, SE 01 a 28, año 2019




Fuente: SIVE-ALERTA

Caso de Varicela, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2019 (hasta SE 01-28)



Fuente: SIVE-ALERTA

Tendencia de B010-B019 Varicela por semana epidemiológica (SE), años 2017 - 2019



1. Aranguren Segura SL, Zuleta Dueñas LP, Castañeda-Porras O. Situación epidemiológica de la Varicela, Casanare (Colombia), 2010-2014 TT - Epidemiological situation of varicella at Casanare (Colombia), 2010-2014. Rev Salud Uninorte [Internet]. 2017;33(3):336-43. Available from: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-55522017000300336&lang=es%0Ahttp://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-753](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522017000300336&lang=es%0Ahttp://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-753).



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



## INMUNOPREVENIBLES HEPATITIS B CIE - 10 B16.0 <-> B16.9 Ecuador, SE 01-28, 2019

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial.

La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados.

En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1).

En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se la realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual.


En el 2019 hasta la SE 28, se reporta 172 casos de Hepatitis B, de los cuales la provincia de Pichincha notifica el 32,55% (56 casos) del total a nivel nacional. En la SE 28 se notifica 3 casos.

El grupo de edad más afectado es el de 21 a 49 años de edad. ...

Casos de Hepatitis B, por provincia de atención Ecuador, semanas epidemiológicas 01 a 28, año 2019


Provincia	SE 01-27	SE 28	Total
PICHINCHA	55	1	56
ESMERALDAS	23	2	25
MORONA SANTIAGO	17		17
GUAYAS	12		12
PASTAZA	11		11
NAPO	10		10
LOS RIOS	9		9
SANTA ELENA	6		6
ORELLANA	5		5
COTOPAXI	4		4
MANABI	4		4
TUNGURAHUA	4		4
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	3		3
SUCUMBIOS	2		2
AZUAY	1		1
BOLIVAR	1		1
EL ORO	1		1
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>172</b>

Casos de Hepatitis B, por provincia de atención Ecuador, año 2019 (hasta SE 01-28)



Fuente: SIVE-ALERTA

Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2019 (hasta SE 01-28)



Fuente: SIVE-ALERTA

1. Organización Mundial de la Salud. Hepatitis B [Internet]. OPS/OMS. 2018. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>