

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

SE 08 ECUADOR 2022

INTRODUCCIÓN

La prevención de enfermedades infecciosas mediante la inmunización se considera como uno de los mayores logros de la Salud Pública. Actualmente se ha logrado disminuir la carga de las enfermedades prevenibles por vacunación así como la mortalidad en la infancia. Durante el 2010, se ha administrado tres dosis de vacuna contra la Difteria, el Tétanos y la Tosferina (DTP3) al 85% de los lactantes de todo el mundo (unos 116 millones), reciben vacunas para protegerlos contra enfermedades infecciosas que podrían provocar trastornos y discapacidades graves, e incluso la muerte. La cobertura global de polio en el 2020 fue del 83%, mientras que la cobertura en las Américas con IPV1 fue del 89% y 82% con Polio 3.

En tal virtud, en el Ecuador, se realiza de forma oportuna la vacunación a los niños/as, adolescentes y adultos acorde a la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), además realiza la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles como: Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Tosferina, Difteria, Meningitis Meningocócica, Poliomieltis, Tétanos, Varicela, Hepatitis B.

En el Ecuador, el último caso registrado de Difteria, se reportó en el año 2014, en Cotopaxi-Zumbahua, se aisló la cepa no toxigénica de Difteria. En 1990, se reportó el último caso de Poliomieltis en la provincia de Guayas cantón Durán. El último caso de rubeola que se presentó en el país fue en el 2004 en la provincia del Azuay cantón Cuenca y el último caso de Tétanos neonatal fue notificado en el 2017 en la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga. Hasta la SE 08 del año 2022 se reporta 1 caso de Tétanos a nivel nacional.

Casos de Enfermedades Inmunoprevenibles Nivel Nacional. Ecuador. 2017 – 2022

AÑO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
VARICELA	12.469	13.727	13.848	3.771	2.879	430
PAROTIDITIS	1.472	2.685	2.701	326	135	8
HEPATITIS B	486	611	344	144	144	13
TÉTANOS	59	68	14	3	5	1
TOSFERINA	57	29	57	5	0	0
MENINGITIS MENINGOCÓC..	1	1	8	4	1	0
SARAMPIÓN	0	19	0	0	0	0
TÉTANOS NEONATAL	1	0	0	0	0	0

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).

Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Datos 2021 en proceso de validación para el cierre

Datos 2022 correspondientes a la semana epidemiológica 08

Tabla de Contenidos:

1. Varicela
2. Parotiditis
3. Hepatitis B
4. Tétanos

Tema Central:

Hepatitis B

Infección vírica del hígado, que puede llevar a una infección crónica con alto riesgo de secuelas, como insuficiencia hepática, cirrosis o cáncer de hígado. Según la OMS aproximadamente 2.000 millones de personas se han infectado por el virus de la hepatitis B, y de ellos más de 360 millones son portadores crónicos del virus. La tasa de letalidad es de aproximadamente 1% y es más alta en las personas mayores de 40 años.¹

En el Ecuador, se han notificado en el año 2021, 144 casos confirmados de hepatitis B, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Los grupos de edad con más concentración de casos es el de 20 a 49 años, seguido de 50 a 64 años, con predominio en el sexo femenino.

Otras enfermedades prevenibles por vacuna

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, durante el año 2021 se ha notificado 1 caso de meningitis meningocócica en la provincia de Chimborazo.


No se han reportado casos confirmados de difteria y tosferina hasta en el año 2021.

Se mantiene la búsqueda activa de casos sospechosos de Enfermedad Febril Eruptiva No Vesicular (EFENV) y Parálisis Flácida Aguda (PFA).




La varicela es una enfermedad infecto-contagiosa ampliamente distribuida en el mundo, producida por el Virus Varicela-Zoster, de carácter benigno. Es en la actualidad, la infección exantemática más frecuente. Su presentación es endémica con períodos epidémicos con ciclos de 3-4 años. La incidencia global de varicela en América Latina y el Caribe en menores de 15 años fue de 42,9 casos por cada 1 000 individuos. La tasa de letalidad es menor en los niños (1por100.000 infectados del grupo de 5 a 9 años de edad) que en adultos (1 por cada 5000). Los grupos de riesgo de padecer varicela grave y sus complicaciones son los lactantes, adolescentes y adultos, las personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. En el Ecuador en el año 2021 se notificaron 2879 casos confirmados de varicela. Hasta la SE 08 del año 2022 se notificaron 430 casos de varicela a nivel nacional.

Casos de varicela por provincia			
Provincia	SE 07	SE 08	Total..
PICHINCHA	66	12	78
MORONA SANTIAGO	41	6	47
GUAYAS	38	4	42
COTOPAXI	23	4	27
AZUAY	16	4	20
PASTAZA	17	2	19
ORELLANA	17	2	19
IMBABURA	17	1	18
LOS RIOS	16	1	17
ESMERALDAS	10	7	17
EL ORO	16	1	17
NAPO	13	2	15
MANABI	14	1	15
TUNGURAHUA	11	3	14
SANTO DOMINGO DE LOS ..	11	3	14
CHIMBORAZO	10	0	10
CAÑAR	8	2	10
LOJA	8	0	8
SUCUMBIOS	5	1	6
SANTA ELENA	4	2	6
ZAMORA CHINCHIPE	4	0	4
CARCHI	4	0	4
BOLIVAR	2	0	2
GALAPAGOS	1	0	1
Total	372	58	430




Incidencia de varicela por semana epidemiológica



Tasa de casos de varicela por 10.000 habitantes

Provincia	Tasa
MORONA SANTIAGO	2,391
PASTAZA	1,664
ORELLANA	1,178
NAPO	1,122
COTOPAXI	0,552
IMBABURA	0,372
CAÑAR	0,337
ZAMORA CHINCHIPE	0,332
GALAPAGOS	0,303
ESMERALDAS	0,288
SANTO DOMINGO DE LOS TS...	0,274
SUCUMBIOS	0,260
PICHINCHA	0,242
EL ORO	0,238
TUNGURAHUA	0,237
AZUAY	0,227
CHIMBORAZO	0,191
LOS RIOS	0,184
LOJA	0,154
SANTA ELENA	0,150
GUAYAS	0,096
BOLIVAR	0,095
MANABI	0,094
Total	

Casos de varicela por sexo y grupo de edad SE 08



En la SE 08 el grupo etáreo con mayor incidencia de casos es el comprendido entre las edades de 1 a 4 años, seguida de por el grupo de 20 a 49 años ambos grupos con predominio en el sexo masculino.

En la SE 08 la provincia con la tasa más elevada es Morona Santiago con el 2,39 casos por cada 10000 habitantes, seguido de Pztaza (1,66), Orellana (1,1), OrellanaNapó (1,1).


Fuente: Sive - Alerta
Corte: 03 de marzo del 2022
*Datos sujetos a variaciones



El virus de la parotiditis se transmite por gotas respiratorias, incuba de 12 a 25 días, los síntomas se presentan de 16 a 18 días tras la exposición y el principal órgano afectado son las glándulas parótidas en las que se produce una inflamación local e intensa; la complicación más severa es la orquitis, la cual se presenta en hombres postpúberes.

La mayor incidencia de la enfermedad es en los menores de entre cinco y nueve años, pero también afecta a adultos, sobre todo en comunidades. La distribución de la enfermedad es mundial. Aunque ocurre en cualquier edad, el 85% de los casos clínicos ocurren en menores de 15 años, la mayoría entre los 5 y los 14 años.


En el Ecuador en el año 2021 se notificaron 135 casos confirmados de Parotiditis. **Hasta la SE 08 se notifican 8 casos de Parotiditis a nivel nacional.**

Casos de parotiditis por provincia			Distribución geográfica de casos de parotiditis por provincia	
Provincia	SE 01 a 07	Total		
PICHINCHA	3	3		
PASTAZA	2	2		
ORELLANA	1	1		
MANABI	1	1		
COTOPAXI	1	1		
Total	8	8		

Hasta la SE 08, se notifican 8 casos de parotiditis infecciosa a nivel nacional localizados en la provincia de Pichincha, Pastaza, Orellana, Manabí y Cotopaxi.


Hasta la SE 08 se han notificado 8 casos de parotiditis infecciosa distribuida en la provincia de Pichincha, Pastaza, Orellana, Manabí y Cotopaxi.

Incidencia de varicela por semana epidemiológica año 2021-2022



Incidencia de casos por semana epidemiológica del año 2021, evidenciándose un aumento de casos en las SE 10 y 45. Hasta la SE 08 se han notificado 8 casos de parotiditis a nivel nacional.

Casos de varicela por sexo y grupo de edad año 2022



Hasta la SE 08 se han notificado 8 casos de parotiditis con predominio en el sexo masculino.

Fuente: Sive - Alerta
 SE: 1, 3, 4 Y 8 no se reportan casos
 Corte: 03 de marzo del 2022
 *Datos sujetos a variaciones



La hepatitis B es una infección vírica que afecta al hígado y puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. Representa un importante problema de salud a escala mundial, tiene un alto riesgo de muerte.


Cada año hay 10 000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B, y 23 000 muertes. Solo en 18% de las personas con hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; de ellas, apenas 3% reciben tratamiento. En la región de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7%.

En el Ecuador en el año 2021 se notificaron 144 casos confirmados de Hepatitis B. **Hasta la SE 08 del año 2022 se notifican 13 casos de Hepatitis B a nivel nacional.**

Casos de hepatitis B por provincia año 2022

Provincia	SE 07	SE 08	Total
PICHINCHA	5	1	6
ESMERALDAS	3		3
MANABI	2		2
MORONA SANTIAGO	1		1
GUAYAS	1		1
Total	12	1	13


Distribución geográfica de casos de hepatitis B por provincia año 2022



Hasta la SE 08 del año 2022 se han notificado 13 casos de hepatitis tipo B a nivel nacional.

Hasta la SE 08 del año 2022 se han notificado 13 casos de hepatitis tipo B a nivel nacional.

Incidencia de hepatitis B por semana epidemiológica año 2021-2022



Hasta la SE 08 del año 2022 se notifican 13 caso de Hepatitis B confirmado.

Casos de hepatitis B por sexo y grupo de edad año 2022



Hasta la SE 08 del año 2022 se ha reportado 13 casos de Hepatitis B.

Fuente: Sive - Alerta
 SE 4 no se han reportados casos
 Corte: 03 de marzo del 2022
 *Datos sujetos a variaciones

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
TETANOS: SE 08 ECUADOR 2022



El tétanos es una enfermedad aguda, potencialmente fatal, causada por una potente neurotoxina producida por *Clostridium tetani*, se adquiere tras la infección de cortes o heridas por las esporas de la bacteria *Clostridium tetani*, y la mayoría de los casos aparecen a los 14 días de la infección. El tétanos no se transmite de persona a persona. El tétanos es prevenible mediante la inmunización con vacunas que contienen toxoide tetánico. Sin embargo, las personas que se recuperan del tétanos no tienen inmunidad natural y pueden volver a infectarse.

El periodo de incubación está relacionado con la distancia de la lesión al sistema nervioso central, a mayor distancia más largo será el periodo de incubación; los periodos más cortos están asociados con una mayor probabilidad de muerte. El periodo de incubación del tétanos es de 3 a 21 días (8 en promedio). En el tétanos neonatal, los síntomas suelen aparecer de 4 a 14 días después del nacimiento (7 días en promedio).

La letalidad de tétanos va desde el 10% hasta más del 80% según la edad del paciente y la calidad de atención brindada. En el año 2021, hasta la SE 52 se notificaron 5 casos de tétanos, ubicados en las provincias de Guayas, Imbabura, Los Ríos y Manabí. **Hasta la SE 08 del año 2022 se notifica 1 caso de tétanos.**

Casos de tétanos por Provincia año SE 01-08		
Provincia	SE 01 a 07	Total
ESMERALDAS	1	1
Total	1	1



En el año 2022 hasta la SE 08 se notifica 1 caso de tétanos a nivel nacional.

En el año 2022 hasta la SE 08 se notifica 1 caso de tétanos a nivel nacional.

Casos de tétanos por sexo y grupo de edad SE 01-08



Hasta la SE 07 se notifica 1 caso de tétanos a nivel nacional.

Casos de tétanos SE 01-08	
SE 01 a 07	Total
ESMERALDAS	1

Hasta la SE 07 se notifica 1 caso de tétanos a nivel nacional.

Fuente: Sive - Alerta
SE 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 no se reportan casos
Corte: 03 de marzo del 2022
*Datos sujetos a variaciones