

GACETA EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA SE 12 ECUADOR 2024

DEFINICIONES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la SE 12 del año 2024 se notifican 18 MM; las cuales corresponden a MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para tener el Indicador de RMM al finalizar cada año, y 1 MM tardía.
- Comparando las MM de la SE 12 del año 2024 con el año 2023, se tiene 11 MM menos para el años 2024, correspondientes a MM dentro de los 42 días post parto.
- La provincia que notifica MM en la SE 12 del año 2024 es la provincia de Napo.
- Las causas básicas presentadas hasta la SE 12 son: complicaciones no obstétricas con el 55,55% (10 MM), Hemorragias en un 27,77% (5MM), Trastornos Hipertensivos el 11,11% (2 MM), y 1 MM de causa Desconocida o indeterminada con el 5,55%.

Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2024 SE 1 a SE 12

Años	MM SE 12	MMT SE 12	RMM	Total MM	Total MMT
2017	29	12	43	143	68
2018	35	31	41	137	84
2019	27	22	37	123	105
2020	24	9	54	180	31
2021	32	10	44	144	46
2022	29	12	34	112	43
2023	29	6	0	94	18
2024	18	1	0	18	1

Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2022
*2023 en validación y búsqueda activa
Ultima gaceta del año 2023 se reporta 89 MM, 2 MM posterior a la investigación son descartadas, correspondientes al Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora y al Hospital Genral de Latacunga

Tabla N° 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a SE 12

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Cantón fallecimiento	SE 1 a SE 11	SE 12	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Sucumbios	Lago Agrio	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1	1	2
Zona 3	Pastaza	Puyo	1		1
Zona 4	Manabí	Portoviejo	2		2
	Santo Domingo de lo..	Santo Domi..	1		1
Zona 5	Los Ríos	Babahoyo	1		1
	Santa Elena	Salinas	1		1
Zona 7	El Oro	Guabo	1		1
Zona 8	Guayas	Durán	1		1
		Guayaquil	3		3
Zona 9	Pichincha	Quito	3		3
Total			17	1	18

En la SE 12 se notifica 18 MM; 1 MM en la provincia de Sucumbíos, 2 MM en la Provincia de Napo, 1 MM en la provincia de Pastaza, 2 MM en la provincia de Manabí, 1 MM en la provincia de Santo Domingo, 4 MM en la provincia de Guayas, 1 MM en la provincia de Los Ríos, 1 MM en la provincia de Esmeraldas, 1 MM en Sana Elena, 1 MM en la provincia de El Oro y 3 MM en la provincia de Pichincha.

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 12






Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 12



En la SE 12 la zona con mayor porcentaje de MM es la zona 8 con el 22,22% (4 MM), seguido de la zona 4 y las zonas 9 y zona 4 con el 16,67% (3MM cada zona), zona 1, zona 2 y zona 5 con el 11,11% de MM (2 MM cada zona), y las zonas 3 y zona 7 presentan el 5,56% de MM (1 MM cada zona).

Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 12



Hasta la SE 12 según el lugar de residencia las zonas 9, 8, 5 y zona 4 tiene un porcentaje de MM del 16,67% cada una (3MM cada zona); la zona 1 y zona 2 tienen un porcentaje de 11,11% (2 MM); y las zonas 3, y zona 7 tiene un porcentaje del 5,56% (1MM).

Tabla N° 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 12

Zona Residencia	Provincia residencia	Cantón residencia	SE 1 a SE 11	SE 12	Total general
Zona 1	Esmeraldas	Quininde	1		1
	Sucumbios	Gonzalo Pizarro	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1	1	2
Zona 3	Pastaza	Pastaza	1		1
Zona 4	Manabí	Rocafuerte	1		1
	Santo Domi..	Santo Domingo	1		1
Zona 5	Los Ríos	Catarama	1		1
	Santa Elena	Quevedo	1		1
Zona 7	El Oro	Zaruma	1		1
		Balzar	1		1
Zona 8	Guayas	Guayaquil	1		1
		San Borondón	1		1
Zona 9	Pichincha	Quito	3		3
Total			17	1	18

En la SE 12 se notifica 1 MM, que fallecen en el mismo lugar de su residencia.

Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 12




Tabla N° 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 12


Provincia de fallecimiento	Napo	Guayas	Manabí	Pastaza	Santo Domingo de los Tsáchilas	Sucumbios	Los Ríos	El Oro	Esmeraldas	Pichincha	Santa Elena	Casos de MM
Napo	2											2
Guayas		3					1					4
Manabí			2									2
Pastaza				1								1
Santo Domingo de los Tsachilas					1							1
Sucumbios						1						1
Los Ríos							1					1
El Oro								1				1
Esmeraldas									1			1
Pichincha										3		3
Santa Elena											1	1
Total	2	3	2	1	1	1	2	1	1	3	1	18

NOTA

Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. Hasta la SE 12; Los 17 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento; y 1 MM fallece en un lugar diferente al de su residencia.

Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2018 al 2023 SE 1 a SE 12




El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2024, comparado a la SE 12, tomando en cuenta que los datos de los años 2018 al 2022 son datos finales con búsqueda activa, el año 2023 se encuentra en validación y en proceso de búsqueda activa; y los datos del 2024 son notificaciones sistemáticas.

Tabla N° 5 MM por Provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 1 a SE 12


Provincia de fallecimiento	Establecimiento de Fallecimiento	Tipo de Unidad que Refiere	Unidad que Refiere	
El Oro	H. Teofilo Dávila (EL GUABO)	Pública	CS. GUANAZAN (ZARUMA)	1
Esmeraldas	H. Delfina Torres de Concha	Pública	Hospital Padre Alberto Bufoni	1
Guayas	Clínica Sur Hospital	Privada	Clínica UNDENOR	1
	H. Enrique Ortega Moreira	Ninguna	Ninguna	1
	H. General Monte Sinaí	Pública	Hospital Universitario	1
	H. Monte Sinaí	Ninguna	Ninguna	1
Los Ríos	Hospital Martín Icaza (BABAHOYO)	Ninguna	Ninguna	1
Manabí	H. General Portoviejo - IESS	Pública	Hospital Básico Rocafuerte	1
	Hospital de Especialidades Portoviejo	Ninguna	Ninguna	1
Napó	Domicilio	Ninguna	Ninguna	1
	Traslado	Pública	CS Chontapunta	1
Pastaza	H. General Puyo	Ninguna	Ninguna	1
Pichincha	Hospital Eugenio Espejo (QUITO)	Pública	Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora (QUITO)	1
	Hospital General Docente de Calderón	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora	Ninguna	Ninguna	1
Santa Elena	Hospital Dr. Rafael Serrano López	Ninguna	Ninguna	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	H. Gustavo Dominguez Zambrano	Privada	Torre Médica San Andrés	1
Sucumbios	H. Marco Vinicio Iza	Pública	Lumbaqui	1
Total				18

Gráfico N° 4 Casos de Muerte Materna por grupo de edad SE 1 a SE 12




Hasta la SE 12 del presente año el grupo de edad de 25 a 29 años son los más afectados para las MM seguida del grupo de 20 a 24 años y de 30 a 34 años.

Gráfico N° 5 Porcentaje de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 12



Hasta la SE 12 del año 2024 las MM que ocurrieron en mujeres primigestas es el 22,22%, otro 22, 22% corresponden a la MM que tuvieron dos gestas; y el 55,56% tuvieron entre 3 y 5 gestas.

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por periodo de ocurrencia SE 1 a SE 12



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.
PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Hasta la SE 12 el 22,22% (4 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 33,33% (6 MM) ocurren en el momento del puerperio inmediato; el 22,22% (4 MM) ocurre en el momento del puerperio mediano y el 22,22% (4 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

Tabla N° 7 Edad vs trimestre de gestación al momento que fallece SE 1 a SE 12

Edad	2do Trimestre	3er Trimestre	Embarazo a término	Total
15 a 19 años			1	1
20 a 24 años	1	1	2	4
25 a 29 años	2		4	6
30 a 34 años	1	2	1	4
35 a 39 años		1	2	3
Total	4	4	10	18

Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y periodo de ocurrencia SE 1 a SE 12

Provincia	Embarazo	PP Inmediato	PP Mediano	PP Tardío	Total
El Oro				1	1
Esmeraldas		1			1
Guayas	1	1	1	1	4
Los Ríos		1			1
Manabí			2		2
Napo	1	1			2
Pastaza		1			1
Pichincha	1			2	3
Santa Elena	1				1
Santo Domingo de los Tsachilas			1		1
Sucumbios		1			1
Total	4	6	4	4	18

Primer trimestre: semana gestacional 1 a la semana gestacional 12
Segundo trimestre: semana gestacional 13 a la semana gestacional 23
Tercer trimestre: semana gestacional 24 a la semana gestacional 36
Embarazo a término: semana gestacional 37 a la semana gestacional 42

De acuerdo al trimestre de gestación y la edad de la madre al momento del fallecimiento el 55,55% de las madres fallecen con un embarazo a término, el 22,22% de las madres fallece en el tercer trimestre de su gestación, el 22,22% de las madres fallece en su segundo trimestre de la gestación y no hay MM en el primer trimestre de gestación.

Gráfico N° 7 Tendencia de Muertes Maternas por SE años 2019 al 2023 SE 1 a SE 12





Gráfico N° 8 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 12




Hasta la SE 12 el 77,78% de las MM se produce en establecimientos de salud del MSP; el 5,56% se produce en establecimientos de salud del IESS; el 5,56% se produce en la Red Complementaria, además de 1 MM que ocurre en domicilio, y otra MM durante su traslado.

Tabla N° 8 Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 12

Provincia de fallecimiento	RPIS/MSP	RPIS/IESS	Domicilio	Red Complementaria	Traslado	Total
El Oro	1					1
Esmeraldas	1					1
Guayas	3			1		4
Los Ríos	1					1
Manabí	1	1				2
Napo	1		1			2
Pastaza	1					1
Pichincha	2				1	3
Santa Elena	1					1
Santo Domingo de los Tsachilas	1					1
Sucumbios	1					1
Total	14	1	1	1	1	18

Gráfico N° 9 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2023 y 2024 SE 1 a SE 12



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2023 y 2024 hasta la SE 12; la provincia de Guayas y El Oro reportan mayor número de MM en el año 2023, las provincias de Cañar, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo y Carchi reportan MM solo en el año 2023, las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santa Elena reportan igual número de MM en los dos años; la provincia de Pichincha reporta 1 MM más en el año 2024; y las provincias de Los Ríos, Pastaza, Napo, Santo Domingo y Sucumbíos presentan MM solo en el año 2024.

Tabla N° 9 Grupo étnico de MM por provincia SE 1 a SE 12

Provincia de fallecimiento	Indígena	Mestiza	Negra	Total
El Oro		1		1
Esmeraldas		1		1
Guayas		4		4
Los Ríos		1		1
Manabí		2		2
Napo	2			2
Pastaza	1			1
Pichincha		2	1	3
Santa Elena		1		1
Santo Domingo de los Tsachilas		1		1
Sucumbios	1			1
Total	4	13	1	18

Gráfico N° 10 Pertenencia de grupo étnico de casos de MM SE 1 a SE 12





Tabla N° 10 MM por la terminación del Embarazo SE 1 a SE 12

Parto vaginal	3
Cesárea	11
Embarazo	3
sin dato	1
Total	18


De las 18 MM notificadas hasta la SE 12; el 61,11% de las MM terminaron en una cesárea, el 16,66% fue un parto normal; el 16,66% murieron durante el embarazo, independientemente de su edad gestacional por lo que el producto fallece intra útero; y el 5,55% no cuenta con este dato.

Gráfico N° 11 Condición del RN SE 1 a SE 12




De las 14 MM, que su embarazo terminó por cesárea o parto normal el 71,42% de los niños están vivos y el 28,57% de los niños fallecieron.

Gráfico N° 12 Controles prenatales al momento del fallecimiento SE 1 a SE 12




De los 18 casos de muertes maternas hasta la SE 12; el 94,44% tuvieron controles prenatales; y el 5,56% no registra este dato.

Gráfico N° 13 Número de controles prenatales al momento del fallecimiento SE 1 a SE 12




De las 17 MM que si tuvieron controles prenatales, 9 mujeres tuvieron 5 o más controles prenatales; 2 mujeres se realizó 4 control prenatal, y 6 mujeres tuvieron controles prenatales insuficientes entre 1 y 3 controles prenatales.

Gráfico N° 14 Nivel de instrucción de las MM SE 1 a SE 12



De las 18 muertes maternas hasta la SE 12 el 38,89% de las madres tuvo una educación primaria; el 38,89% de las madres tuvo una educación secundaria, el 5,56% de las madres terminaron el bachillerato, y otro 5,56% cursaron un ciclo post bachillerato; además solo el 11,11% fueron madres que cursaron un nivel superior de educación.

Gráfico N° 15 Estado civil al momento de la ocurrencia de las MM SE 1 a SE 12




De acuerdo al estado civil de las muertes maternas hasta la SE 12, el 72,22% fueron madres solteras, el 16,67% tuvieron Unión libre, y el 11,11% fueron casadas.

Gráfico N° 16 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 12



En cuanto a la ubicación geográfica de domicilio hasta la SE 12 del año en curso, se presenta el 50% de las MM en el área rural, cuya residencia debió ser muy lejana o de difícil acceso a un establecimiento de salud; y el otro 50% de MM residían en el área urbana, que indica que estas mujeres tenían mayor accesibilidad a los servicios de salud.

Gráfico N° 17 Comparación de causas básicas por grupos años 2016 al 2023* SE 1 a SE 12



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupa las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.

De las 18 MM registradas a la SE 12, las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la historia clínica y de los Certificados de defunción recogidos ese momento, hasta que se realice las auditorías externas.

Tabla N° 11 Grupo de Causas Básicas de MMT CIE-10 SE 1 a SE 12

Grupo 2 Trastornos Hipertensivos	Eclampsia	1
	Preeclampsia severa	1
Grupo 3 Hemorragia Obstétrica	Hemorragia	1
	Hemorragia Post Parto	1
	Retención placentaria	1
	Shok Hipovolémico	2
Grupo 7 Indirecta / No Obstétrica	Choque cardiogénico	1
	Choque séptico - foco pulmonar	1
	Choque séptico por Peritonitis	1
	Convulsiones en investigación	1
	Fibrosis Quística	1
	Neoplasia de la glándula tiroides	1
	Peritonitis	3
	Sepsis de Foco Pulmonar	1
Grupo 8 Desconocido/Indeterminado	Desconocido/Indeterminado	1
Total		18

Hasta la SE 12:

El grupo 1 que corresponde a los embarazos que terminan en aborto, las causas se deben a choque séptico y a un aborto complicado con hemorragia, no se presentan muertes maternas por estas causas.

El grupo 2 que son los trastornos hipertensivos, el Síndrome de Hellp, se presentan 2 muertes maternas

El grupo 3 que son las hemorragias obstétricas, el shock hipovolémico, seguido del Choque hipovolémico y las hemorragias post parto, presentándose 5 casos.


El grupo 4 correspondiente a las Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, no se presentan muertes maternas en este grupo.

El grupo 6 correspondiente a las complicaciones de manejo no previstas, no se presentan casos.

El grupo 7 referente a las causas No obstétricas/Indirectas, presentándose 10 casos en este grupo.

El grupo 8 que son causas desconocidas o indeterminadas, se presenta 1 casos de MM.

**Gráfico N° 18 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas
SE 1 a SE 12, año 2024**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de postparto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 12, dividida para la proyección de embarazadas del año 2024 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Napo reporta una tasa de 10.1 muertes maternas, lo que indica que por cada 10.000 embarazadas, 10 están en riesgo de fallecer en esa provincia, Pastaza reporta una tasa de 6,1 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas, 6 se encuentran en riesgo de fallecer; la provincia de Sucumbíos presenta una tasa de 3,3 es decir que por cada 10.000 embarazadas 3 se encuentran en riesgo de fallecer; las provincias de Santa Elena, y Los Ríos reportan tasas de 1,5 a 1.8 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer; Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Pichincha y Guayas presentan tasas de 0,5 a 1,3 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 1 embarazada están en riesgo de fallecer.