

GAM Online Reporting Tool

Ecuador - 2019

I Portada

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) Comité Nacional de Sida o equivalente: No

b) Programa Nacional de Sida: Sí

c) Otros: No

Si son otros, especifique:

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: No

Ministerio de Salud: Sí

Ministerio de Trabajo: No

Ministerio de Asuntos Exteriores: No

Otro Ministerio: No

Si es otro Ministerio, especifique:

Organizaciones de la sociedad civil: Sí

Personas que viven con el VIH: No

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: No

Organizaciones bilaterales: No

ONG internacionales: No

Otros: No

Si son otros, especifique:

3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?: No

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Sí

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: Dr. Rodrigo Tobar Robalino Gerente institucional de Proyecto de Prevención y Control de VIH/sida-ITS

Dirección(es):: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. Oficia 101 Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Correo(s) electrónico(s):: rodrigo.tobar@msp.gob.ec

Teléfono(s):: 593-2 381-4400

II Reporte narrativo

Visión general: La Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida del 2016 refleja la estrategia de respuesta rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del Sida para 2030. En esta declaración se establece metas ambiciosas para el escalamiento de la prevención, el tratamiento y abordajes estructurales del VIH para superar la epidemia en los próximos años. Para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales respecto a la epidemia del VIH/sida en el Ecuador, los actores involucrados se han planteado retos en conjunto que permitan abordar las estrategias frente al VIH/sida de manera multidisciplinaria y corresponsable. Estos esfuerzos conjuntos entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales permitieron el fortalecimiento del algoritmo diagnóstico para mejorar la captación oportuna, a través de pruebas rápidas, poniendo énfasis a grupos de alto riesgo y población clave, como mujeres embarazadas para la prevención de la transmisión materno-infantil de VIH. La Vigilancia Epidemiológica es un proceso primordial para el mejoramiento en la respuesta de los servicios de salud, dado que constituye la segunda función esencial de la salud pública, siendo una herramienta para difundir la información mediante la recolección, consolidación y el análisis para la acción de los diversos eventos de interés epidemiológico y de salud pública. Actualmente el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) realiza atención médica integral y dotación de terapia antirretroviral a personas que viven con VIH, sumándose a los esfuerzos con ONUSIDA, mismo que tiene como objetivo para el 2020 que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH; el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral continuada el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan carga viral suprimida.

COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020: Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos 90-90-90, el Ministerio de Salud Pública a través de Estrategia Nacional de VIH/sida (ENVIH) para el año 2019, inició con la implementación de los siguientes documentos normativos: 1.- Guía de Práctica Clínica de "Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos. 2.- Documento de la "Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas" (ETMI plus). 3. Se socializó en la GPC de "Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos, dirigido a profesionales de las Unidades de Atención Integral a PVVs, responsable zonal de VIH y demás personal de salud del MSP 4. Capacitación en el submódulo de VIH del PRAS al personal de salud del MSP Para el año 2020 se tiene previsto: · Socializar y capacitar en documentos normativos y submódulo de PRAS a profesionales del Sistema Nacional de Salud y monitorear su implementación. · Certificar a las Unidades de Atención Integral de VIH · Lineamientos y reestructuración de los Comités Nacional y Zonales · Proceso de transición a esquemas de tratamiento según la GPC vigente

COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018: La "Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas" (ETMI plus), que es uno de los pilares para enfrentar a la epidemia del VIH/sida en el país, que durante su implementación se estima tener una cobertura del 100% a todas las mujeres embarazadas antes, durante y después de su parto. El 75% de niños que nacen de madres seropositivas son sometidos a una prueba virológica del VIH, durante sus dos primeros meses de vida, pues a pesar de los avances que se tiene sobre la captación oportuna a través de tamizajes de VIH a toda mujer durante el embarazo y el parto, combinar regímenes profilácticos, tratamiento con medicamentos antirretrovirales y fortalecer el asesoramiento a la madre sobre lactancia y alimentación infantil, todavía nacen niños infectados por el VIH, obteniendo para el año 2019 una tasa de transmisión materno infantil del 2%. En el año 2019 se garantizó la disponibilidad del "Kit Verde" en todos los establecimientos que realizan atención de partos. Este kit contiene los medicamentos esenciales para eventos de partos en fase expulsivo de mujeres con VIH.

COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos): Actualmente en el Ecuador, entre las opciones de prevención combinada que se garantizan está la dotación de preservativos y lubricantes, así como la profilaxis post exposición ya sea por exposición laboral al virus o exposición no laboral como en el caso de abusos sexuales. En lo que respecta al método de profilaxis previa a la exposición (PREP), el país se encuentra iniciando su implementación y socialización en todo el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, la circuncisión masculina médica voluntaria no se han implementado en el país ya que la epidemia se caracteriza por ser de tipo concentrada. El MSP-ENVIH, estableció un convenio interinstitucional con la Corporación Kimirina en el año 2019 para realizar un plan piloto de entrega de PREP, en un primer informe se reportó que 72 personas han accedido a PrEP, de ellas 46 han acudido al primer control (al mes) y 8 al segundo control. El 11% de las personas no han acudido a los controles.

COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020: La Constitución de la República del Ecuador del 2008 contempla leyes contra todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, así como también garantizan los derechos de las personas que viven con el VIH y de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual. En este marco, en el año 2019, el MSP emitió la Norma técnica para la “Atención integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos” y para el 2020 se prevé capacitaciones en la Norma técnica, seguimiento de su aplicación y el abastecimiento del medicamento profiláctico para VIH/sida-ITS.

COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año: El MSP garantiza el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva a personas de toda la población etaria según el Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS, tanto para la oferta de métodos de planificación familiar y la entrega de preservativos se realiza a libre demanda en los dispensadores ubicados en lugares visibles y fácil acceso de los establecimientos de salud. La educación sexual en instituciones educativas estatales no está normada y se presentan aún niveles de conocimiento bajo en jóvenes, sin embargo, en instituciones educativas municipales y privadas de algunas provincias, especialmente de Quito se imparte educación sexual como cátedra. Las brechas identificadas aún están en agenda de las políticas públicas.

COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020: El Ecuador aún mantiene el compromiso de que sólo los niños que viven con el VIH se beneficien del programa de protección social “Joaquín Gallegos Lara”, el cual contempla la dotación de un bono mensual de \$240 USD a los niños infectados por VIH menores de 14 años de edad. Este compromiso aspira que se mantenga pese a la grave situación económica que ha ocasionado la emergencia sanitaria por COVID19 y será un reto asumirlo como país ya que el VIH no es considerado una patología catastrófica para incorporarla en programas de protección social.

COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020: La plataforma de salud más grande que tiene el Ecuador es del MSP y con el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) las acciones para la prevención del VIH deben acercarse más a las comunidades a través de los Equipos Integrales de Salud-EAIS y con la incorporación de los Técnicos de Atención Primaria en Salud- TAPS, quienes realizan visitas domiciliarias a nivel de territorio concentrándose en atención comunitaria ofreciendo atención de promoción y prevención. Las ONGs vienen desarrollando actividades en diferentes ciudades del Ecuador en: asesoría de pares, tamizaje comunitario con la oferta de prueba de VIH a personas de población clave en lugares de encuentro con horario diferenciado, acompañamiento de las PVVs a los establecimientos de salud del MSP, entrega de condones y lubricantes, estos esfuerzos han significado avances importantes para la captación y referencia de los diagnósticos en estas poblaciones.

COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales: En los últimos años se ha incrementado el presupuesto destinado en la respuesta al VIH/sida por parte del Ministerio de Salud Pública y organizaciones internacionales, como parte de los compromisos adquiridos para dar fin a esta enfermedad. En el 2019 el presupuesto ejecutado, correspondiente al gasto relativo al VIH por origen de recursos fue de a USD 15´959.367,04

COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos: Además de los derechos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador 2008, las personas que viven con el VIH pueden recibir asesoría legal a través de organizaciones de la Sociedad Civil como la Coalición Ecuatoriana de personas que viven con VIH, Defensoría del Pueblo, así como las instancias legales establecidas en el país para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos. La Coalición viene desarrollando una escuela de defensores de derechos en las ciudades de Guayaquil y Loja, con la asistencia de 75 participantes quienes finalizaron exitosamente los módulos. El reto más importante es continuar con estos procesos ya que esta red de defensores significa una gran fortaleza para sus pares.

COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C: Las normativas actuales de VIH y Tuberculosis contemplan el tratamiento antirretroviral, así como el tratamiento de la Tuberculosis en todos los casos de coinfección ya que la Tuberculosis es la primera causa de Coinfección en el País. Así mismo se encuentra en proceso de normalización la realización de pruebas de diagnóstico para descartar otras coinfecciones como: Hepatitis B, Hepatitis C. Dichos insumos como los reactivos y/o pruebas de diagnóstico no se encuentran disponibles en todos los laboratorios a nivel nacional, por lo que no todos los PVV pueden acceder a estas pruebas de laboratorio; al momento el país no cuenta con medicamentos para tratar la Hepatitis C, y a su vez no cuenta con un protocolo de manejo para la hepatitis B y C y terapia combinada con VIH y VHB para las personas coinfectadas.

90-90-90 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 1.1,1.2 y 1.3)

Instrucciones: Se alienta a todos los países con poblaciones >250 000 a utilizar los datos de sus archivos finales de Spectrum para la Parte 2. Para países utilizando sus archivos finales de Spectrum, la Parte 1 no necesita ser completada. Si datos desglosados de forma detallada por edad/sexo o por area subnacional/ciudad están disponibles, favor completar las Partes 3 y 4.

Favor ver las directrices de GAM y documentos de preguntas frecuentes para más detalles.

Utilizar datos del archivo final de Spectrum: Sí

Parte 1. Metadatos de indicadores (favor completar solamente en caso de no estar utilizando los datos del archivo de Spectrum final).

1.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

1.3 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

1.1,1.2 y 1.3 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH				
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
Indicador 1.1 Numerador : Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH						
Indicador 1.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretroviral						
Indicador 1.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral						
Indicador 1.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral						
Indicador 1.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral						

Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 90-90-90

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 90 años)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 81%)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 73%)*.				
Porcentaje (%) : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 90)				
Porcentaje (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 90)*.				
Cobertura de carga viral (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral				

Parte 3a. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

Nota: Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	Niños (< 5)	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH											
Indicador 1.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretrovira											

Parte 3b. Indicador 1.3: Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

	Niños (< 5)	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Indicador 1.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral	14	1	4	57	180	506	75	39	53	175	32
Indicador 1.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral											
Indicador 1.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral	24	2	7	103	326	917	136	71	96	317	58

Parte 4. Personas que inician tratamiento antirretroviral

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
Personas que inician tratamiento antirretroviral	4353	92	3097	1164	0	0
Personas que reinician el TAR (entre los que iniciaron el TAR)						

Parte 5. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]

Ciudad	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 1.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 1.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 1.3 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 1.3 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 1.3 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
Quito						

1.4 Diagnóstico tardío del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de seguimiento a pacientes en Hospitales SIEN

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm³

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	29.27	21.21	30.71	25.84
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <200 células/mm ³ en el momento del diagnóstico	593	7	448	138
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 at the time of diagnosis	2026	33	1459	534

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm³

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	57.552	33.333	60.247	51.685
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <350 células/mm ³ en el momento del diagnóstico	1166	11	879	276
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	2026	33	1459	534

1.5 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Componente de abastecimiento de medicamentos antirretrovirales de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Clínica general	Centro maternoinfantil	Centro para tratamiento de tuberculosis
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	100	100	100	0
Numerador : Porcentaje de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	44	38	6	0
Denominador : Número total de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales durante ese mismo periodo	44	38	6	0

1.6 Mortalidad relacionada con el Sida

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Tasa : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

< 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Los registros del programa de servicios de pruebas para el VIH, los diarios y formularios de notificación

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Proporcione cualquier información sobre campañas de pruebas nacionales o cambios en las estrategias de pruebas que puedan explicar cualquier cambio en el volumen de prueba en comparación con años anteriores.:

Datos de las tasas de repetición de pruebas en personas VIH-negativas y VIH-positivas:

Total y desglose por edad

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.329	0.199	1.054	0.118
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	4320	106	3072	1142
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	1312130	53232	291435	967463

Por modalidad de prueba: Pruebas a nivel de instalaciones

	Todas las pruebas a nivel de instalaciones	Prueba iniciada por el proveedor en clínicas o instalaciones de emergencia	Clínicas de atención prenatal (incluyendo el embarazo y el parto)	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (incluyen las instalaciones sanitarias)	Clínica de planificación familiar	Otras pruebas a nivel de instalaciones
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural						
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)						
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)						

Por modalidad de prueba: Reporte de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad

	Todos los reportes de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad	Pruebas móviles	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (no incluyen las instalaciones sanitarias)	Otras pruebas basadas en la comunidad
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural				
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)				
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)				

Autodiagnóstico

	Valor de datos
Cantidad suministrados : Cantidad de equipos de autodiagnóstico adquiridos (no distribuidos o utilizados) por el gobierno en un año, incluyendo (entre otros) los donados	
Cantidad distribuidos : Número total de equipos individuales de autodiagnóstico distribuidos en un año	

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: GAM

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Si la respuesta es «Otras», especifique: Reportes de casos al sistema de vigilancia epidemiológica

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	24.78
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los lactantes examinados solo deben contarse una vez. El numerador no debe incluir lactantes estudiados después de dos meses.	143
Resultado de la prueba - Positivo	10
Resultado de la prueba - Negativo	133
Resultado de la prueba - Indeterminado	0
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	0
Resultado de la prueba - Otro	0

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente: Otros

Si la respuesta es «Otras», especifique: Reportes de las fichas de notificación al sistema de vigilancia epidemiológica

	Valor de datos
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	577

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
Quito			

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: GAM

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: No

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente: Otros (especificar)

Si la respuesta es «Otras», especifique: Reportes al sistema de vigilancia epidemiológica

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	2.06
Numerador : Número estimado de niños recién infectados por el VIH por transmisión materno-infantil en los 12 meses anteriores	10
Denominador : Número estimado de partos en mujeres con el VIH en los últimos 12 meses	486

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido de los registros de la clínicas de atención prenatal/prevención de la transmisión maternoinfantil y sobre los pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Si la respuesta es «Otras», especifique:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil excluirán a las mujeres que hayan recibido nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única. Este recuento debe incluir a todas las mujeres que hayan dado a luz en los últimos 12 meses, independientemente del año en que comenzaron con medicamentos antirretrovirales.	
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Otras En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
Nacional	92.37	533				533	577

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
Quito							

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Datos del Sistema Estadístico RDACAA

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo::

A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	

En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Numerador : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva	0.34		
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis	1212		
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis	353473		

C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	
Numerador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	
Denominador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	

2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Notificación de casos nacional

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: No sé

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/index.html>:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	0.13
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	238
Denominador : Número de nacimientos	181921

2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Notificación de casos al sistema de vigilancia epidemiológica

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH	79.96	
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro sanitario que se habían hecho pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran VIH-positivas en la primera visita de asistencia prenatal.	331624	
1. Infección por el VIH conocida (positiva) al registrarse en la clínica prenatal	0	
2. Con resultado positivo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo o el parto. Esto excluye a las mujeres que ya conocían su estado positivo de VIH antes del embarazo actual.	577	
3. Con resultado negativo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual o el parto. Esto debe basarse en los últimos resultados de pruebas en caso de repetición de la prueba.	331047	
Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)	577	
Denominador basado en la población : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	414716	
Denominador basado en el programa : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro sanitario en los últimos 12 meses	414716	

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (utilizando un denominador basado en la población)	Numerador	Denominador basado en la población
Quito			

3.1 Incidencia del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
Quito										

3.2A Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: El estudio se realizó aplicando el método PLACE y el de evaluación epidemiológica. El protocolo de elaboración del estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional de Bioética (IRB) de la Universidad Central del Ecuador y de la Dirección de Inteligencia de la Salud del MSP.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2B Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2C Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2D Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2E Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):

Datos sub-nacionales - Presos

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito		

3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven del VIH						
Numerador : Número de profesionales del sexo que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven del VIH			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se someten a pruebas sobre el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven del VIH						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven del VIH						
Numerador : Número de personas transgénero que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven del VIH						
Numerador : Número de presos que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de presos que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito							

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.4A Pruebas de VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4B Pruebas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH			
A : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
B : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
Numerador (A + B) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4C Pruebas de VIH entre personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas que usan drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4D Pruebas de VIH entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.5B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de datos

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Numerador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Denominador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.5C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.5D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Información no disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.5E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Información no disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de los presos que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de los presos que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.6C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Numerador : Número de personas transgénero que notificaron haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas que notificaron haber tenido relaciones sexuales o haber practicado el sexo anal en los últimos seis meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.7A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Numerador : Número de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que son alcanzados con intervenciones de prevención del VIH diseñadas específicamente para profesionales del sexo				
Numerador : Número de profesionales del sexo que son alcanzados con intervenciones de prevención del VIH diseñadas específicamente para profesionales del sexo				
Número de preservativos y lubricantes distribuidos				
Denominador : Número de profesionales del sexo				

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres				
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres				
Número de preservativos y lubricantes distribuidos				
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres				

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Información no disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables con los que se contacta con intervenciones de prevención diseñadas para personas que usan drogas inyectables				
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas que usan drogas inyectables				
Número de agujas y jeringas distribuidas (datos del indicador 3.9)				
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables				

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Información no disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero.				
Numerador : Número de personas transgénero a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero				
Número de preservativos y lubricantes distribuidos				
Denominador : Número de personas transgénero				

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Total y desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Índice : Número de agujas y jeringas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas				
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los programas de agujas y jeringas				
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país				

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Índice	Numerador	Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito				

3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Total y desglose por género y edad

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país						

Desglose por tipo de proveedor

	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos			
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.			
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa				
Numerador : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa				
Denominador : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa				

3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	
Numerador : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	

3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Datos de programas rutinarios

Otra herramienta/fuente de medición: Rutinariamente reportan los CPL a la Estrategia Nacional de VIH

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En Ecuador existen 44 Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional. Dentro de las acciones desarrolladas en el marco de la prevención del VIH, es la oferta y realización de la prueba de VIH a todas las personas privadas de libertad, dos veces al año. Una vez que se obtiene un resultado reactivo en las pruebas de tamizaje de cuarta generación, se procede a realizar una segunda prueba, al obtener dos pruebas con resultado reactivo, se confirma el diagnóstico y se procede a coordinar una cita en la Unidad de Atención Integral de VIH, para la realización de exámenes e inicio del tratamiento.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Valor de datos
Número de agujas limpias distribuidas entre presos	
Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos	
Número de preservativos distribuidos entre presos	
Número de presos que reciben terapias antirretrovirales	619
Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH	39038

Personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	1.58
Numerador : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	619

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis B	
Numerador : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis B	

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
Numerador : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
Numerador : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B									

Hepatitis C

Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C									

3.15 Personas que recibieron PrEP

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente: Cooperación Kimirina - Proyecto Piloto Profilaxis Pre - Exposición - PrEP

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Convenio específico de Cooperación Interinstitucional N°06-2019

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: INFORME PrEP KIMIRINA / OFICIO K-087-2020 / pág. 25 Al 30 de noviembre de 2019, 72 personas a recibido PrEP y de ellas 46 han acudido al primer control (al mes de la primera administración) y 8 ya han acudido al segundo control. el 11% de las personas que solicitaron PrEP no han acudido a los controles. Nota: En el informe no existe desagregación por sexo y edad.

Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe
Todo	0	0	0	0	0	0
<15	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0
25-49	0	0	0	0	0	0
50+	0	0	0	0	0	0
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
Edad desconocida						
Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe						

Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Presos
Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe	0	0	0	0	0

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
---------------------	------	---------	---------	-------------	------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe
Quito	43
Guayaquil	29

3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información / Estudio no actualizado

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
Numerador : El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
Denominador : Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Todo (15-49) - Porcentaje (%)	Todo (15-49) - Numerador	Todo (15-49) - Denominador	Hombres (15-49) - Porcentaje (%)	Hombres (15-49) - Numerador	Hombres (15-49) - Denominador	Mujeres (15-49) - Porcentaje (%)	Mujeres (15-49) - Numerador	Mujeres (15-49) - Denominador
Quito									

3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos de almacenes centrales y regionales

Otra herramienta/fuente de medición:: 1. Reporte Sistema de Gestión de inventarios (SGI) 2. Reporte trimestral de cada Coordinación Zonal

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Fuente de información: Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: En el 2019 la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, realizó la distribución de 3'664.920 de preservativos los cuales fueron distribuidos a las 9 Coordinación Zonal de País. En este periodo no hubo distribución de preeservativos femeninos en la Zona 2 (Provincias de:Pichincha, Napo y Orellana) y Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito), porque tenían en stock y no solicitaron. Proveedor: UNFPA Nota: La información reportada se encuentra desglosada por Zona.

	Total	Público	Privado	Organizaciones no gubernamentales
Preservativos masculinos : Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	3600000	0	0	3600000
Preservativos femeninos : Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses	64920	0	0	64920

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses
Zona 8(Guayaquil)	760000	9888
Zona 1(Esmeraldas/Imbabura/Carchi/Sucumbios)	778000	12945
Zona 5(Guayas/Sta.Elena/Los Rios/Galápagos/Bolivar)	595000	11685

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información No se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Indicador compuesto: Respondieron "No" a la pregunta 1, a la pregunta 2 o a ambas preguntas (solamente se debe completar esta tabla si los datos para la pregunta 1 y la pregunta 2 son de la misma fuente).

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

4.2A Evitación de los servicios de salud por parte de los profesionales del sexo por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información No se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2B Evitación de los servicios de salud por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información No se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2C Evitación de los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información No se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2D Evitación de los servicios de salud por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información No se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.3 Prevalencia de violencia reciente por parte de una pareja íntima

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental

	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses				
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses				
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual				

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental desagregada por estado del VIH

	Mujeres seropositivas (15-49)	Mujeres seronegativas (15-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-49)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses												
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses												
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual												

4.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Desagregados por tipo de servicio de salud

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Numerador - desglosado por tipo de estigma y discriminación experimentado

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"			

Cualquier servicios de salud: desagregados por género, edad y población clave

	Hombres	Mujeres	Transgénero	15-19	20-24	25-49	Poblaciones clave (Respuesta identificada con al menos una población clave)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Denominador : Número de encuestados							

Cualquier servicios de salud: desagregados por tiempo de estar viviendo con el VIH

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15+ años
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Denominador : Número de encuestados					

LAC2.3.1bA Trabajadoras sexuales que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador

LAC2.3.1bB Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bC Personas que usan drogas inyectables que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyectó drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bD Personas transgénero que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla B. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de atención médica o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bE Miembros de una población vulnerable que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Población vulnerable a la que se refiere la encuesta:

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo en un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC4.1.1 Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos			
Lesbianas			
Hombres gay			
Hombres bisexuales			
Mujeres bisexuales			
Hombres trans			
Mujeres trans			
Personas intersexuales			

Datos sub-nacionales

Sitio	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas intersexuales
-------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

LAC5.1.1 Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no hay información disponible.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Sitio	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero
-------	--------------------	---	-------------------------------------	---	---	-----------------------------------

5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	15-19	20-24	25-49
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos				
Numerador : Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos				
Denominador : Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar				

10.1 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros sobre pacientes con tuberculosis

Otra herramienta/fuente de medición:: Este dato fue proporcionado por Estrategia de TB.

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	712				

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2018, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2017 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Numerador
Quito	

10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición:: La información es tomada el modulo del SIEN relacionado a TB.

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: 1.PVV 2. Fecha de notificación: 2019 3. Tipo de coinfección: TB activa

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas con VIH con tuberculosis (TB) activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se incluyen por primera vez en el tratamiento para el VIH durante el periodo de notificación	11.41
Numerador : Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	493
Denominador : Número total de personas que se incluyeron por primera vez en tratamiento frente al VIH (es decir los que se registraron para tratamiento antirretroviral durante el periodo de notificación) El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.3	4320

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje	Numerador	Denominador
Guayas	27.25	358	1314
Santa Elena	24.03	31	129

10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición:: La información es tomada el modulo del SIEN relacionado a TB.

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: 1. PVV 2. Fecha de inicio de tratamiento: 2019 3. Tipo de coinfección: TB latente

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Se dispone de nuevos datos sobre las que recibían tratamiento preventivo RECIÉN incluidas en tratamiento para el VIH?: Sí

Recién inscritas en tratamiento para el VIH

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número de personas que iniciaron tratamiento para infección latente de tuberculosis (TB), expresado como un porcentaje del número total de personas recién inscritas en tratamiento del VIH durante el periodo de reporte	4.5
Numerador : Número total de personas que viven con el VIH que se registran por primera vez en tratamiento del VIH que empiezan el tratamiento para infección latente de TB durante el periodo de reporte.	193
Denominador : Número total de personas que se registran por primera vez en tratamiento del VIH (es decir, aquellas registradas para terapia antirretroviral durante el periodo de reporte). El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2	4320

¿Tiene nuevos datos disponibles sobre las personas que ACTUALMENTE están incluidas en tratamiento frente al VIH?: No

Actualmente registradas en tratamiento del VIH

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH y están actualmente registradas en tratamiento del VIH que empiezan el tratamiento para infección latente de TB durante el periodo de reporte	
Numerador : Número total de personas que viven con el VIH y están actualmente registradas en tratamiento del VIH que empiezan el tratamiento para infección latente de TB durante el periodo de reporte	
Denominador : Número total de personas que están actualmente registradas en tratamiento del VIH. Este valor debería ser mayor que el denominador para el indicador 10.2	

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (recién incluidas en tratamiento para el VIH)	Numerador (recién incluidas en tratamiento para el VIH)	Denominador (recién incluidas en tratamiento para el VIH)	Porcentaje (actualmente incluidas en tratamiento para el VIH)	Numerador (actualmente incluidas en tratamiento para el VIH)	Denominador (actualmente incluidas en tratamiento para el VIH)
Esmeraldas	58.31	172	295			
Santa Elena	9.30	12	129			

10.4 Hombres con secreción uretral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Notificación de casos nacional

Otra herramienta/fuente de medición: Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0)2020 (enero-febrero) y Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) 2019. Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: 1: La información 2019, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en RDACAA1.6 + PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2019 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos: Numerador 1: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [R36X,N340, N342, N485]. 2: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 1: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 2: La información corresponde a hombres de 15 años a más (*) Información 2019 sujeto a variación

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos: La información 2019 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	0.01
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	274
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad	4266936

10.5 Gonorrea entre la población masculina

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Notificación de casos nacional

Otra herramienta/fuente de medición:: Numerador 1: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A540, A542, A549-A53,N518,N510]. 2: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 1: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 2: La información corresponde a hombres de 15 años a más (*) Información 2019 sujeto a variación

Desde la fecha: 01/01/2019

Hasta la fecha: 31/12/2019

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0)2020 (enero-febrero) y Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) 2019. Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: 1: La información 2019, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en RDACAA1.6 + PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2019 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería

	Total
Índice : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	0.02
Numerador : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	824
Denominador : Número de hombres de 15 años de edad o más	4346176

10.6 Pruebas de hepatitis C

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de esta información.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos						
Denominador : Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

10.7 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de esta información. No se ha establecido el Protocolo para el manejo de Hepatitis - No se ha definido el tratamiento y se desconoce si las personas coinfectadas con VIH y VHB reciben terapia combinada.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

10.8 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Actualmente no se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Encuesta poblacional

Mujeres que viven con el VIH que se reportan haber sido revisadas para el cáncer cervical

	15-49	15-29	30-49
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres que viven con el VIH que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba del virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que comunican no haber sido nunca sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino utilizando alguno de los siguientes métodos: inspección con ácido acético (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba del virus del papiloma humano (VPH)			
Se realizaron la prueba en el último año : Número de mujeres con VIH que notifican haberse sometido a una prueba de cribado del cáncer cervical el año pasado			
Denominador : Todas las mujeres encuestadas que viven con el VIH			

II. Datos del programa

Mujeres con VIH que alguna vez se han sometido a detección del cáncer cervical

	15-49	15-29	30-49
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres con VIH que alguna vez se han sometido a pruebas de detección de cáncer cervical con alguno de los siguientes métodos médicos: VIA, citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres con VIH que alguna vez se han sometido alguna vez a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero con alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			
Se realizaron la prueba en el último año : Número de mujeres con VIH que se han sometido a una prueba de cribado del cáncer cervical el año pasado			
Denominador : Todas las mujeres con VIH			

Mujeres que dieron positivo en la prueba del VIH entre las mujeres que fueron revisadas para el cáncer cervical

	15-49	15-29	30-49
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres con resultado positivo de VIH entre todas las mujeres sometidas a detección de cáncer cervical con alguno de estos métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			
Número de mujeres que se sometieron a pruebas de VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical			
Numerador : Número de mujeres que dieron positivo en VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical			
Se realizaron la prueba en el último año : Número de mujeres que dieron positivo en VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical el año pasado			
Denominador : Todas las mujeres sometidas a detección de cáncer cervical con alguno de estos métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			

III Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: La Guía de Práctica Clínica de atención de niños, embarazadas y adultos fué publicada en junio del 2019 la misma que se encuentra en proceso de implementación en la cual contempla iniciar tratamiento antirretroviral independientemente del recuento de células CD4. La política para la eliminación de la transmisión materno infantil PLUS se emitió en el 2019 y esta en proceso de implementación.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Descargar este formato: [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describa el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
---------	--------------------	--------------	-------	--------------------------	-------------

A.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Pruebas sobre VIH

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?:

3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas de autodiagnóstico sobre VIH como política o plan nacional?:

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas de autodiagnóstico sobre VIH?:

3.2 Si la respuesta es negativa, ¿está su país desarrollando una política nacional con respecto a las pruebas de autodiagnóstico sobre VIH?:

3.2a Si la respuesta a la Pregunta 3.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas de autodiagnóstico::

4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional?:

4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política nacional en el futuro?:

4.1a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluya esa notificación asistida a parejas::

5. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria?:

5.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:

Terapia antirretroviral

6. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones de la actualización para 2018 de las Directrices consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH en un procedimiento nacional?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Favor cargar una copia de los documentos sobre las directrices nacionales actualizadas disponibles.

7. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

7.1 Si está en proceso de implementación de un tratamiento universal independientemente del recuento de células CD4, ¿cuál es la situación de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

7.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de tratamiento universal, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de tratamiento universal en el futuro?:

7.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el tratamiento universal::

8. ¿Ha adoptado su país la Recomendación sobre el inicio rápido de terapias antirretrovirales de la OMS 2017?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

9. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer el inicio de una terapia antirretroviral el mismo día del diagnóstico del paciente con VIH?:

9.1 Si su país tiene una política sobre el inicio rápido y/o inicio el mismo día del diagnóstico, cual es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

10. ¿Hay pruebas de células CD4 disponibles para determinar la fase inmunológica?:

10.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?:

10.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen acceso a los clientes a las pruebas y los resultados?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

11. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan):

12. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (externo a las instalaciones de salud)?:

12.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique qué enfoques se utilizan para la entrega comunitaria de terapia antirretroviral::

13. ¿Se ofrece en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (externo a las instalaciones de salud) para las personas que se hallan estables en su terapia antirretroviral?:

13.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

14. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral?:

14.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::

15. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que las personas que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral deberían retirar medicamentos antirretrovirales?:

15.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::

16. Proporcione los criterios nacionales del país para (o definición de) «una pérdida de seguimiento». Por ejemplo, una pérdida de seguimiento se define como un paciente que no ha recibido medicamentos antirretrovirales dentro de las últimas cuatro semanas desde la última cita de recogida de medicamentos a la que no se presentó.:

17. ¿Ha adoptado su país la recomendación de la OMS de 2017 para ofrecer un paquete de intervenciones a todos los pacientes que muestren una situación avanzada de su enfermedad por VIH (definida por la OMS cómo células CD4<200)?:

17.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

18. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

19. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan un centro de salud público?:

19.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se trata de tasa específico formal o informal?

a) Pruebas sobre VIH:

b) Dispensado de PrEP:

c) Cita de atención primaria:

d) Tarjetas de paciente:

e) Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral):

f) Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales):

Regímenes de terapia antirretroviral

Adultos y adolescentes

20. En base a las recomendaciones de las directrices de tratamiento de la OMS de 2019, ¿es TDF + 3TC (o FTC) + DTG la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en las directrices nacionales de su país para los siguientes grupos?:

a) Adultos y adolescentes:

ai. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

a.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2020?:

b) Mujeres en edad de procrear:

bi. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2020?:

c) Mujeres embarazadas y/o lactantes:

ci. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2020?:

21. ¿Se está introduciendo el DTG como régimen antirretroviral de primera línea en su país?:

22. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

23. ¿Es el régimen basado en DTG la combinación de antirretrovirales de segunda línea de preferencia para adultos y adolescentes que viven con el VIH en las directrices nacionales?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Niños

24. ¿Son los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños con peso inferior a 20 kg en las directrices nacionales?:

25. ¿Se recomienda DTG como la opción de tratamiento de preferencia para iniciar el tratamiento en niños con un peso superior a 20 kg?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

26. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en niños en las directrices nacionales?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

27. ¿Se recomienda DTG como la opción de segunda línea de preferencia para los niños con un peso al menos de 20 kg?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

28. ¿Se recomienda LPV/r (o ATVr) como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en INNTI con un peso inferior a 20 kg?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

29. ¿Se recomienda RAL como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en la inhibición de proteasa con un peso inferior a 20 kg?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Carga viral

30. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la supresión de carga viral en un individuo se define como un éxito::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

31. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre pruebas de carga viral rutinarias* para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes:

ai) Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

aii) Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:

b) Para niños:

bi) Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

bii) Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:

32. ¿Están disponibles las pruebas de carga viral en centros de atención en algún centro sanitario de su país?:

33. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

33.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?:

34. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y adolescentes)?:

34.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad

35. ¿Cuenta su país con un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales?:

35a. Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan::

36. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:

a) Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR):

a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta de PDR:	

b) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos:

b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

c) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil:

c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

d) Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano:

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta sobre recién nacidos:	

e) Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH:

e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se monitoreó por última vez:	
Cantidad de centros sanitarios monitoreados:	

e.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaron de las siguientes maneras::

37. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de segunda línea?:

38. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?:

38.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

39. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de DTG?:

39.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

39.2 Si la respuesta a la Pregunta 41.1 es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de DTG?:

Adherencia y retención

40. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?:

40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

41. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

42. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?:

42.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

43. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

44. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?:

A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

45. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH-negativas durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia?:

45.1 Si la respuesta es afirmativa, seleccione los periodos en los que debería repetirse la prueba (seleccione todas las opciones que correspondan)::

46. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

46.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Objetivo(s) para la tasa de transmisión maternoinfantil:	
Año	

	Valor de datos
Objetivo(s) de eliminación (como el número de casos/población):	
Año	

47. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?:

Si la respuesta es "Otras opciones", especifique el régimen:

47.1 Si su país está aplicando la política de tratamiento universal para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

48. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda en su país para mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

49. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH?:

a) Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos::

b) Duración recomendada del régimen::

49.1 ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?:

a) Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes::

50. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil para recién nacidos expuestos al VIH?:

50.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?:

Si la respuesta es afirmativa, especifique la duración en meses:

51. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país con programas de prevención de la transmisión maternoinfantil?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

52. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto para mujeres que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?:

53. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país?:

Eliminación de la transmisión meternoinfantil de la sífilis

54. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis?::

55. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?:

55.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?::

Diagnóstico infantil temprano

56. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de ácido nucleico para la detección del VIH (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

57. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de anticuerpos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

58. Además de los entornos de prevención de la transmisión maternoinfantil, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

59. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil temprano, pruebas de ácido nucléico) en el momento del nacimiento?:

60. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del VIH a los nueve meses en su país?:

61. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del VIH a los 18 meses de edad o tres meses después del cese de la lactancia, lo que ocurra más tarde?:

62. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención sanitaria?:

62.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

63. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil en el país?:

63.1 ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria?:

64. ¿Existen intervenciones dirigidas a garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciban respuesta como parte de los programas sobre la prevención de la transmisión maternoinfantil? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

65. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en la prevención de la transmisión maternoinfantil en los últimos doce meses?:

65.1 Si la respuesta es afirmativa:

a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?:

b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión nacional?:

c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus comentarios?:

d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?:

e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y difundieron tras esa reunión?:

f) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a la prevención de la transmisión maternoinfantil?:

Terapia antirretroviral para niños

66. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

66.1 ¿Cuál es la situación de implementación de la política sobre el tratamiento universal independientemente de la edad en su país?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

67. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?:

68. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?:

69. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?:

70. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos)

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional

71. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

72. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

73. ¿Participan* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

74. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

75. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

Profilaxis previa a la exposición

76. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las directrices nacionales de su país?:

76.1 Si aún no se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las directrices nacionales, ¿existe un plan para adoptar una recomendación de PrEP en el futuro?:

76.1a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se adopten las recomendaciones de PrEP::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76.2 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, especifíquese para qué poblaciones se proporciona PrEP de acuerdo con las directrices aplicadas para ofrecer PrEP::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76.3 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, ¿quién tiene la autoridad para prescribir PrEP en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76.4 Si no se han desarrollado directrices nacionales sobre la PrEP, indique los motivos aplicables (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76.5 ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Preservativos

77. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?:

77.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?:

77.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año se estimaron las necesidades del preservativo?:

77.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número de preservativos necesarios?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

78. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses?

a) Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional:

b) Situaciones de desabastecimiento de alcance local:

A.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

79. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:

79.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?
--	----------	--

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

80. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados*?:

80.1 Si la respuesta es afirmativa:

a) ¿Hacen referencia al VIH?:

b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?:

c) ¿Reconocen a grupos de poblaciones clave (profesionales del sexo, hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?:

c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan):

d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?:

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?:

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?:

g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?:

81. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre Sida o su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social*?:

82. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?:

A.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

83. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

84. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

85. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH?

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley:

b) Para miembros del sistema judicial:

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios):

d) Para trabajadores sanitarios:

86. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos?

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley:

b) Para miembros del sistema judicial:

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios):

d) Para trabajadores sanitarios:

87. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de esta formación y/o actividades de capacitación (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

A.10 Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

88. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en los siguientes?

a. La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables:

b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida:

c. Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH:

89. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Infecciones de transmisión sexual (ITS)

90. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones de tratamiento nacionales para infecciones de transmisión sexual (ITS)?:

90.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?:

91. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de ITS?:

92. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos gonocócicos?:

93. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?:

Estrategia

94. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que guíe su respuesta al sida?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

94.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política nacional sobre el sida?:

94.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de poblaciones clave o grupos de poblaciones vulnerable? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

94.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que establece la respuesta al sida...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

94.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras para las cuestiones de género*, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?:

94.4.a Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*?:

Monitoreo y evaluación

95. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

95.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años?:

95.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género*?:

Sistema de Información sanitaria

96. ¿Cuenta su país con un sistema de información sanitaria en funcionamiento en formato electrónico, en papel o ambos?:

96.1 Si existe un sistema de información sanitaria, ¿están disponibles de manera rutinaria los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de información sanitaria?:

96.2 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito?:

Vigilancia

97. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de población?

	Vigilancia centinela realizada	¿Con qué frecuencia se realiza? (en años)	¿En qué año se realizó la encuesta más reciente?	¿En qué número de centros se realizó la vigilancia?
--	--------------------------------	---	--	---

Si la respuesta es "Otro", especifique:

98. ¿Su país utiliza datos de los asistentes a clínicas prenatales sobre el número de mujeres que obtienen un resultado positivo en una prueba de VIH y el número de mujeres que ya se sabe que son VIH positivas para comprender las tendencias en la prevalencia del VIH?:

Sistemas de seguimiento de pacientes

99. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes usando la guía Consolidated guidelines on personcentered HIV patient monitoring and case surveillance de la OMS 2017?:

¿Qué porcentaje de instalaciones sanitarias cuentan con un sistema electrónico para la recopilación de datos longitudinales a nivel de paciente (por ejemplo: registros médicos electrónicos)?:

Códigos de identificación únicos para pacientes

100. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los siguientes servicios?

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
--	---	---	---

Si la respuesta es "Otra poblacion clave", especifique:

Vigilancia de casos

101. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifican por ley?:

102. ¿Cuenta el país con un sistema de vigilancia de casos de VIH*?:

102.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se notifican los siguientes eventos de vigilancia centinela?:

a) Diagnóstico:

b) Resultado del primer recuento de células CD4 en el diagnóstico:

c) Inicio de terapia antirretroviral:

d) Resultados de la primera prueba de carga viral y de las pruebas de carga viral de seguimiento:

e) Muertes:

90-90-90

103. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico que está disponible para el Indicador 1.1 para 2019?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

104. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento antirretroviral para el Indicador 1.2 para 2019?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

105. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional?:

105.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 1.2?:

106. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para el Indicador 1.3 para 2019?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

TB/VIH

107. ¿Se recomiendan las siguientes opciones a las personas que viven con el VIH en las estrategias, políticas, planes o directrices nacionales relacionadas con la TB y/o el VIH?

a) Detección de casos de TB:

b) Tratamiento preventivo de TB:

108. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política The use of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis and screening of active tuberculosis in people living with HIV de la OMS de 2015?:

109. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan)

a) Adultos que viven con el VIH:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

ai. Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

b) Niños que viven con el VIH:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

bi. Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

110. ¿Se requieren las siguientes opciones en las directrices nacionales antes de iniciar el tratamiento preventivo de TB?

a) Prueba cutánea de tuberculosis o prueba de ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA):

b) Rayos X:

111. En el último periodo del que se informa, ha habido situaciones de desabastecimiento de:

a) Isoniacida:

b) Vitamina B6:

c) Otros medicamentos de recomendación nacional para el tratamiento preventivo de la TB:

ci. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los medicamentos::

112. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?

a) Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por ejemplo: Xpert MTB/RIF):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

b) Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

c) El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

d) Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Seguro de salud universal

113. ¿Cuenta su país con un esquema de seguro de salud universal?:

113.1 En caso negativo, ¿está avanzando su país hacia un esquema de seguro de salud universal?:

113.2 En caso afirmativo a 113 ó 113.1, el paquete de beneficios incluye:

a) Medicamentos antirretrovirales:

b) PrEP:

IV Encuesta del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del Sida (AMDS) sobre el uso de antirretrovirales (ARV) y de laboratorios, y aplicación de las guías de la OMS pertinentes

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: Daniel Lizano

Cargo: Analista Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS

Institución: Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Dirección de correo electrónico: edison.lizano@msp.gob.ec

Teléfono: 59399 924 5694

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas

Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2019

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2021
Primera línea	6092
Segunda línea	1531
Tercera línea	536
TOTAL	8159

Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2019
TDF/FTC/EFV mg:300/200/600	4937
TDF/FTC+RAL mg:300/200+400	289
TDF/FTC+LPV/RTV mg:300/200+200/50	210
ABC/3TC+EFV 600mg/300mg+600mg	172
ABC/3TC+LPV/RTV mg:600/300+200/50	121
AZT/3TC+LPV/RTV mg:300/150+200/50	104
TDF/FTC+DRV+RTV mg:300/200+300+100	72
ABC/3TC+RAL: (600/300+400)	44
AZT/3TC+EFV 300mg/150mg+600mg	39
ABC/3TC+DRV+RTV mg:600/300+300+100	28
TDF+3TC+EFV mg:300+150+600	22
ABC+3TC+EFV : (300+150+200)	18
AZT+3TC+LPV/R : (50/5+50/5+80/20)	6
TDF/FTC+RAL+DRV+RTV mg:300/200+400+300+100	6
AZT/3TC+NVP mg:300/150/200	4
AZT+3TC+LPV/R: (100+50/5+80/20)	3
AZT+ABC+LPV/RTV mg:300+300+200/50 tab:60+60+120	3

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	6075

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Lista de Tesquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2019
TDF/FTC/EFV mg:300/200/600	701
TDF/FTC+LPV/RTV mg:300/200+200/50	174
ABC/3TC+EFV 600mg/300mg+600mg	169
ABC/3TC+LPV/RTV mg:600/300+200/50	123
TDF/FTC+RAL mg:300/200+400	101
ABC/3TC+RAL: (600/300+400)	54
TDF/FTC+DRV+RTV mg:300/200+300+100	45
ABC/3TC+DRV+RTV mg:600/300+300+100	41
AZT/3TC+LPV/RTV mg:300/150+200/50	41
ABC+3TC+EFV : (300+150+200)	20
AZT/3TC+EFV 300mg/150mg+200mg	17
AZT/3TC+EFV 300mg/150mg+600mg	10
AZT/3TC+DRV+RTV mg:300/150+300+100	6
TDF+3TC+EFV mg:300+150+600	6
AZT+3TC+LPV/RTV 50mg/5ml+150mg+200mg/50mg	5

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	1515

Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2019	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2019
ABC/3TC+LPV/RTV mg:600/300+200/50	131
TDF/FTC+LPV/RTV mg:300/200+200/50	127
AZT/3TC+LPV/RTV mg:300/150+200/50 tab:60+120	66
TDF/FTC+DRV+RTV mg:300/200+300+100	44
TDF/FTC/EFV mg:300/200/600	37
TDF/FTC+RAL mg:300/200+400	32
ABC/3TC+DRV+RTV mg:600/300+300+100	23
ABC/3TC+EFV 600mg/300mg+600mg	18
AZT/3TC+DRV+RTV mg:300/150+300+100	17
ABC/3TC+RAL: (600/300+400)	16
TDF/FTC+RAL+DRV+RTV mg:300/200+400+300+100	12
AZT/3TC+EFV 300mg/150mg+200mg	4
TDF/FTC+RAL+LPV/RTV mg:300/200+400+200/50	4
AZT/3TC+EFV 300mg/150mg+600mg tab+tab	2
ABC+3TC+EFV : (300+150+200)	1

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	534

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2019

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2021
Primera línea	517
Segunda línea	55
Tercera línea	0
TOTAL	572

Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2019	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
1. AZT/ 3TC + LPV/r 300/150 + 200/50		127	127
2. TDF/ FTC/ EFV 300/ 200/ 600		126	126
3. ABC/ 3TC +EFV 600/ 300/ 600		58	58
4. AZT/ 3TC + EFV 300/150/ 600		55	55
5. ABC/ 3TC + LPV/RTV 600/300 + 200/50		87	87
6. TDF + FTC + LPV/r 300/200 + 200/50		12	12
7. ABC/ 3TC + DRV + RTV 600/300 + 600 + 100		24	24
8. TDF/ FTC + DRV + RTV 300/200 + 600 + 100		16	16
9. AZT/ 3TC + NVP 300/150 + 200	112		112

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL	112	505	617

Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2019.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2019
ABC/ 3TC + LPV/RTV 600/300 + 200/50	32
AZT/ 3TC + EFV 300/150/ 600	23

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	55

Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2019
0	0

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	0

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2019 {GAM 2.3}

Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas :: Opción B+ (o "TREAT ALL")

Si Otra opción de PTMI utilizada en su país, especifique:

Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2019	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2019
1.	

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	0

Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2019

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	0

Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2019.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2019.

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+ en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2019
TDF / 3TC + RAL	533

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	533

Pregunta 14. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2019.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2019	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2019
AZT	486

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	486

4 Servicios de laboratorio

PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 2019: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	1312130

PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 16. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2019:	38622
Pregunta 17. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2019:	19311
Pregunta 18. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2019:	19311
Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2019:	533

CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 20. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2019:	39365
Pregunta 21. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2019:	19600
Pregunta 22. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2019:	19600
Pregunta 23. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2019:	533

DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
Pregunta 24. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2019:	486
Pregunta 25. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2019:	143

Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida					
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)					
CD4					
Carga viral					
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH					
GeneXpert (prueba de tuberculosis)					

Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2019. Elimine aquellas que su país no posea.

Tecnologías para pruebas de CD4

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2019
Alere Pima Analyzer											
Apogee Auto40 Flow Cytometer											
BD FACSCalibur											
BD FACSCount											
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter											
Coulter Epics											
Millipore-Guava											
Partec CyFlow											
Partec miniPOC											
PointCare NOW											

Otras tecnologías para pruebas de CD4

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2019
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Tecnologías para pruebas de carga viral

	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2019
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplikor (Roche)											
Roche Amplikor HIV-1 DNA test (B) / Amplikor											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											

GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											

(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)

(B) - Ensayos utilizados para la detección cualitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).

Por favor enumere más abajo otras tecnologías virológicas que se utilicen en su país pero no enumeradas en la tabla (especifique.)

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2019
-----------------	----------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

5 Metas del país con fines de proyección

Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.

Meta del país

	A fines del 2020	A fines del 2021	A fines del 2022	A fines del 2023	A fines del 2024	A fines del 2025
1. Número de adultos y niños que reciben TAR						
1.1 : Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años que reciben TAR						
1.2 : Número de niños < 10 años que reciben TAR						
1.2.1 : Número de niños < 5 años que reciben TAR						
1.2.2 : Número de niños de 5 a < 10 años que reciben TAR						
2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH						
2.1 : Número de embarazadas en Opción B+						
2.2 : Número de embarazadas en Opción B						
2.3 : Número de embarazadas en Opción A						
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4						
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral						
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano						
7. Número total de pruebas serológicas del HIV						
8. Número de pruebas de CD4						
9. Número de pruebas de carga viral						
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses						

Pregunta 29: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.

Adultos

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2020-2022.

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
---	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH			

Pregunta 31. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.

Tratamiento antirretroviral en niños

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Question 32. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.

Número de pruebas realizadas en el 2019 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas realizadas en 2019	Pruebas previstas para 2020	Pruebas previstas para 2021	Pruebas previstas para 2022
Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)				
CD4 test				
Carga viral				
Diagnóstico temprano infantil de VIH				