

GAM Online Reporting Tool

Ecuador - 2020

I Portada

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) Comité Nacional de Sida o equivalente: No sé

b) Programa Nacional de Sida: Sí

c) Otros: Sí

Si son otros, especifique: INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD (RPIS).

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: No

Ministerio de Salud: Sí

Ministerio de Trabajo: Sí

Ministerio de Asuntos Exteriores: No

Otro Ministerio: No

Si es otro Ministerio, especifique:

Organizaciones de la sociedad civil: Sí

Personas que viven con el VIH: No

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: No

Organizaciones bilaterales: No

ONG internacionales: Sí

Otros: No

Si son otros, especifique:

3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?: No

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Sí

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: FERNANDA VELEZ / RESPONSABLE DE M&E

Dirección(es):: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS PREVENCIÓN Y CONTROL

Correo(s) electrónico(s):: fernanda.velez@msp.gob.ec

Teléfono(s):: 0984741635

II Reporte narrativo

Visión general: La Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida del 2016 refleja la estrategia de respuesta rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del Sida para 2030. En esta declaración se establece metas ambiciosas para el escalamiento de la prevención, el tratamiento y abordajes estructurales del VIH para superar la epidemia en los próximos años. Para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales respecto a la epidemia del VIH/sida en el Ecuador, los actores involucrados se han planteado retos en conjunto que permitan abordar las estrategias frente al VIH/sida de manera multidisciplinaria y corresponsable. Estos esfuerzos conjuntos entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales permitieron el fortalecimiento del algoritmo diagnóstico para mejorar la captación oportuna, a través de pruebas rápidas, poniendo énfasis a grupos de alto riesgo y población clave, como mujeres embarazadas para la prevención de la transmisión materno-infantil de VIH. La Vigilancia Epidemiológica es un proceso primordial para el mejoramiento en la respuesta de los servicios de salud, dado que constituye la segunda función esencial de la salud pública, siendo una herramienta para difundir la información mediante la recolección, consolidación y el análisis para la acción de los diversos eventos de interés epidemiológico y de salud pública. Actualmente el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) realiza atención médica integral y dotación de terapia antirretroviral a personas que viven con VIH, sumándose a los esfuerzos con ONUSIDA, mismo que tiene como objetivo para el 2020 que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH; el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral continuada el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan carga viral suprimida.

COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020: Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos 90-90-90, el Ministerio de Salud Pública a través de Estrategia Nacional de VIH/sida (ENVIH) para el año 2020, inició con la implementación de los siguientes documentos normativos: 1.- Guía de Práctica Clínica de "Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos. 2.- Documento de la "Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas" (ETMI plus). 3. Se socializó en la GPC de "Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos, dirigido a profesionales de las Unidades de Atención Integral a PVVs, responsable zonal de VIH y demás personal de salud del MSP 4. Capacitación e implementación del submódulo de VIH del sistema informático Plataforma de Registro de Atenciones en Salud (PRAS) al personal de salud del MSP y Establecimientos de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) con la capacitación e implementación en los Módulos VIH Externos y VIH laboratorios en Unidades de Atención Integral de IESS, ISSFA e ISSPOL; y capacitación e implementación del Módulo VIH INSPI. Para el año 2020 se tiene previsto: · Socializar y capacitar en documentos normativos y submódulo de PRAS a profesionales del Sistema Nacional de Salud y monitorear su implementación. · Certificar a las Unidades de Atención Integral de VIH · Lineamientos y reestructuración de los Comités Nacional y Zonales · Proceso de transición a esquemas de tratamiento según la GPC vigente

COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018: La "Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas" (ETMI plus), que es uno de los pilares para enfrentar a la epidemia del VIH/sida en el país, que durante su implementación se estima tener una cobertura del 100% a todas las mujeres embarazadas antes, durante y después de su parto. El 75% de niños que nacen de madres seropositivas son sometidos a una prueba virológica del VIH, durante sus dos primeros meses de vida, pues a pesar de los avances que se tiene sobre la captación oportuna a través de tamizajes de VIH a toda mujer durante el embarazo y el parto, combinar regímenes profilácticos, tratamiento con medicamentos antirretrovirales y fortalecer el asesoramiento a la madre sobre lactancia y alimentación infantil, todavía nacen niños infectados por el VIH, obteniendo para el año 2020 una tasa de transmisión materno infantil del 2.7%. En el año 2020 se garantizó la disponibilidad del "Kit Verde" en todos los establecimientos que realizan atención de partos. Este kit contiene los medicamentos esenciales para eventos de partos en fase expulsivo de mujeres con VIH.

COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos): Actualmente en el Ecuador, entre las opciones de prevención combinada que se garantizan está la dotación de preservativos y lubricantes, así como la profilaxis post exposición ya sea por exposición laboral al virus o exposición no laboral como en el caso de abusos sexuales. En lo que respecta al método de profilaxis previa a la exposición (PREP), el país se encuentra iniciando su implementación y socialización en todo el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, la circuncisión masculina médica voluntaria no se han implementado en el país ya que la epidemia se caracteriza por ser de tipo concentrada. El MSP-ENVIH, estableció un convenio interinstitucional con la Corporación Kimirina en el año 2019 para realizar un plan piloto de entrega de PREP, el mismo se ha venido ejecutando en el año 2020 en las 2 ciudades principales de País, como son Quito y Guayaquil, este proyecto está dirigido a grupos de población clave (HSH, TRANS y TS) personas consideradas con alto riesgo de contraer la enfermedad.

COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020: La Constitución de la República del Ecuador del 2008 contempla leyes contra todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, así como también garantizan los derechos de las personas que viven con el VIH y de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual. En este marco, en el año 2019, el MSP emitió la Norma técnica para la "Atención integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos". En el año 2020 se realizaron capacitaciones en la Norma técnica, seguimiento de su aplicación y el abastecimiento del medicamento profiláctico para VIH/sida-ITS.

COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año: El MSP garantiza el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva a personas de toda la población etaria según el Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS, tanto para la oferta de métodos de planificación familiar y la entrega de preservativos que se realiza a libre demanda en los dispensadores ubicados en lugares visibles y fácil acceso de los establecimientos de salud.

COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020: El Ecuador aún mantiene el compromiso de que sólo los niños que viven con el VIH se beneficien del programa de protección social "Joaquín Gallegos Lara", el cual contempla la dotación de un bono mensual de \$240 USD a los niños infectados por VIH menores de 14 años de edad. Este compromiso aspira que se mantenga pese a la grave situación económica que ha ocasionado la emergencia sanitaria por COVID19 y será un reto asumirlo como país ya que el VIH no es considerado una patología catastrófica para incorporarla en programas de protección social.

COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020: La plataforma de salud más grande que tiene el Ecuador es del MSP y con el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) las acciones para la prevención del VIH deben acercarse más a las comunidades a través de los Equipos Integrales de Salud-EAIS y con la incorporación de los Técnicos de Atención Primaria en Salud- TAPS, quienes realizan visitas domiciliarias a nivel de territorio concentrándose en atención comunitaria ofreciendo atención de promoción y prevención. Las ONGs vienen desarrollando actividades en diferentes ciudades del Ecuador en: asesoría de pares, tamizaje comunitario con la oferta de prueba de VIH a personas de población clave en lugares de encuentro con horario diferenciado, acompañamiento de las PVVs a los establecimientos de salud del MSP, entrega de condones y lubricantes, estos esfuerzos han significado avances importantes para la captación y referencia de los diagnósticos en estas poblaciones.

COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales: Debido a la crisis sanitaria y económica que vive el País, en el año 2020 el presupuesto destinado para la respuesta nacional de VIH se vio afectado disminuyendo en un 0.68 % en relación al año 2019. El presupuesto ejecutado en el año 2020, correspondiente al gasto relativo al VIH por origen de recursos fue de a USD 10'976.936,65 , destinados principalmente a la compra de tratamiento antirretroviral y dispositivos médicos (información incluye MSP-ISSFA-ISSPOL) y charlas de sensibilización del VIH dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales por un valor total de 18.884,79.

COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos

para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos: Además de los derechos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador 2008, las personas que viven con el VIH pueden recibir asesoría legal a través de organizaciones de la Sociedad Civil como la Coalición Ecuatoriana de personas que viven con VIH, Defensoría del Pueblo, así como las instancias legales establecidas en el país para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos. La Coalición viene desarrollando una escuela de defensores de derechos en las ciudades de Guayaquil y Loja. El reto más importante es continuar con estos procesos ya que esta red de defensores significa una gran fortaleza para sus pares.

COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C: Las normativas actuales de VIH y Tuberculosis contemplan el tratamiento antirretroviral, así como el tratamiento de la Tuberculosis en todos los casos de coinfección ya que la Tuberculosis es la primera causa de Coinfección en el País. Así mismo se encuentra en proceso de normalización la realización de pruebas de diagnóstico para descartar otras coinfecciones como: Hepatitis B, Hepatitis C. Dichos insumos como los reactivos y/o pruebas de diagnóstico no se encuentran disponibles en todos los laboratorios a nivel nacional, por lo que no todos los PVV pueden acceder a estas pruebas de laboratorio; al momento el país no cuenta con medicamentos para tratar la Hepatitis C, y a su vez no cuenta con un protocolo de manejo para la hepatitis B y C y terapia combinada con VIH y VHB para las personas coinfectadas.

90-90-90 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 1.1,1.2 y 1.3)

Instrucciones: Se alienta a todos los países con poblaciones >250 000 a utilizar los datos de sus archivos finales de Spectrum para la Parte 2. Para países utilizando sus archivos finales de Spectrum, la Parte 1 no necesita ser completada. Si datos desglosados de forma detallada por edad/sexo o por area subnacional/ciudad están disponibles, favor completar las Partes 3 y 4.

Favor ver las directrices de GAM y documentos de preguntas frecuentes para más detalles.

Utilizar datos del archivo final de Spectrum: Sí

Parte 1. Metadatos de indicadores (favor completar solamente en caso de no estar utilizando los datos del archivo de Spectrum final).

1.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

1.3 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

1.1,1.2 y 1.3 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH				
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
Indicador 1.1 Numerador : Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH						
Indicador 1.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretroviral						
Personas que inician tratamiento antirretroviral						
Personas que reinician el TAR (entre los que iniciaron el TAR)						
Indicador 1.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral						
Indicador 1.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral						
Indicador 1.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral						

Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 90-90-90

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 90 años)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 81%)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 73%)*.				
Porcentaje (%) : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 90)				
Porcentaje (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 90)*.				
Cobertura de carga viral (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral				

Parte 3. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

Nota: Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	Niños (< 5)	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH											
Indicador 1.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretrovira											
Indicador 1.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretrovira que tienen supresión de la carga viral											
Indicador 1.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral											
Indicador 1.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretrovira											

Parte 4. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]

Ciudad	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 1.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 1.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 1.3 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 1.3 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 1.3 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
Quito						

1.4 Diagnóstico tardío del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Formularios de información de casos

Otra herramienta/fuente de medición:: La información corresponde a datos de notificación MSP / formulario 002 y formulario 003; Registros administrativos del IESS

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3

	Todos	Niños (12-35 m): 750 células/mm3 o CD4<20%	Niños (36-59 m): 350 células/mm3 o CD4<15%	Niños (5-14): 200 células/mm3 o CD4<15%	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa	18.4	26.7	0	60	19.5	15.1
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 en el momento del diagnóstico	413	4	0	3	314	92
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 at the time of diagnosis	2242	15	1	5	1610	611

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3

	Todos	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa	29.3	31.3	24.1
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 en el momento del diagnóstico	651	504	147
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	2221	1610	611

1.5 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Consolidado de la información enviada desde las coordinaciones zonales y establecimientos de salud del MSP 2020.

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Fuente: Ministerio de Salud Pública. Base de datos la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Clínica general	Centro maternoinfantil	Centro para tratamiento de tuberculosis
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0	0	0	0
Numerador : Porcentaje de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0	0	0	0
Denominador : Número total de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales durante ese mismo periodo	45	41	4	45

1.6 Mortalidad relacionada con el Sida

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Tasa : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

< 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Los registros del programa de servicios de pruebas para el VIH, los diarios y formularios de notificación

Otra herramienta/fuente de medición: Formulario 004 Tamizajes Registros administrativos / Care y Kimirina, Proyecto Fondo Mundial / Subvención 2020 - 2023

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Tamizajes para determinación de VIH (PR 4ta generación y 3era generación) Algoritmo Diagnóstico MSP - Guía de Práctica Clínica / Junio 2019 Población General Embarazadas Mujeres en Puerperio Grupos de Población Clave

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Proporcione cualquier información sobre campañas de pruebas nacionales o cambios en las estrategias de pruebas que puedan explicar cualquier cambio en el volumen de prueba en comparación con años anteriores.:

Datos de las tasas de repetición de pruebas en personas VIH-negativas y VIH-positivas:

Total y desglose por edad

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.5			
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	2885			
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	625660			

Por modalidad de prueba: Pruebas a nivel de instalaciones

	Todas las pruebas a nivel de instalaciones	Prueba iniciada por el proveedor en clínicas o instalaciones de emergencia	Clínicas de atención prenatal (incluyendo el embarazo y el parto)	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (incluyen las instalaciones sanitarias)	Clínicas de TB	Clínica de planificación familiar	Otras pruebas a nivel de instalaciones
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural							
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)							
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)							

Por modalidad de prueba: Reporte de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad

	Todos los reportes de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad	Pruebas móviles	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (no incluyen las instalaciones sanitarias)	Otras pruebas basadas en la comunidad
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural				
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)				
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)				

Autodiagnóstico

	Valor de datos
Cantidad suministrados : Cantidad de equipos de autodiagnóstico adquiridos (no distribuidos o utilizados) por el gobierno en un año, incluyendo (entre otros) los donados	
Cantidad distribuidos : Número total de equipos individuales de autodiagnóstico distribuidos en un año	

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información desde la EN ETMI

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Herramienta/fuente de medición:

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los lactantes examinados solo deben contarse una vez. El numerador no debe incluir lactantes estudiados después de dos meses.	
Resultado de la prueba - Positivo	
Resultado de la prueba - Negativo	
Resultado de la prueba - Indeterminado	
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	
Resultado de la prueba - Otro	

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum:

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
Quito			

2.2 Transmisión materno-infantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente:

Si la respuesta es «Otras», especifique:

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión materno-infantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	
Numerador : Número estimado de niños recién infectados por el VIH por transmisión materno-infantil en los 12 meses anteriores	
Denominador : Número estimado de partos en mujeres con el VIH en los últimos 12 meses	

2.3 Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido de los registros de la clínicas de atención prenatal/prevención de la transmisión materno-infantil y sobre los pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Si la respuesta es «Otras», especifique:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil excluirán a las mujeres que hayan recibido nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única. Este recuento debe incluir a todas las mujeres que hayan dado a luz en los últimos 12 meses, independientemente del año en que comenzaron con medicamentos antirretrovirales.	
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Otras En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
Quito							

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) y proyección de población MSP 2020. Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Numerador 1: La información 2020, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en RDACAA1.6 + PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2020 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo rural, Obstetrix, Ostetrix rural, Psicólogo. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades Medicina General Integral, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Rural, Ginecología y Obstetricia, Atención Primaria en Salud, medicina general, obstetricia y obstetricia rural. 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de prevención según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z300 - Z302, Z304, Z308, Z309, Z310, Z316, Z318, Z319, Z3001-Z3004, Z3010- Z3013, Z3041- Z3043, Z3081, Z3082, Z3911]. 6: La información se obtiene a partir de la ficha metodológica: Cobertura de atenciones en planificación familiar en el MSP 7: La información corresponde a mujeres Denominador 8: Proyección de la población MSP fértil de 15 a 49 años (*) Información 2020 sujeto a variación

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:
mixtas/desconocidas

A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	11.3
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	512559
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	4556002

En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Numerador : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva			
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis			
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis			

C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	
Numerador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	
Denominador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	

2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente: Egresos hospitalarios MSP 2020.

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos: Fuente: Egresos hospitalarios 2020.

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: No sé

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/index.html>:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	30.7
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	73
Denominador : Número de nacimientos	238

2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de información ENVIH

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH	79.8	
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro sanitario que se habían hecho pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran VIH-positivas en la primera visita de asistencia prenatal.	228161	
1. Infección por el VIH conocida (positiva) al registrarse en la clínica prenatal		
2. Con resultado positivo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo o el parto. Esto excluye a las mujeres que ya conocían su estado positivo de VIH antes del embarazo actual.		
3. Con resultado negativo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual o el parto. Esto debe basarse en los últimos resultados de pruebas en caso de repetición de la prueba.		
Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)	572	
Denominador basado en la población : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	285827	
Denominador basado en el programa : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro sanitario en los últimos 12 meses		

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje (utilizando un denominador basado en la población)	Numerador	Denominador basado en la población
Quito			

3.1 Incidencia del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
Quito										

3.2A Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: El país no dispone de estudios o estimaciones de grupos de población clave - Profesionales del Sexo. Se están haciendo esfuerzos y se estima contar con un estudio de talla población en grupos de población clave a nivel nacional.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos: El país no dispone de estudios o estimaciones de grupos de población clave - Profesionales del Sexo. Se están haciendo esfuerzos y se estima contar con un estudio de talla población en grupos de población clave a nivel nacional.

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2B Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: El país no dispone de estudios o estimaciones de grupos de población clave - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Se están haciendo esfuerzos y se estima contar con un estudio de talla población en grupos de población clave a nivel nacional.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2C Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: El país no cuenta con estudios ni estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2D Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: El país no dispone de estudios o estimaciones sobre el tamaño de grupos de población

clave: Personas transgénero. Se están haciendo esfuerzos y se estima contar con un estudio de talla población en grupos de población clave a nivel nacional.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

3.2E Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):

Datos sub-nacionales - Presos

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito		

3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan encuestas o estudios para medir este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven del VIH						
Numerador : Número de profesionales del sexo que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan encuestas o estudios para medir este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven del VIH			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se someten a pruebas sobre el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: El País no cuenta con encuestas especiales para la medición de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven del VIH						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: El País no cuenta con encuestas especiales para la medición de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven del VIH						
Numerador : Número de personas transgénero que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Consolidación de la información reportada por las coordinaciones zonales de forma trimestral durante el año 2020.

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven del VIH	0.6					
Numerador : Número de presos que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	60					
Denominador : Número de presos que se someten a pruebas sobre el VIH	9899					

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito							

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.4A Pruebas de VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4B Pruebas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH			
A : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
B : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
Numerador (A + B) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4C Pruebas de VIH entre personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas que usan drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
Ciudad/Ciudad	Quito										

3.4D Pruebas de VIH entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado

3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.5B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Numerador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Denominador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.5C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.5D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.5E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de los presos que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de los presos que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

3.6C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.6D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Numerador : Número de personas transgénero que notificaron haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas que notificaron haber tenido relaciones sexuales o haber practicado el sexo anal en los últimos seis meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

3.7A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Numerador : Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo.					
Numerador : Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables con los que se contacta con intervenciones de prevención diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
(datos del indicador 3.9) : Número de agujas y jeringas distribuidas					
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de

salud sexual)?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero.					
Numerador : Número de personas transgénero a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de personas transgénero					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Total y desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Índice : Número de agujas y jeringas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas					
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los programas de agujas y jeringas					
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Número de agujas distribuidas por persona y año	Numerador	Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito				

3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: No se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Total y desglose por género y edad

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país						

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos					
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.					
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: No se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa				
Numerador : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa				
Denominador : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa				

3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: No se dispone de información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	
Numerador : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	

3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Valor de datos
Número de agujas limpias distribuidas entre presos	
Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos	
Número de preservativos distribuidos entre presos	
Número de presos que reciben terapias antirretrovirales	
Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH	

Personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	
Numerador : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	

Presos con hepatitis C solamente

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan infección por la hepatitis C	
Numerador : Número de presos que presentan infección por la hepatitis C	

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
Numerador : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
Numerador : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B									

Hepatitis C

Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C									

3.15 Personas que recibieron PrEP

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos)

Otra herramienta/fuente de medición: REGISTROS DEL PROGRAMA

Desde la fecha: 21/08/2019

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: La información es proporcionada por Corporación Kimirina, quien trabaja en acciones de prevención, dirigidos a grupos de población clave (HSH y MTF con alto riesgo de contraer VIH), las actividades comunitarias las realiza a través de promotores pares, lo cual contempla la entrega medicamento antirretroviral (profilaxis pre exposición). Las actividades son ejecutadas en el marco del convenio interinstitucional entre Ministerio de Salud Pública y Corporación Kimirina, en las 2 ciudades principales del País: Quito y Guayaquil.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe
Todo	277	252	5	20	0	277
<15	0	0	0	0	0	0
15-19	11	11	0	0	0	11
20-24	50	48	1	1	0	50
25-49	212	190	4	18	0	212
50+	4	3	0	1	0	4
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
Edad desconocida						
Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe	277	252	5	20	0	

Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Presos
Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe	252	5	20	0	0
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron la PrEP oral diaria al menos una vez durante el periodo de referencia	252				
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que recibieron la PrEP basada en eventos al menos una vez durante el periodo del informe	252				

Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
QUITO-GUAYAQUIL Y OTRAS	277	252	5	20	0

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe
Quito	
Guayaquil	
Otras	

3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
Numerador : El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
Denominador : Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Público	Privado	Organizaciones no gubernamentales
Preservativos masculinos : Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses				
Preservativos femeninos : Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses				

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses
Quito		

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Indicador compuesto: Respondieron "No" a la pregunta 1, a la pregunta 2 o a ambas preguntas (solamente se debe completar esta tabla si los datos para la pregunta 1 y la pregunta 2 son de la misma fuente).

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

4.2A Evitación de los servicios de salud por parte de los profesionales del sexo por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2B Evitación de los servicios de salud por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2C Evitación de los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.2D Evitación de los servicios de salud por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

Datos específicos de ciudades

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
Quito							

4.3 Prevalencia de violencia reciente por parte de una pareja íntima

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental

	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses				
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses				
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual				

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental desagregada por estado del VIH

	Mujeres seropositivas (15-49)	Mujeres seronegativas (15-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-49)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses												
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses												
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual												

4.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Desagregados por tipo de servicio de salud

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Numerador - desglosado por tipo de estigma y discriminación experimentado

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"			

Cualquier servicios de salud: desagregados por género, edad y población clave

	Hombres	Mujeres	Transgénero	15-19	20-24	25-49	Poblaciones clave (Respuesta identificada con al menos una población clave)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Denominador : Número de encuestados							

Cualquier servicios de salud: desagregados por tiempo de estar viviendo con el VIH

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15+ años
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Denominador : Número de encuestados					

LAC2.3.1bA Trabajadoras sexuales que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador

LAC2.3.1bB Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bC Personas que usan drogas inyectables que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyectó drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bD Personas transgénero que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla B. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de atención médica o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bE Miembros de una población vulnerable que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Población vulnerable a la que se refiere la encuesta:

I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo en un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC4.1.1 Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de datos del Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses - Ecuador - 2020

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: No se dispone de datos

Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos			

Datos sub-nacionales

Sitio	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas Intersexuales
-------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

LAC5.1.1 Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de datos oficiales, dentro del programa se reciben quejas de Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave, pero no lo hacen de manera oficial a través de denuncia escrita. solo se reportan de manera verbal o mediante llamada telefónica en los Establecimientos de Salud o Planta Central.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: No se dispone de datos oficiales, dentro del programa se reciben quejas de Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave, pero no lo hacen de manera oficial a través de denuncia escrita. solo se reportan de manera verbal o mediante llamada telefónica en los Establecimientos de Salud o Planta Central.

Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Sitio	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero

5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de datos, en el País no se realizan este tipo de encuestas.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: No se dispone de datos, en el País no se realizan este tipo de encuestas.

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de datos, en el País no se realizan este tipo de encuestas.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: No se dispone de datos, en el País no se realizan este tipo de encuestas.

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	15-19	20-24	25-49
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos				
Numerador : Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos				
Denominador : Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar				

10.1 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente: Estategia Nacional de TB / Estrategia Nacional de VIH Registros administrativos

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	455	322	133		

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2020, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2020 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Numerador
Quito	51
Guayaquil	226
Santa Elena	87

10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador y denominador)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente: Estaregia Nacional de TB / Estrategia Nacional de VIH

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Información de PVV con coinfección VIH-TB en tratamiento en el año 2020

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas con VIH con tuberculosis (TB) activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se incluyen por primera vez en el tratamiento para el VIH durante el periodo de notificación	11.1
Numerador : Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	425
Denominador : Número total de personas que se incluyeron por primera vez en tratamiento frente al VIH (es decir los que se registraron para tratamiento antirretroviral durante el periodo de notificación)	3823

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje	Numerador	Denominador
Quito - ZONA 9	0.96	37	3823
Guayaquil - ZONA 8	7.24	277	3823
Santa Elena - ZONA 5	2.19	84	3823

10.3A Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes con tuberculosis

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Se dispone de nuevos datos sobre las que recibían tratamiento preventivo RECIÉN incluidas en tratamiento para el VIH?: Sí

Indique cuáles de los siguientes datos se utilizaron para determinar el número de personas elegibles para recibir TPT (consulte las directrices del GAM 2021 para conocer la fórmula recomendada):

	Número de personas en tratamiento antirretroviral al final del último periodo de notificación	Número de pacientes de tuberculosis seropositivos notificados en el último periodo de notificación	Número de personas que viven con el VIH que han recibido previamente TPT	Personas que viven con el VIH que no son elegibles para el TPT debido a comorbilidades	Si se dispone de datos sobre personas no elegibles debido a comorbilidades, especifique qué comorbilidades se incluyeron:
-					

PVVIH elegibles en TAR que iniciaron TPT

	Valor de datos	Nuevo en la terapia antirretroviral en los últimos 12 meses	Con tratamiento antirretroviral >12 meses	Niños (< 5)	Niños (5-14)	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral y elegibles para el tratamiento preventivo de la tuberculosis (TPT) que inician el TPT durante el período de notificación	2.3								
Numerador : Número total de personas que reciben terapia antirretroviral y son elegibles para TPT que comienzan con TPT durante el período de notificación.	72								
Denominador : Número total de personas que reciben terapia antirretroviral y que son elegibles para recibir el TPT durante el período de notificación	3116								

Numerador por tipo de régimen - Número de personas elegibles en TAR que iniciaron el TPT durante el periodo del informe

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	Otro
Adultos (15+)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			
Niños (0-14)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de personas en TAR elegibles para el TPT que iniciaron el TPT durante el periodo del informe	Número total de personas elegibles en TAR que iniciaron TPT durante el periodo de notificación	Número total de personas en tratamiento antirretrovírico elegibles para el TPT durante el periodo de notificación

¿Se dispone de datos sobre las personas que reciben tratamiento preventivo contra la tuberculosis (TPT) entre los que reciben tratamiento antirretroviral? (independientemente de la elegibilidad): No

PVVIH en tratamiento antirretroviral que iniciaron TPT

	Valor de datos	Nuevo en la terapia antirretroviral en los últimos 12 meses	Con tratamiento antirretroviral >12 meses	Niños (< 5)	Niños (5-14)	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron el TPT durante el periodo de referencia									
Numerador : Número total de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron el TPT durante el periodo de referencia									
Denominador : Número total de personas en tratamiento antirretroviral durante el periodo de referencia									

Numerador por tipo de régimen - Número de personas elegibles en TAR que iniciaron el TPT durante el periodo del informe

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	Otro
Adultos (15+)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			
Niños (0-14)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron el TPT durante el periodo de notificación	Número total de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron el TPT durante el periodo de notificación	Número total de personas en tratamiento antirretroviral durante el periodo de referencia

10.3B Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un ciclo de tratamiento preventivo de la TB (TPT) entre los que iniciaron el TPT

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

-

	Valor de datos	Comenzó con ART en 2019	Comenzó con ART antes de 2019	Niños (< 5)	Niños (5-14)	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un curso de tratamiento preventivo de la tuberculosis entre los que iniciaron el TPT									
Numerador : Número de personas en terapia antirretroviral que completaron el TPT entre las que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior, p. ej., cohorte de 2019 para el informe de 2021									
Denominador : Número de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior (ingrese el mismo año de cohorte que en el numerador: p. ej., 2019 para informes de 2021)									

Numerador por tipo de régimen - Número de personas en tratamiento antirretroviral que completaron el TPT entre los que iniciaron cualquier curso de TPT durante el año anterior (por ejemplo, cohorte de 2019 para la presentación de informes de 2021)

	6 meses en monoterapia con isoniácida diaria (6H)	3 meses con rifapentina semanal más isoniácida (3HP)	Otro
Adultos (15+)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			
Niños (0-14)			
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:			

Datos específicos de ciudades

Ciudad	Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un curso de TPT entre los que iniciaron TPT	Número de personas en tratamiento antirretroviral que completaron el TPT entre las que iniciaron algún curso de TPT durante el año anterior (por ejemplo, cohorte de 2019 para la presentación de informes de 2021)	Número de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron algún ciclo de TPT durante el año anterior (debe ser el mismo año de cohorte que el del numerador, por ejemplo, 2019 para los informes de 2021)
--------	--	---	---

10.4 Hombres con secreción uretral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0) y Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS). Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: 1: La información 2020, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en RDACAA1.6 + PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2020 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería Numerador 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [R36X,N340, N342, N485]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye hospital (*) Información 2020 sujeto a variación

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	0
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	204
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad	3388326

10.5 Gonorrea entre la población masculina

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0) y Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS). Elaborado por: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2020

Hasta la fecha: 31/12/2020

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: 1: La información 2020, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en RDACAA1.6 + PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2020 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería Numerador 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A540, A542, A549,N518,N510]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye

hosvital (*) Información 2020 sujeto a variación

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
Índice : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	0
Numerador : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	522
Denominador : Número de hombres de 15 años de edad o más	3388326

10.6 Pruebas de hepatitis C

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se dispone de esta información En el año 2020 no realizarán tamizajes de hepatitis C

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos						
Denominador : Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

10.7 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No se cuenta con estaq información

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

10.8 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Encuesta poblacional

Mujeres que viven con el VIH que se reportan haber sido revisadas para el cáncer cervical

	15-49	15-29	30-49
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres que viven con el VIH que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba del virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que comunican no haber sido nunca sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino utilizando alguno de los siguientes métodos: inspección con ácido acético (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba del virus del papiloma humano (VPH)			
Número de mujeres con VIH que notifican haberse sometido a una prueba de cribado del cáncer cervical el año pasado			
Denominador : Todas las mujeres encuestadas que viven con el VIH			

II. Datos del programa

Mujeres con VIH que alguna vez se han sometido a detección del cáncer cervical

	15-49	15-29	30-49
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres con VIH que alguna vez se han sometido a pruebas de detección de cáncer cervical con alguno de los siguientes métodos médicos: VIA, citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres con VIH que alguna vez se han sometido alguna vez a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero con alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			
Número de mujeres con VIH que se han sometido a una prueba de cribado del cáncer cervical el año pasado			
Denominador : Todas las mujeres con VIH			

Mujeres que dieron positivo en la prueba del VIH entre las mujeres que fueron revisadas para el cáncer cervical

	30-49	Residencia: Urbana	Residencia: Rural
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres con resultado positivo de VIH entre todas las mujeres sometidas a detección de cáncer cervical con alguno de estos métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			
Numerador 1 : Número de mujeres que se sometieron a pruebas de VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical			
Número de mujeres que dieron positivo en VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical el año pasado			
Numerador 2 : Número de mujeres que dieron positivo en VIH entre todas las mujeres que se sometieron a detección del cáncer cervical			
Denominador : Todas las mujeres sometidas a detección de cáncer cervical con alguno de estos métodos: VIA, citología vaginal o prueba del VPH			

III Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: En el año 2020 el Ministerio de Salud Pública, no emitió documentos normativos o instrumento de compromisos y Políticas Nacionales para el VIH en el Ecuador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Descargar este formato: [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describa el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
---------	--------------------	--------------	-------	--------------------------	-------------

A.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Pruebas sobre VIH

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?:

3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas de autodiagnóstico sobre VIH como política o plan nacional?:

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas de forma rutinaria las pruebas de autodiagnóstico del VIH en su país?:

3.1 Si la respuesta es negativa, ¿está en desarrollo una política o plan nacional con respecto a las pruebas de autodiagnóstico del VIH?:

3.2a Si la respuesta a la Pregunta 3.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas de autodiagnóstico::

4. ¿Ha incluido su país remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas) en su política nacional?:

4.1 Si la respuesta es negativa, ¿hay una política o plan nacional en desarrollo con respecto a las pruebas del proveedor (notificación asistida para parejas / pruebas para parejas de individuos diagnosticados)?:

4.1a Si la respuesta a la pregunta 4.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas):

5. ¿Su país ha incluido enfoques de servicios de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional?:

5.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional en el futuro? :

5.1a Si la respuesta a la pregunta 5.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales:

6. ¿Su país ha adoptado o incluido pruebas de diagnóstico rápido duales sobre VIH/sífilis para poblaciones clave como plan o política nacional?:

6.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH/sífilis en su política nacional en el futuro? :

6.1a Si la respuesta a la pregunta 6.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH/sífilis:

7. ¿Cuenta su país con una política que establezca que las pruebas de VIH se facilitarán?:

8. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?:

8.a Son obligatorias antes del matrimonio:

8.b Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia:

8.c Son obligatorias para ciertos grupos:

8.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquese esos grupos::

9. Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria tras un diagnóstico de VIH-positivo?:

9.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:

10. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH tras un diagnóstico de VIH-negativo?:

10.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:

Terapia antirretroviral

6. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones de la actualización para 2018 de las Directrices consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH en un procedimiento nacional?::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Favor cargar una copia de los documentos sobre las directrices nacionales actualizadas disponibles.

12. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

12.1 Si está en proceso de implementación de un tratamiento universal independientemente del recuento de células CD4, ¿cuál es la situación de implementación?::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

12.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de tratamiento universal, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de tratamiento universal en el futuro?:

12.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el tratamiento universal::

13. ¿Ha adoptado su país la Recomendación sobre el inicio rápido de terapias antirretrovirales de la OMS 2017?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

14. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer el inicio de una terapia antirretroviral el mismo día del diagnóstico del paciente con VIH?:

14.1 Si su país tiene una política sobre el inicio rápido y/o inicio el mismo día del diagnóstico, cual es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

15. ¿Hay pruebas de células CD4 disponibles para determinar la fase inmunológica?:

15.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

15.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen acceso a los clientes a las pruebas y los resultados?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

15.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el tiempo promedio para que el paciente reciba los resultados de las pruebas CD4? :

Especifique:

16. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan):

17. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (externo a las instalaciones de salud)?:

17.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿la entrega comunitaria está implementada...:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

17.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué poblaciones se proporciona la terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como fuera de las instalaciones de salud) en su país?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

17.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios de atención diferenciados utiliza su país para la recogida de medicamentos antirretrovirales (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

18. ¿Su país cuenta con una política nacional sobre la priorización del inicio de la terapia antirretroviral para personas con una situación avanzada de su enfermedad por VIH (CD4 <200 células/mm³) si no es política nacional el inicio el mismo día para todas las personas?:

19. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para adultos que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral?:

19.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::

19.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

20. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los adultos que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral deberían recoger medicamentos antirretrovirales?:

20.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::

20.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

21. Proporcione los criterios nacionales del país para (o la definición de) estabilidad en la terapia antirretroviral. Por ejemplo, las personas estables en la terapia antirretroviral durante 6 meses, sin enfermedades actuales, con buena comprensión de la adhesión de por vida y pruebas del éxito del tratamiento (al menos una prueba de carga viral por debajo de 1000 copias/ml):

22. Proporcione los criterios nacionales del país para (o definición de) «una pérdida de seguimiento». Por ejemplo, una pérdida de seguimiento se define como un paciente que no ha recibido medicamentos antirretrovirales dentro de las últimas cuatro semanas desde la última cita de recogida de medicamentos a la que no se presentó.:

23. ¿Ha adoptado su país la recomendación de la OMS de 2017 para ofrecer un paquete de intervenciones a todos los pacientes que muestren una situación avanzada de su enfermedad por VIH (definida por la OMS cómo células CD4<200)?:

23.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

24. ¿Cuál o cuáles de las siguientes intervenciones en caso de VIH en situación avanzada para la tuberculosis (TB), infecciones bacterianas graves y meningitis criptocócica se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

25. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

26. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan un centro de salud público?:

26.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se trata de tasa específico formal o informal?:

26.1.a Pruebas sobre VIH:

26.1.b Dispensado de PrEP:

26.1.c Cita de atención primaria:

26.1.d Tarjetas de paciente:

26.1.e Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral):

26.1.f Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales):

Regímenes de terapia antirretroviral

Adultos y adolescentes

27. En base a las recomendaciones de las directrices de tratamiento de la OMS de 2019, ¿es TDF + 3TC o (FTC) + DTG la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en las directrices nacionales para los siguientes grupos?:

27.a Adultos y adolescentes:

27.a.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

27.a.ii Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC (o FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2021?:

27.b Mujeres en edad de procrear:

27.b.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

27.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2021?:

27.c Mujeres embarazadas y/o lactantes:

27.c.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

27.c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2021?:

28. ¿Se está introduciendo el DTG como terapia antirretroviral de primera línea en su país?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

29. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

30. ¿En las directrices nacionales se incluye un régimen basado en DTG como opción para las combinaciones de antirretrovirales de segunda línea para adultos y adolescentes con VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Niños

31. ¿Son los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños con peso inferior a 20 kg en las directrices nacionales?:

32. ¿La terapia con DTG se recomienda como la opción de tratamiento de preferencia para iniciar el tratamiento en niños?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

33. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en niños en las directrices nacionales?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

34. ¿Se recomienda DTG como la opción de segunda línea de preferencia para los niños?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

35. ¿Se recomienda LPV/r (o ATVr) como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en DTG?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

36. ¿Se recomienda RAL como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en la inhibición de proteasa con un peso inferior a 20 kg?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Carga viral

37. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la supresión de carga viral en un individuo se define como suprimida::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

38. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre pruebas de carga viral rutinarias* para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

38.a Para adultos y adolescentes:

38.a.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

38.a.ii. Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:

38.b Para niños:

38.b.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

38.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:

39. ¿Están disponibles las pruebas de carga viral en centros de atención en algún centro sanitario de su país?:

40. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?:

41. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y adolescentes)?:

41.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad

42. ¿Cuenta su país con un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales?:

42.1 Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan::

43. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:

43.a Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR):

43.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta de PDR:	

43.b Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos:

43.b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

43.c Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil:

43.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

43.d Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano:

43.d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta sobre recién nacidos:	

43.e Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH:

43.e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se monitoreó por última vez:	
Cantidad de centros sanitarios monitoreados:	

43.e.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaron de las siguientes maneras::

44. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de segunda línea?:

45. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?:

45.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

46. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de DTG?:

46.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

46.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de DTG?:

Adherencia y retención

47. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?:

47.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

48. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

49. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?:

49.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

50. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

51. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?:

ADPIC

52. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la salud pública se incorporan en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?

	¿Están incorporadas en la legislación nacional sobre propiedad industrial/intelectual?	Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se utilizaron por última vez?	Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué productos médicos se han utilizado?
--	--	--	--

A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH

53. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH-negativas durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia?:

53.1 Si la respuesta es afirmativa, seleccione los periodos en los que debería repetirse la prueba (seleccione todas las opciones que correspondan)::

En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo::

En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto::

54. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH?:

54.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Objetivo(s) para la tasa de transmisión materno-infantil:	
Año	

	Valor de datos
Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos por 100 000 habitantes):	
Año	

55. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?:

Si la respuesta es "Otras opciones", especifique el régimen:

55.1 Si su país está aplicando la política de tratamiento universal para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

56. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda en su país para mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

57. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH?:

Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos::

Duración recomendada del régimen::

57.a ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?:

57.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes::

58. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil para recién nacidos expuestos al VIH?:

58.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?:

Si la respuesta es afirmativa, especifique la duración en meses:

59. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país con programas de prevención de la transmisión maternoinfantil?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

60. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto para mujeres que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?:

61. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país?:

Eliminación de la transmisión meternoinfantil de la sífilis

62. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis?:

63. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?:

63.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?:

63.2 En caso afirmativo, ¿cuenta su país con una política nacional para el uso de pruebas dualesde diagnóstico rápido de VIH/sífilis?:

63.2a En caso afirmativo a 63.2, ¿en qué momento se utilizan las pruebas de diagnóstico rápido duales de VIH / sífilis?:

Diagnóstico infantil temprano

64. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de ácido nucleico para la detección del VIH (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

65. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de anticuerpos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

66. Además de los entornos de prevención de la transmisión maternoinfantil, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

67. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil temprano o pruebas de ácido nucléico) en el momento del nacimiento?:

68. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del VIH a los 9 meses en su país?:

69. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del VIH a los 18 meses de edad o 3 meses después del cese de la lactancia, lo que ocurra más tarde?:

70. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención sanitaria?:

70.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

71. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil en el país?:

71.a ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria?:

72. ¿Existen intervenciones dirigidas a garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciban respuesta como parte de los programas sobre la prevención de la transmisión maternoinfantil? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

73. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en la prevención de la transmisión maternoinfantil en los últimos doce meses?:

73.1 Si la respuesta es afirmativa::

73.1.a ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?:

73.1.b ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión nacional?:

73.1.c ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus comentarios?:

73.1.d ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?:

73.1.e ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y difundieron tras esa reunión?:

73.1.f ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a la prevención de la transmisión maternoinfantil?:

Terapia antirretroviral para niños

74. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

74.1 ¿Cuál es la situación de implementación de la política sobre el tratamiento universal independientemente de la edad en su país?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

75. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los niños que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral? :

75.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

75.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los niños que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral deberían recoger medicamentos antirretrovirales?:

76.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la recogida de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

76.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

77. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?:

78. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?:

79. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?:

80. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países

con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos)

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Legislación

81. ¿Se penaliza o procesa a las personas transgénero en su país?:

81.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años?:

81.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL:

81.2 Si se penaliza a las personas transgénero, ¿ha habido moratorias en la ley en los dos últimos años? :

82. ¿Está penalizado el trabajo sexual en su país? (Seleccione todas las opciones que correspondan, incluso si la penalización es a nivel subnacional):

82.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años?:

82.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL.:

82.2 Si existen leyes que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:

83. ¿Tiene su país leyes que criminalicen los actos sexuales entre personas del mismo sexo?:

83.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años?:

83.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL.:

83.2 Si existen leyes que penalizan actos sexuales entre personas del mismo sexo, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:

84. ¿Mantiene su país la pena de muerte en su legislación para personas condenadas por delitos relacionados con drogas, independientemente de que se implemente?:

84.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de aplicación?:

85. ¿Constituye un delito en su país el consumo o posesión de drogas para uso personal? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

85.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años? :

85.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL.:

85.2 Si existen leyes que penalizan el uso o la posesión de drogas para el uso personal, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:

86. ¿La ley permite la posesión de una cantidad limitada de drogas para uso personal?:

87. ¿Aplica su país una detención obligatoria o rehabilitación obligatoria de las personas que usan drogas en instalaciones cerradas?:

88. Más allá de la criminalización, ¿cuenta su país con otras leyes punitivas que afecten a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI)?:

Sí, otras (especifique)::

Protecciones legales para grupos de población clave

89. ¿Alguno de los siguientes organismos ha interpretado que alguna prohibición constitucional contra la discriminación incluya la identidad de género?

89.a Tribunales:

89.b Política gubernamental:

90. ¿Cuenta su país con leyes de reconocimiento de género o políticas que permiten el cambio de sexo?:

90.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se reconocen legalmente géneros que no sean el femenino o el masculino?:

90.2 Si la respuesta a la pregunta 90 es afirmativa, ¿se requiere algo de lo siguiente para cambiar de género (seleccione todas las opciones que correspondan)? :

Si la respuesta es "Otro", especifique:

90.3 Si la respuesta a la pregunta 90 es afirmativa, ¿es legalmente posible cambiar el indicador de género en alguno de los siguientes documentos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

90.3.a Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las anteriores opciones, ¿se requiere un certificado de reconocimiento de género, otro certificado reconocido por el estado o una carta de un profesional médico para realizar estos cambios? :

91. ¿Es legalmente posible cambiarse el nombre por uno de otro género en cualquiera de los siguientes documentos? (seleccione todas las opciones que correspondan):

91.1 Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las anteriores opciones, ¿se requiere un certificado de reconocimiento de género, otro certificado reconocido por el estado o una carta de un profesional médico para realizar estos cambios?:

92. ¿Alguno de los siguientes organismos ha que interpretado que alguna prohibición constitucional contra la discriminación incluya la prohibición de discriminación por el trabajo sexual?:

92.a Tribunales:

92.b Política gubernamental:

92.c ¿Existen otras disposiciones legales contra la discriminación que hagan referencia al trabajo sexual?:

93. ¿Alguno de los siguientes organismos ha que interpretado que alguna prohibición constitucional contra la discriminación incluya la prohibición de discriminación por el

trabajo sexual?

93.a Tribunales:

93.b Política gubernamental:

94. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccione todas las opciones que correspondan):

95. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que se apliquen a las personas que consumen drogas?:

96. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños?:

96.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas las necesidades específicas de las mujeres que se inyectan drogas?:

Prevención del VIH entre profesionales del sexo

97. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los y las profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los y las profesionales del sexo y sus clientes?:

97.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

98. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los y las profesionales del sexo?:

99. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para el año 2022?:

99.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2022?:

99.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes::

99.1.b Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes atendidos por servicios de prevención del VIH::

99.1.b.i Profesionales del sexo:

99.1.b.ii Clientes:

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

100. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones y ofrecer servicios entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?:

100.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

101 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?:

102. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2022?:

102.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2022?:

102.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres::

102.1.b Porcentaje de hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres atendidos por programas de prevención::

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas

103. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora de recibir terapia antirretroviral?:

104. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?:

105. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?:

106. ¿Hay en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos?:

107. ¿Se implementan en su país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia aparte de las terapias de sustitución de opiáceos?:

107.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para::

108. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?:

109. ¿Existen espacios/salas para la inyección segura de drogas?:

	Valor de datos
109.1.a Número de espacios/salas:	
109.1.b Número de personas inscritas para su uso:	

Servicios de prevención del VIH para presos

110. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?:

111. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?:

112. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?:

113. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:

113.a ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos?:

113.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?:

113.c ¿Son gratuitas?:

113.d ¿Son confidenciales?:

113.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?:

113.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible?:

113.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?:

113.h ¿Son accesibles por igual para todos los presos?:

113.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario?:

114. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH?:

115. ¿El tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) está disponible en las prisiones de su país?:

Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH

116. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones de VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?:

116.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

117. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?:

117.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención para chicas adolescentes y mujeres jóvenes y sus parejas masculinas para el año 2022?:

117.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes de 15 a 29 años (especifique el número)::

117.1.b Porcentaje de chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades de alta incidencia alcanzados por servicios de prevención del VIH::

117.1.b.i Mujeres jóvenes (de 15 a 29 años; especifique el porcentaje)::

117.1.b.ii Parejas masculinas (de 20 a 34 años; especifique el porcentaje)::

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional

118. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

119. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

120. ¿Participan* las personas que usan drogas inyectables en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

121. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

122. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias

123. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? (Incluye a todas las personas afectadas por emergencias, incluyendo, sin limitación, personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes.)

123.a Asesoramiento y pruebas sobre el VIH:

123.b Prevención de la transmisión maternoinfantil:

123.c Tratamiento del VIH:

123.d Pruebas de detección y tratamiento para TB:

123.e Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual:

123.f Servicios para grupos de población clave:

123.g Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género*:

123.h Asistencia alimentaria y nutricional:

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

124. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las directrices nacionales de su país?:

124.1.a Si la respuesta es negativa, indíquese el año en que está previsto que se adopten las recomendaciones de PrEP: :

Si la respuesta es "Otro", especifique:

124.1.b Si la respuesta a la pregunta 124 es negativa, indique los motivos aplicables (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

124.2 Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 124 (se han desarrollado directrices sobre la PrEP), especifíquese para qué poblaciones se proporciona PrEP de acuerdo con las directrices (seleccione todas las opciones que correspondan) :

Si la respuesta es "Otro", especifique:

124.3 Si las directrices nacionales de PrEP se han desarrollado, ¿se han actualizado para incluir la opción dePrEP por los eventos* para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?:

124.4 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, ¿quién tiene la autoridad para prescribir PrEP en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

124.5 ¿Están los medicamentos para la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Preservativos

128. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?:

128.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las necesidades de las siguientes poblaciones y programas de preservativos dirigidos a ellas? (seleccione todas las opciones que correspondan):

128.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

129. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?:

129.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?:

129.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año es la estimación de las necesidades del preservativo?:

129.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número estimado de preservativos necesarios?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

130. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por llevar preservativos en su país?:

131. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?:

132. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución de preservativos en lugares públicos?:

Si la respuesta es afirmativa, especifique::

133. ¿Existe una política o directriz para la promoción y distribución de preservativos iniciada por proveedores (por ejemplo, para un proveedor de atención sanitaria que ofrece asesoramiento y suministro de preservativos de manera activa)?

134. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses?

134.a Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional:

134.b Situaciones de desabastecimiento de alcance local:

A.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven

con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Violencia

135. ¿Cuenta su país con algún plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género* y la violencia contra las mujeres con VIH?:

135.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para supervisar y revisar la implementación?:

135.2 Si oui, veuillez identifier le mécanisme national mandaté pour surveiller et évaluer la mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie : (Cochez toutes les réponses pertinentes) :

136. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica*?:

136.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

136.2 Si existe legislación sobre violencia doméstica, es::

136.3 Si la legislación incluye la penalización explícita de la violación conyugal, ¿las leyes se basan en la ausencia de consentimiento, sin requerir pruebas de fuerza física o penetración?:

137. ¿En su país existen leyes consuetudinarias o religiosas junto con legislación escrita a nivel nacional o subnacional?:

137.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿hay excepciones a las leyes consuetudinarias o religiosas que garantizan que, en casos de violencia contra la mujer, haya acceso a sistemas formales de justicia o que las leyes consuetudinarias se deben interpretar en línea con los derechos humanos y las protecciones legales de género?:

138. ¿Las entidades gubernamentales ofrecen compromisos presupuestarios para la implementación de legislación y planes nacionales que traten la violencia contra la mujer a través de lo siguiente?

138.a Asignaciones anuales obligatorias por ley:

138.b Asignaciones sectoriales anuales (p. ej.: salud, educación o justicia):

138.c Asignación de financiación y/o incentivos para organizaciones de mujeres u otras organizaciones no gubernamentales para actividades relevantes:

139. ¿La legislación incluye alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la violencia contra la mujer? (seleccione todas las opciones que correspondan) :

Si la respuesta es "Otro", especifique:

140. ¿Cuenta su país con sanciones penales específicas para la violencia doméstica*?:

140.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido algún procesamiento exitoso al respecto en los dos últimos años?:

140.2 Si la respuesta es negativa, ¿es el hecho de que el acto de violencia haya ocurrido en una situación doméstica la causa de que haya sanciones penales específicas o de que el tribunal considere si se aplican leyes penales generales?:

141. ¿Existen protocolos nacionales para lo siguiente?

141.a Profesionales de la salud que tratan con casos de violencia contra la mujer:

141.b Agentes del orden público que tratan con casos de violencia contra la mujer:

141.c Personal educativo que trata con casos de abuso sexual contra los niños y otras formas de violencia de género contra las niñas en entornos escolares:

142. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan):

143. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer?

143.a Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos:

143.b Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios:

143.c Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto:

143.d Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria:

Estigma y discriminación

144. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad (en especial o como parte de leyes/políticas más amplias para proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u cualquier otra situación?:

145. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los y las profesionales sanitarios para formarles en competencias relativas a derechos humanos, para dar respuesta al estigma y la discriminación, y a la violencia de género?:

146. ¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?:

146.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido cambio en la ley en los dos últimos años? :

Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL.:

Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios

147. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos hormonales o de larga duración?:

147.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a anticonceptivos hormonales o de larga duración sin consentimiento parental?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

148. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH y recibir los resultados?:

148.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

149. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados?:

149.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

150. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH?:

150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a tratamiento para el VIH sin consentimiento parental?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

151. Se requiere consentimiento parental para que los adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a los siguientes servicios:

151.a Terapia de sustitución de opiáceos:

151.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad::

151.b Programas de agujas y jeringas:

151.b.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad::

151.c Naloxona:

151.c.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad::

151.d PrEP:

151.d.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad::

152. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?:

153. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?:

A.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

154. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad*, de acuerdo con estándares internacionales*, en...?:

a) La escuela primaria:

b) La escuela secundaria:

c) La formación para profesores:

155. ¿Los representantes del Ministerio de Educación están incluidos en el mecanismo nacional de coordinación del VIH o equivalente?:

156. ¿Su país ha establecido un objetivo nacional sobre conocimiento integral del VIH entre adolescentes y jóvenes?:

156.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional para supervisar y revisar el progreso hacia el objetivo?:

157. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:

157.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?	Otro, especifique
--	----------	--	-------------------

A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

158. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados*?:

158.1 Si la respuesta es afirmativa::

a) ¿Hacen referencia al VIH?:

b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?:

c) ¿Reconocen a grupos de poblaciones clave (profesionales del sexo, hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?:

c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan):

d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?:

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?:

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?:

g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?:

159. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre Sida o su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social*?:

160. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?:

A.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

161. ¿Existen en su país las siguientes leyes, regulaciones o políticas para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil (CSO) y organizaciones comunitarias (CBO)? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

162. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

163. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?:

164. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH?

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley:

b) Para miembros del sistema judicial:

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios):

d) Para trabajadores sanitarios:

165. El año pasado, el gobierno proporcionó formación a los siguientes grupos sobre derechos humanos y no discriminación en relación con poblaciones clave en al menos el 25 % de las provincias/regiones/distritos (seleccione todas las opciones que correspondan)?

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley:

b) Para miembros del sistema judicial:

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios):

d) Para trabajadores sanitarios:

166. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos?

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley:

b) Para miembros del sistema judicial:

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios):

d) Para trabajadores sanitarios:

167. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de esta formación y/o actividades de capacitación (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Otro (especifique)::

168. ¿Cuenta su país con leyes que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico?:

168.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se aplican protecciones constitucionales o legislativas a cualquiera de los siguientes ámbitos? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Otro (especifique)::

169. ¿Hay mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave), como (entre otros) una institución nacional de derechos humanos, defensor del

pueblo, tribunal o comisión?:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos:

170. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?:

171. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en materia de derechos humanos?

a) Existen instituciones nacionales funcionalmente independientes para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, órganos protectores y defensores del pueblo que tengan entre sus competencias las cuestiones relacionadas con el VIH:

b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de monitorear la aplicación de los tratados y EPU:

172. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

A.10 Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

TB/VIH

173. ¿Se recomiendan las siguientes opciones a las personas que viven con el VIH en las estrategias, políticas, planes o directrices nacionales relacionadas con la TB y/o el VIH?

a) Detección de casos de TB:

b) Tratamiento preventivo de TB:

174. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política The use of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis and screening of active tuberculosis in people living with HIV de la OMS de 2015?:

175. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan)

a. Adultos y adolescentes que viven con el VIH:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

ai. Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

b. Niños que viven con el VIH:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

bi. Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

176. ¿Se requieren las siguientes opciones en las directrices nacionales antes de iniciar el tratamiento preventivo de TB?

a. Prueba cutánea de tuberculosis o prueba de ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA):

b. Rayos X:

177. En el último periodo del que se informa, ¿ha habido situaciones de desabastecimiento de...?

a. Isoniacida:

b. Vitamina B6:

c. Otros medicamentos de recomendación nacional para el tratamiento preventivo de la TB:

ci. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los medicamentos::

178. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?

a. Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por ejemplo: Xpert MTB/RIF):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

b. Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

c. El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

d. Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Cáncer de cuello de útero

179. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en los siguientes?

a. La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables:

b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida:

c. Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH:

Politiques relatives aux co-infections

180. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Infecciones de transmisión sexual (ITS)

181. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones de tratamiento nacionales para infecciones de transmisión sexual (ITS)?:

181.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?:

182. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de ITS?:

183. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos gonocócicos?:

184. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?:

Estrategia

185. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que guíe su respuesta al sida?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

185.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política nacional sobre el sida?:

185.2 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de poblaciones clave o grupos vulnerables? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

185.3 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

185.4 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras e intervenciones de género*, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?:

185.4.a Si la respuesta a 185.4 es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*?:

Las poblaciones migratorias (los migrantes se definen como no ciudadanos que se encuentran en un país diferente a su país de origen en el que se van a quedar más de seis meses)

186. ¿Las leyes/políticas nacionales permiten a los migrantes acceder a servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) bajo las mismas condiciones que a los ciudadanos?

186.a Solicitantes de asilo:

186.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?:

186.b. Migrantes documentados :

186.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?:

186.c Migrantes indocumentados:

186.c.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?:

Monitoreo y evaluación

187. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

187.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años?:

187.2 Si la respuesta a 187 es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género*?:

Sistema de Información sanitaria

188. ¿Cuenta su país con un sistema de información sanitaria en funcionamiento en formato electrónico, en papel o ambos?:

188.1 Si existe un sistema de información sanitaria, ¿están disponibles de manera rutinaria los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de información sanitaria?:

188.2 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito?:

Vigilancia

189. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de población?

	Vigilancia centinela realizada	¿Con qué frecuencia se realiza? (en años)	¿En qué año se realizó la encuesta más reciente?	¿En qué número de centros se realizó la vigilancia?
--	--------------------------------	---	--	---

Si la respuesta es "Otro", especifique:

190. ¿Su país utiliza datos de los asistentes a clínicas prenatales sobre el número de mujeres que obtienen un resultado positivo en una prueba de VIH y el número de mujeres que ya se sabe que son VIH positivas para comprender las tendencias en la prevalencia del VIH?:

Sistemas de seguimiento de pacientes

191. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes usando la guía Consolidated guidelines on personcentered HIV patient monitoring and case surveillance de la OMS 2017?:

¿Qué porcentaje de instalaciones sanitarias cuentan con un sistema electrónico para la recopilación de datos longitudinales a nivel de paciente (por ejemplo: registros médicos electrónicos)?:

Códigos de identificación únicos para pacientes

192. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los siguientes servicios?

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
--	---	---	---

Si la respuesta es "Otra poblacion clave", especifique:

Vigilancia de casos

193. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifiquen por ley?:

194. ¿Cuenta el país con un sistema de vigilancia de casos de VIH*?:

194.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se notifican los siguientes eventos de vigilancia centinela?::

a) Diagnóstico:

b) Resultado del primer recuento de células CD4 en el diagnóstico:

c) Inicio de terapia antirretroviral:

d) Resultados de la primera prueba de carga viral y de las pruebas de carga viral de seguimiento:

e) Muertes:

90-90-90

195. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico que está disponible para el Indicador 1.1 para 2020?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

196. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento antirretroviral para el Indicador 1.2 para 2020?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

197. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional?:

197.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 1.2?:

198. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para el Indicador 1.3 para 2020?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

B.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

1. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?:

Si la respuesta es afirmativa, favor incluir una breve explicación sobre en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y cuáles son los grupos afectados::

2. ¿En qué lugares hay disponibles en su país pruebas de carga viral?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

4. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

¿Tienen acceso los migrantes a los servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención sanitaria)?:

B.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

7. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*?:

8. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?:

8.1 Si la respuesta es afirmativa::

a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?:

b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión nacional?:

c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus comentarios?:

d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?:

e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y difundieron tras esa reunión?:

9. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI?:

10. En el contexto de los programas sobre PTMI en su país, ¿existen informes o documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas", descríbalas::

10.1 Si existen informes sobre alguna de esas situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?:

B.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos)

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Actuaciones de aplicación de la ley

11. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?:

12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido detenidas o procesadas por manifestar su identidad de género?:

13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas en relación con la venta de sexo?:

14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas por actos homosexuales consentidos?:

15. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas por consumir drogas?:

Protecciones legales para grupos de población clave

16. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones constitucionales para incluir la identidad de género?

a. Tribunales:

b. Políticas gubernamentales:

16.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de las personas transgénero en los últimos dos años en cualquier de las siguientes instancias? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

17. ¿Cuenta su país con leyes o políticas de reconocimiento legal de género que permitan el cambio legal de sexo?:

17.1 En caso afirmativo, ¿están reconocidos legalmente otros géneros que no sean el masculino y femenino?:

17.2 En caso de respuesta 17 afirmativa, ¿qué requisitos son necesarios para el cambio de sexo? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

17.3 Si se reconoce legalmente un cambio de un marcador de género, ¿alguno de los obstáculos siguientes limita su aplicación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

18. ¿Es posible legalmente cambiarse el nombre en algunos de los documentos siguientes? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

18.1 En caso afirmativo en algunos de los casos anteriores, ¿se necesita algún certificado de reconocimiento de género u otro certificado estatal para estos cambios?:

19. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones constitucionales para incluir el trabajo sexual?

a. Tribunales:

b. Políticas gubernamentales:

c. ¿Existen otras disposiciones legales contra la discriminación que hagan referencia al trabajo sexual?:

19.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de los profesionales del sexo en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

20. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones constitucionales de discriminación para incluir la orientación sexual?

a. Tribunales:

b. Políticas gubernamentales:

20. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccione todas las opciones que correspondan):

20.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de las personas según su orientación sexual en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

21. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que se apliquen a las personas que consumen drogas?:

21.1 En caso afirmativo, ¿se han usado correctamente estas disposiciones que establecen protecciones para proteger o defender los derechos de las personas que consumen drogas en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

22. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes en su país para hacer uso de las protecciones constitucionales o legislativas?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Servicios de prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas

23. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas?:

24. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?:

25. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos?:

Servicios de prevención del VIH en las prisiones

26. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?:

27. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones?:

28. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?:

29. ¿Hay disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con el VIH?:

30. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:

a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos?:

b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?:

c) ¿Son gratuitas?:

d) ¿Son confidenciales?:

e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?:

f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible?:

g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?:

h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos?:

30.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutaban de ese acceso igualitario? (especifique)::

31. ¿Está disponible el tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) en las prisiones de su país?:

Participación

32. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

33. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

34. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

35. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

36. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

37. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

38. ¿Alguna de las siguientes barreras limita el acceso a la profilaxis previa a la exposición en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

B.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

39. ¿Incluye la legislación de su país alguna de las siguientes disposiciones en relación con la violencia contra las mujeres? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

40. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan):

41. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer?

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos:

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios:

c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto:

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria:

42. ¿Cuenta su país con los siguientes servicios para las mujeres que han sufrido violencia? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

43. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad (en especial o como parte de leyes/políticas más amplias para proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u cualquier otra situación?:

B.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

44. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:

44.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?
--	----------	--

Si la respuesta es "Otro", especifique:

B.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

45. ¿Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social* en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

B.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

46. ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

47. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios", descríbalos::

Si la respuesta es "Otros", descríbalos:

48. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", descríbalas:

B.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

NOTA: Los datos solamente serán cargados para preguntas que han sido incluidas en el cuestionario anterior del ICPN. Les alentamos a verificar que las respuestas aún sean válidas y que se hayan incluido respuestas también a cualquier nueva pregunta.

Conocimiento de los derechos

49. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?:

50. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes para ofrecer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otros", descríbalos:

Mecanismos de rendición de cuentas

51. ¿Hay mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave), como (entre otros) una institución nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión?:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos::

52. ¿Existen mecanismos establecidos por la comunidad y/u organizaciones no gubernamentales para registrar y dar respuesta a denuncias individuales de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)? Ejemplos de esos mecanismos son estructuras culturales tradicionales u organizaciones no gubernamentales con formación en mediación para dar respuesta a esas denuncias.:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos::

53. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?:

Si la respuesta es "Otros", descríbalos:

54. ¿Presenta su país alguno de los siguientes obstáculos para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

55. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

56. ¿Monitorea su país el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH?:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos::

57. ¿Existen en su país obstáculos particulares para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos y ofrezca detalles sobre su alcance (es decir, a nivel nacional)::

IV Encuesta del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del Sida (AMDS) sobre el uso de antirretrovirales (ARV) y de laboratorios, y aplicación de las guías de la OMS pertinentes

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario:

Cargo:

Institución:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono:

1A Visión general del tratamiento antirretroviral (extraída de GAM 1.2, no es necesario rellenarla)

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2020

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2021
Primera línea	
Segunda línea	
Tercera línea/rescate	
TOTAL	

Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2020.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2020
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020.

Lista de esquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2020
---	--

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2020

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea/rescate administrados adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2020	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2020
--	--

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2020

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2021
Primera línea	
Segunda línea	
Tercera línea/rescate	
TOTAL	

Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2020.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2020.

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2020	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
--	--	---	--

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL			

Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2020.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2020.

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2020.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2020
--	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2020.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2020.

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2020
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2020 {GAM 2.3}

Pregunta 10. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la de PTMI en el 2020.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de embarazadas personas a fines del 2020.

Esquemas de PTMI utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2020	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2020
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 11. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2020.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2020	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2020
--	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

4 Servicios de laboratorio

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 12. Número total de pruebas rápidas de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2020:	
Pregunta 13. Número total de pruebas ELISA de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2020: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	

PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 14. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2020:	
Pregunta 15. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2020:	
Pregunta 16. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2020:	

CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 17. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2020:	
Pregunta 18. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2020:	
Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2020:	

DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

Pregunta 20. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2020:: [' ']

Pregunta 21. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2020:: [' ']

Pregunta 22: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas:

Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida					
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)					
CD4					
Carga viral					
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH					
GeneXpert (prueba de tuberculosis)					

Pregunta 23: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2020. Elimine aquellas que su país no posea.

Tecnologías para pruebas de CD4

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2020
Alere Pima Analyzer											
Apogee Auto40 Flow Cytometer											
BD FACSCalibur											
BD FACSCount											
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter											
Coulter Epics											
Millipore-Guava											
Partec CyFlow											
Partec miniPOC											
PointCare NOW											

Otras tecnologías para pruebas de CD4

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2020
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Tecnologías para pruebas de carga viral

	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2020
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplikor (Roche)											
Roche Amplikor HIV-1 DNA test (B) / Amplikor											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											

GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NucliSENSEasyQ® HIV-1 (A) / NucliSens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											

(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)

(B) - Ensayos utilizados para la detección cualitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).

Por favor enumere más abajo otras tecnologías virológicas que se utilicen en su país pero no enumeradas en la tabla (especifique.)

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2020
-----------------	----------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

5 Metas del país con fines de proyección

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En el País no se realizan este tipo de encuestas

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 24. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.

Meta del país

	A fines del 2021	A fines del 2022	A fines del 2023	A fines del 2024	A fines del 2025	A fines del 2026
1. Número de adultos y niños que reciben TAR						
1.1 : Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años que reciben TAR						
1.2 : Número de niños < 10 años que reciben TAR						
1.2.1 : Número de niños < 5 años que reciben TAR						
1.2.2 : Número de niños de 5 a < 10 años que reciben TAR						
2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH						
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4						
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral						
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano						
7. Número total de pruebas serológicas del HIV						
8. Número de pruebas de CD4						
9. Número de pruebas de carga viral						
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses						

Pregunta 25: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.

Adultos

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Pregunta 26: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2021-2023.

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH			

Pregunta 27. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.

Tratamiento antirretroviral en niños

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2021	Número de personas con esquema antirretroviral - 2022	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Question 28. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.

Número de pruebas realizadas en el 2020 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas previstas para 2020	Pruebas previstas para 2021	Pruebas previstas para 2022	Pruebas previstas para 2023
Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)				
CD4 test				
Carga viral				
Diagnóstico temprano infantil de VIH				