

# GAM Online Reporting Tool

---

**Ecuador - 2022**

## **I Portada**

**1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?**

**a) Comité Nacional de Sida o equivalente:** No

**b) Programa Nacional de Sida:** Sí

**c) Otros:** No

**Si son otros, especifique:**

**2) Con la colaboración de**

**Ministerio de Educación:** No

**Ministerio de Salud:** Sí

**Ministerio de Trabajo:** No

**Ministerio de Asuntos Exteriores:** No

**Otro Ministerio:** No

**Si es otro Ministerio, especifique:**

**Organizaciones de la sociedad civil:** No

**Personas que viven con el VIH:** No

**Sector privado:** No

**Organizaciones de Naciones Unidas:** Sí

**Organizaciones bilaterales:** No

**ONG internacionales:** No

**Otros:** No

**Si son otros, especifique:**

**3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?:** No

**4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?:** No

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

## 6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

**Nombre(s) / puesto(s)::** Rodrigo Tobar

**Dirección(es)::** MSP- Responsable de la Estrategia Nacional de VIH/sida

**Correo(s) electrónico(s)::** rodrigo.tobar@msp.gob.ec

**Teléfono(s)::** +593993980027

## II Reporte narrativo

**Visión general:** La epidemia de VIH en el Ecuador es de tipo concentrada en grupos de población clave, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Cuenca, “Prevalencia de VIH e ITS en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas transfemeninas (PTF) y trabajadoras/es sexuales (TS), en seis provincias del Ecuador: Pichincha, Guayas, Azuay, Esmeraldas, El Oro y Manabí - 2021”, se determina que la prevalencia de VIH en grupos de población clave es la siguiente: 18,17 % personas transfemeninas. 10,19 % hombres que tienen sexo con hombres. 1,04 % trabajadoras/es sexuales. En el año 2022 se notificaron 5.142 casos de VIH/sida, desde el punto de vista geográfico la provincia del Guayas representa la mayor cantidad de casos nuevos con el 32,5 %, seguido por Pichincha 22,1%, Manabí 8.3%, Esmeraldas 4,8%, Los Ríos 4.2, Santo Domingo de los Tsáchilas 4.1% La prevalencia de VIH en embarazadas en el Ecuador es del 0,21 % [Tasa de transmisión materno infantil del 1,65%].

**Declaración política y marco de monitoreo 1. Prevención combinada del VIH para todos:** Profilaxis pre - Exposición En el año 2022, el País arranco con la realización de la normativa y estimaciones de la población elegible para la implementación de PrEP en los servicios de atención de establecimientos de salud del MSP, dirigido a personas de grupos de población clave y parejas serodiscordantes, priorizando la estrategia en las provincias de mayor carga de la enfermedad como son: Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí, Azuay y Esmeraldas. En el marco normativo para la implementación de la PrEP en Ecuador, el mismo podrá ser aplicado en la Red Pública Integral de Salud, previa capacitación de los profesionales de salud. Profilaxis post- Exposición La Profilaxis post Exposición (PEP), es un conjunto de acciones aplicadas después de una posible exposición al VIH para prevenir adquirirlo, la administración del medicamento profiláctico post exposición para VIH debe ser administrado dentro de las 72 horas de una posible exposición. Además de la entrega de medicamento profiláctico para VIH, en la PEP se debe aplicar varias acciones: aplicación de exámenes, atención y seguimiento en las 51 UAI de VIH con las que cuentan el MSP. La PEP es de aplicación obligatoria en establecimientos de salud de la RPIS, conforme a la indicado en la Guía de Práctica Clínica “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños adolescentes y adultos” - 2019 y de la Norma Técnica de Atención integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos - 2019. La PEP se encuentra disponible en los establecimientos de salud que brindan atención las 24 horas, disponible para casos de exposición laboral y no laboral (casos de violencia sexual y prácticas sin protección); en exposición no laboral se aplica tanto para adultos y niños, a través de la activación del kit púrpura.

**Declaración política y marco de monitoreo 2. Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH:** En el marco de la promoción y prevención el País realizó actividades dirigidas a toda la población con énfasis a mujeres en estado de gestación, personas privadas de la libertad y personas con diagnóstico de ITS y Tuberculosis; aplicando el algoritmo diagnóstico con oferta y realización de las pruebas rápidas para detección de VIH. En este contexto se contemplaron actividades comunitarias orientadas a la población hombres que tienen sexo con hombres, personas transgéneros, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH; mediante estas actividades se realizó la oferta y aplicación de la pruebas rápida de VIH (tamizaje), entrega de preservativos, lubricantes y material educativo y promocional, así como la vinculación a los servicios de atención integral, además de la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, COVID-19 y monkey pox; esto fue posible con la contratación de promotores pares a través de los subreceptores del proyecto Fondo Mundial y la contratación de personal técnico de la Estrategia Nacional de VIH del MSP, que coordinó, capacitó y monitoreó cada una de las actividades

**Declaración política y marco de monitoreo 3. Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical:** Declaración política y marco de monitoreo 3. Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical Contenido orientativo para esta sección: ¿Se proporciona tratamiento a todos los niños diagnosticados con VIH (el objetivo es que el 75% de todos los niños que viven con VIH tengan cargas virales suprimidas para 2023)? Sí, en cuanto el tamizaje del neonato es reactivo inmediatamente se inicia tratamiento, Describir la situación de la transmisión vertical de las infecciones por el VIH y el sida

pediátrico. En Ecuador al terminar el año 2022 se reportan 11 casos de transmisión materno-infantil, las principales causas de la transmisión materno-infantil es por lactancia materna, ya que la madre se contagia durante el puerperio, o meses luego del parto. ¿Cuáles son las principales deficiencias en la continuidad de los servicios de prevención de la infección por el VIH entre las mujeres en edad reproductiva, especialmente las mujeres embarazadas y lactantes? Las deficiencias observadas en la estrategia para eliminación de VIH, la asesoría en mujeres en edad fértil, sean o no portadoras del virus, al momento de ofertar opciones reproductivas en parejas con VIH, se identificó en ciertas unidades de salud que la alta demanda de pacientes, no permite un agendamiento oportuno, lo que provoca que la paciente no acuda a sus controles periódico o cambie de institución de salud, sistema de información deficiente que no permite saber datos de la paciente para la vigilancia respectiva de igual manera en ciertas casa de salud sobre todo en zonas rurales.

**Declaración política y marco de monitoreo 4. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas:**

El Ministerio de Salud a través de la Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS articula acciones con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, promoviendo la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como los derechos de estas personas víctimas de violencia sexual y psicológica, en el marco de la prevención y atención a personas que viven con VIH.

**Declaración política y marco de monitoreo 5. Liderazgo comunitario:** A partir del mes de febrero 2022, se inició la implementación de vigilancia epidemiológica con enfoque comunitario de los eventos VIH / COVID-19, consistente fundamentalmente en la capacitación a promotores comunitarios en el ámbito técnico - científico de estos eventos, y su aplicación en el trabajo de campo, para de esta manera contribuir a la captación e identificación oportuna de casos y su vinculación inmediata al sistema nacional de salud.

**Declaración política y marco de monitoreo 6. Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación:**

En el Marco de los Derechos Humanos y la Eliminación del estigma y discriminación el Ecuador, tiene las siguientes acciones: - Miembros de la Alianza Mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación - Fortalecimiento de la Escuela de Defensores Comunitarios en Derechos - Diseño de ruta crítica de participación ciudadana de las poblaciones claves (contrato social). - Diagnóstico situacional de la garantía de los derechos humanos - Atención en personas víctimas de violencia sexual, en 203 establecimientos de salud - Asesoría a través de la línea 171 opción 2 y líneas alternas, sobre temas de VIH/sida-ITS (atención, vinculación tratamiento)

**Declaración política y marco de monitoreo 7. Cobertura sanitaria universal e integración:**

En el Ecuador, como parte del manejo y monitoreo terapéutico de las personas que viven con VIH, la normativa nacional como internacional indica, que es altamente recomendable que cada paciente se realice por lo menos semestralmente la prueba para cuantificar la carga viral. La desconcentración del laboratorio clínico de Carga Viral de VIH a nivel nacional empezó con la implementación desde año 2021, con el apoyo y financiamiento de la subvención ECU-H-MOH-1850; para el año 2022, el MSP contabilizó un total de 44 equipos GenExpert, distribuidos en Unidades de Atención Integral; esta estrategia de desconcentración tiene como objetivo disminuir las pérdidas de muestras serológicas, disminuir las distancias y los tiempos, para lograr que el seguimiento y monitoreo sea más efectivo e inmediato. El tratamiento antirretroviral en el país, es gratuito por mandato constitucional y tiene una cobertura universal, incluyendo a personas en situación de movilidad humana o personas extranjeras residentes en el País, así como el respaldo del abastecimiento del TARV en los PVV que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud (RPIS); La Estrategia Nacional de VIH (ENVIH) realiza cada año estimaciones, lo cual ha fortalecido la planificación para el abastecimiento de antirretrovirales para las PVV, con la finalidad de garantizar el stock de antirretrovirales. Desde el año 2019, el País viene realizando la transición de esquemas de medicamentos antirretrovirales, esta transición para el cierre del 2022 se ubicó al 100% en unidades de atención del MSP; esta estrategia ha sido de gran aceptación que buscar mejorar la adherencia a medicamentos antirretrovirales de las personas que viven con VIH; así mismo el MSP ha iniciado el plan de desconcentración de los servicios de atención integral, desde el 3er y 2do nivel de atención que están con una alta carga de PVV hacia el primer nivel de atención, programando en un inicio que solo pacientes adherentes y estables se desconcentre si así es su voluntad.

**Declaración política y marco de monitoreo 8. Inversiones y recursos:**

En el Ecuador la mayor parte del presupuesto para VIH proviene de recursos fiscales, para el año 2022 el MSP invirtió en VIH alrededor de \$9'004.724,76 dólares, de los cuales \$4'292.275,49 correspondieron a tratamiento antirretroviral y \$4'712.449,27 en pruebas rápidas para determinación de VIH, dispositivos médicos e insumos, sin embargo el costo que año se destina para VIH en el Ecuador provienen de otras instituciones del Estado como IESS, ISSFA e ISSPOL, así como organismos internacionales sin fines de lucro que contribuyen en la respuesta nacional de frente al VIH. En cuanto al financiamiento externo, el País se benefició de \$2'892.142,20, a través del Fondo Mundial, en el marco de la ejecución de la Subvención ECU-H-MOH-1850, mismo que pretende alcanzar los objetivos nacionales hacia la eliminación del VIH como un problema de salud pública al descentralizar los servicios de pruebas a nivel de atención primaria de salud y mejorar los sistemas de recolección de datos, con un enfoque comunitario en población clave a través del trabajo de pares. Las compras de medicamentos antirretrovirales, dispositivos médicos e insumos, el MSP en el año 2022 las realizó a través de convenios internacionales con OPS (Fondo Estratégico) y Fondo Mundial (Wambo), mismos que permitieron optimizar recursos económicos, obteniendo mayor cantidad a menor costo; así mismo permitir al Estado un ahorro significativo para el diagnóstico y tratamiento para VIH

## 1.1 Incidencia del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

### por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

### por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
<b>Incidencia</b> : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
<b>Numerador</b> : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
<b>Denominador</b> : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
---------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)
Quito										

## 1.2A Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato actualizado, el último estudio de talla de población clave, en grupos de población, fue en el año 2015

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

### Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

## 1.2B Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato actualizado, el último estudio de talla de población clave, en grupos de población, fue en el año 2021.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Año de la última estimación:**

**Estimación del tamaño:**

**Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):**

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:**

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:**

**Comentarios y información adicional:**

### **Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

### **1.2C Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** País no cuenta con esta información

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Año de la última estimación:**

**Estimación del tamaño:**

**Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):**

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:**

**Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:**

**Comentarios y información adicional:**

## Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

### 1.2D Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato actualizado, el último estudio de talla de población clave, en grupos de población, fue en el año 2021.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

### Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito			

### 1.2E Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El País no cuenta con un estudio de prevalencia de VIH actualizado para este grupo de población, el último dato fue del año 2008, sin embargo, se están realizando esfuerzos para la realización de un nuevo estudio con la cooperación técnica de la academia.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Año de la última estimación:**

**Estimación del tamaño:**

**Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):**

**Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:**

**Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):**

### **Datos sub-nacionales - Presos**

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Quito		

### **1.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El último estudio de Prevalencia de VIH en grupos de población clave fue en el año 2021, para el año 2025 el País espera tener un estudio actualizado.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven del VIH						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se someten a pruebas sobre el VIH						

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El último estudio de Prevalencia de VIH en grupos de población clave fue en el año 2021, para el año 2025 el País espera tener un estudio actualizado.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven del VIH			
<b>Numerador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH			
<b>Denominador :</b> Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se someten a pruebas sobre el VIH			

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

## 1.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El País no cuenta con un estudio de prevalencia para este grupo de población  
**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven del VIH						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que se someten a pruebas sobre el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El último estudio de Prevalencia de VIH en grupos de población clave fue en el año 2021, para el año 2025 el País espera tener un estudio actualizado.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:** No

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven del VIH						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que se someten a pruebas sobre el VIH						

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

## 1.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El País no cuenta con un estudio de prevalencia de VIH actualizado para este grupo de población, el último dato fue del año 2008, sin embargo, se están realizando esfuerzos para la realización de un nuevo estudio con la cooperación técnica de la academia.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de presos/reclusos/detenidos que viven con el VIH						
<b>Numerador :</b> Número de presos/reclusos/detenidos que dan positivo en la prueba del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de presos/reclusos/detenidos que se someten a la prueba del VIH						

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito							

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.4A Pruebas de VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses, o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### **Datos sub-nacionales**

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### **1.4B Pruebas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH			
<b>A</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
<b>B</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
<b>Numerador (A + B)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

### **Datos sub-nacionales**

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### **1.4C Pruebas de VIH entre personas que usan drogas inyectables**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### 1.4D Pruebas de VIH entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
<b>A :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
<b>B :</b> Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
<b>Numerador (A + B) :</b> Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Quito									

### 1.5A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.5B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### 1.5C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.5D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que notificaron haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero encuestadas que notificaron haber tenido relaciones sexuales o haber practicado el sexo anal en los últimos seis meses						

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

## 1.6A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
<b>Numerador :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo.					
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.6B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

**Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

### Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

## 1.6C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables con los que se contacta con intervenciones de prevención diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
Número de agujas y jeringas distribuidas (datos del indicador 3.9)					
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.6D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

#### I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

**Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

## II. Datos de programas

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

**Desglose por tipo de proveedor**

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero.					
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero					

### 1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
<b>Número total de centros de prestación de servicios</b>	
<b>1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)</b>	
<b>2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental</b>	
<b>Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.</b>	
<b>Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios</b>	
<b>Número total de áreas administrativas en el país</b>	

### 1.7 Programas de prevención del VIH en prisiones

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

	Valor de datos
<b>Número de agujas limpias distribuidas entre presos</b>	
<b>Número de presos que reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos</b>	
<b>Número de preservativos distribuidos entre presos</b>	
<b>Número de presos que reciben terapias antirretrovirales</b>	
<b>Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH</b>	

### Personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	
<b>Numerador</b> : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	

### Presos con hepatitis C solamente

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que presentan infección por la hepatitis C	
<b>Numerador</b> : Número de presos que presentan infección por la hepatitis C	

### Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
<b>Numerador</b> : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

### Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
<b>Numerador</b> : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

## 1.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 1.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

¿Los datos están ponderados?:

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Índice</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas (redondeado a un número entero)					
<b>Numerador</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los programas de agujas y jeringas					
<b>Denominador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables en el país					

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

### Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Número de agujas distribuidas por persona y año	Numerador	Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito				

## 1.10 Coverage of opioid agonist maintenance therapy

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

### Total y desglose por género y edad

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b>						
<b>Numerador</b>						
<b>Denominador</b>						

### Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
<b>Porcentaje (%)</b>					
<b>Numerador</b>					
<b>Denominador</b>					

**Nombre de las organizaciones:**

**Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):**

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

### 1.11 Personas que recibieron PrEP

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Información de Kimirina, capítulo atención de Telemedicina, año 2022

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: En el año 2019, el MSP a través de un convenio interinstitucional con Corporación Kimirina, trabaja en acciones de prevención, dirigidos a grupos de población clave (HSH y MTF con alto riesgo de contraer VIH), las actividades comunitarias se realizan a través de promotores pares, lo cual contempla la entrega medicamento antirretroviral (profilaxis pre exposición), estas actividades son ejecutadas en el marco del convenio, en dos ciudades principales del País: Quito y Guayaquil.

### Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP al menos una vez durante el periodo que se reporta

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el periodo que abarca el informe
<b>Todo</b>	200	194	6	0	0	200
<b>&lt;15</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15-19</b>	4	4	0	0	0	4
<b>20-24</b>	32	29	3	0	0	32
<b>25-49</b>	156	156	0	0	0	156
<b>50</b>	8	5	3	0	0	8
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
<b>Edad desconocida</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP por primera vez en su vida durante el periodo que se reporta</b>	200	194	6	0	0	0

### Desglose por producto de la PrEP

	<b>Total</b>
Anillo vaginal de dapivirina	0
Long-acting injectable cabotegravir	0

### Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Presos
<b>Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe</b>	191	6	3	0	0

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
---------------------	------	---------	---------	-------------	------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

### Datos específicos de ciudades

Ciudad	Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP al menos una vez durante el período que se reporta
Quito	136
Guayaquil	7
Otras	57

## 1.14 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
<b>Numerador :</b> El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

## 1.15 Número de preservativos distribuidos anualmente

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros

**Otra herramienta/fuente de medición::** Registros administrados, distribución de dispositivos e insumos médicos - ENVIH

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** La información corresponde a la adquisición y distribución realizada por el componente de dispositivos e insumos médicos de la Estrategia Nacional de VIH del MSP

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Público	Privado	Organizaciones no gubernamentales
<b>Preservativos masculinos :</b> Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	4797737	4797737	0	0
<b>Preservativos femeninos :</b> Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses	0	0	0	0

## 1.16 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

### Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)**

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

**95-95-95 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 2.1,2.2 y 2.3)**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Instrucciones: Se alienta a todos los países con poblaciones >250 000 a utilizar los datos de sus archivos finales de Spectrum para la Parte 2. Para países utilizando sus archivos finales de Spectrum, la Parte 1 no necesita ser completada. Si datos desglosados de forma detallada por edad/sexo o por area subnacional/ciudad están disponibles, favor completar las Partes 3 y 4.**

**Favor ver las directrices de GAM y documentos de preguntas frecuentes para más detalles.**

Utilizar datos del archivo final de Spectrum: Sí

**Parte 1. Metadatos de indicadores (favor completar solamente en caso de no estar utilizando los datos del archivo de Spectrum final).**

**2.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**2.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**2.3 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

**2.1,2.2 y 2.3 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)**

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

**Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo**

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Denominador :</b> Estimación de las personas que viven con el VIH				
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
<b>Indicador 2.1</b> <b>Numerador :</b> Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH						
<b>Indicador 2.2</b> <b>Numerador :</b> Personas en tratamiento antirretroviral						
<b>Personas que inician tratamiento antirretroviral</b>						
<b>Personas que reinician el TAR (entre los que iniciaron el TAR)</b>						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Numerador :</b> Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Subnumerador :</b> Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral						
<b>Indicador 2.3</b> <b>Subdenominador :</b> Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral						

### **Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 95-95-95**

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 95 años)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 90%)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 86%)*.				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 95)				
<b>Porcentaje (%)</b> : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 95)*.				
<b>Cobertura de carga viral (%)</b> : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral				

### Parte 3. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

**Nota:** Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	< 1	1-4	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
<b>Denominador</b> : Estimación de las personas que viven con el VIH												
<b>Indicador 2.2 Numerador</b> : Personas en tratamiento antirretroviral												
<b>Indicador 2.3 Numerador</b> : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral												
<b>Indicador 2.3 Subnumerador</b> : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral												
<b>Indicador 2.3 Subdenominador</b> : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral												

**Parte 4. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]**

Ciudad	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 2.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 2.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 2.3 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 2.3 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 2.3 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
Quito						

**2.4 Diagnóstico tardío del VIH**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema informático PRAS - Formulario de reporte de casos de VIH 002-003, año 2022

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** La información fue registrada al sistema PRAS por el laboratorio de referencia INSPI

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

### Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3

	Todos	Niños (12-35 m): 750 células/mm3 o CD4<20%	Niños (36-59 m): 350 células/mm3 o CD4<15%	Niños (5-14): 200 células/mm3 o CD4<15%	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa	24	35.7	0	20	24.7	22
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 en el momento del diagnóstico	967	5	0	3	732	227
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 at the time of diagnosis	4032	14	5	15	2967	1031

### Adultos que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3

	Todos	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa	48	49.6	43.2
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 en el momento del diagnóstico	1918	1473	445
<b>Denominador :</b> Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	3998	2967	1031

## 2.5 Volumen y positividad de la prueba del VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Otros (especificar)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Formulario 004- Registro de tamizajes de VIH / Matriz de seguimiento y monitorio de pruebas de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Para el numerador se ha tomado el dato según pruebas aplicadas bajo la normativa legal vigente en el País, misma que se basa en el algoritmo diagnóstico de VIH, según Guía de Práctica Clínica del año 2019 \* el algoritmo diagnóstico se basa en: 2 pruebas rápidas de VIH con resultado REACTIVO PARA VIH 1era prueba de 4ta generación (reactivo) 2da. prueba de 3era generación (reactivo)

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** No se dispone de datos certeros para el reporte del indicador por grupo de edad, sexo y servicio

**Proporcione cualquier información sobre campañas de pruebas nacionales o cambios en las estrategias de pruebas que puedan explicar cualquier cambio en el volumen de prueba en comparación con años anteriores.:**

**Datos de las tasas de repetición de pruebas en personas VIH-negativas y VIH-positivas:**

### Total y desglose por edad

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.5	0	0	0
<b>Numerador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	5046	0	0	0
<b>Denominador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	938531	0	0	0

### Por modalidad de prueba: Pruebas a nivel de instalaciones

	Todas las pruebas a nivel de instalaciones	Prueba iniciada por el proveedor en clínicas o instalaciones de emergencia	Clínicas de atención prenatal (incluyendo el embarazo y el parto)	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (incluyen las instalaciones sanitarias)	Clínicas de TB	Clínica de planificación familiar	Otras pruebas a nivel de instalaciones
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.5	0	0	0	0	0	0.5
<b>Numerador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	4291	0	0	0	0	0	4291
<b>Denominador :</b> Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	907500	0	0	0	0	0	907500

### Por modalidad de prueba: Reporte de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad

	Todos los reportes de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad	Pruebas móviles	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (no incluyen las instalaciones sanitarias)	Otras pruebas basadas en la comunidad
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	2.4	0	2.4	0
<b>Numerador</b> : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	755	0	755	0
<b>Denominador</b> : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	31031	0	31031	0

## Autodiagnóstico

	Valor de datos
<b>Cantidad suministrados</b> : Cantidad de equipos de autodiagnóstico adquiridos (no distribuidos o utilizados) por el gobierno en un año, incluyendo (entre otros) los donados	0
<b>Cantidad distribuidos</b> : Número total de equipos individuales de autodiagnóstico distribuidos en un año	0

## 2.6A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Numerador</b> : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
<b>Denominador</b> : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH			

### **Datos sub-nacionales**

#### **Total y desglose por edad**

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

## **2.6C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de las personas transgénero que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de las personas transgénero que viven con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Quito												

## 2.6E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de los presos que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
<b>Denominador :</b> Número de los presos que viven con el VIH						

## Datos sub-nacionales

### Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Quito												

## 2.7 Mortalidad relacionada con el Sida

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** Modelización matemática (por ejemplo, Spectrum)

**Otra herramienta/fuente de medición::** Spectrum

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tomar los datos del archivo final de Spectrum:** Sí

**Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::**

**Especifique::**

**Todas las edades**

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Tasa</b> : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### < 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

### 15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Indice</b> : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
<b>Numerador</b> : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
<b>Denominador</b> : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

## 3.1 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Matriz de seguimiento COHORTE 2022 Dirección Nacional de Estrategias Prevención y Control para Enfermedades Transmisibles / ENVIH - Componente ETMI-Plus

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Egresos Hospitalarios MSP y Base Gineco Obstetrica / Denominador corresponde a los nacidos vivos de la base Gineco Obstetrica Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH	90.6	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro sanitario que se habían hecho pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran VIH-positivas en la primera visita de asistencia prenatal.	306488	
1. Infección por el VIH conocida (positiva) al registrarse en la clínica prenatal	298	
2. Con resultado positivo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo o el parto. <b>Esto excluye a las mujeres que ya conocían su estado positivo de VIH antes del embarazo actual.</b>	53	
3. Con resultado negativo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual o el parto. <b>Esto debe basarse en los últimos resultados de pruebas en caso de repetición de la prueba.</b>	306137	
<b>Subtotal</b> : Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)	351	
<b>Denominador basado en la población</b> : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	338137	
<b>Denominador basado en el programa</b> : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro sanitario en los últimos 12 meses		

### 3.2 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Herramienta/fuente de medición:**

**Si la respuesta es «Otras», especifique:**

**Tomar el denominador del archivo final de Spectrum:**

**Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente:**

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	
<b>Numerador</b> : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los lactantes examinados solo deben contarse una vez. El numerador no debe incluir lactantes estudiados después de dos meses.	
<b>Resultado de la prueba - Positivo</b>	
<b>Resultado de la prueba - Negativo</b>	
<b>Resultado de la prueba - Indeterminado</b>	
<b>Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio</b>	
<b>Resultado de la prueba - Otro</b>	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	

### 3.3 Transmisión vertical del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje estimado de niños recién infectados por el VIH por transmisión vertical entre las mujeres que viven con el VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	
<b>Numerador</b> : Número estimado de niños recién infectados por el VIH en los últimos 12 meses por transmisión vertical	
<b>Denominador</b> : Número estimado de partos en mujeres con el VIH en los últimos 12 meses	

### 3.4 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Si la respuesta es «Otras», especifique: spectrum

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente:

Si la respuesta es «Otras», especifique:

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que viven con el VIH que dieron a luz durante los últimos 12 meses y recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH <b>Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil excluirán a las mujeres que hayan recibido nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única. Este recuento debe incluir a todas las mujeres que hayan dado a luz en los últimos 12 meses, independientemente del año en que comenzaron con medicamentos antirretrovirales.</b>	
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Otras <b>En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.</b>	
<b>Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida</b>	
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

### Datos sub-nacionales

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador

### 3.5 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS). 2022 (p\*) Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos: Notas: 1: La información 2022, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2022 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una

consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A50-A53, O981]. 6: Grupo prioritario "Embarazadas" 7: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 8: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención primera o subsecuente según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z34-Z35]. 9: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Obstetriz, Ostetriz rural. 10: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades Medicina General Integral, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Rural, Ginecología y Obstetricia, Atención Primaria en Salud, medicina general, obstetricia y obstetricia rural. 11: La información corresponde a mujeres (\*) Información 2022 sujeto a variación

:

**¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí**

**En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:**

**Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:**  
No treponémica (RPR, VDRL), Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)

### **A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas**

#### **En cualquier consulta de atención prenatal**

	<b>Todos</b>	<b>15-24</b>	<b>25+</b>
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	0.1	0.1	0.1
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a pruebas de sífilis	1216	671	545
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	1194982	581004	613978

#### **En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)**

	<b>Total</b>
<b>Porcentaje (%)</b> : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

### **B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva			
<b>Numerador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis			
<b>Denominador</b> : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis			

### C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva que recibieron un tratamiento adecuado	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva y que recibieron al menos una dosis de penicilina benzatina 2,4 mU por vía intramuscular	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología positiva para la sífilis	

### 3.6 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Egresos Hospitalarios MSP y Base Gineco Obstétrica Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Notas: \*Información provisional sujeto a variación 1) Numerador corresponde a los CIE 10 [A500-A509] 2) Denominador corresponde a los nacidos vivos de la base Gineco Obstétrica 3)Corresponde a establecimietnros de salud del MSP

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos: MSP

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: No

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 13 de:

<https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emtct-hiv-syphilis/en>:

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	0.1
<b>Numerador</b> : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	188
<b>Denominador</b> : Número de nacimientos	155592

### 3.7 Casos de hepatitis B entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** No se cuenta con información desagregada para el reporte de este indicador. En el año 2022 se notificaron al sistema de vigilancia (VIEPI) 64 casos de hepatitis B en gestantes

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

¿Son los datos representativos de todo el país?:

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:

### A. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y se sometieron a la prueba del HBsAg			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal			

### B. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que se someten a la prueba del HBsAg y tienen un resultado positivo

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal que se someten a la prueba del HBsAg y que dan un resultado positivo			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y dieron positivo en la prueba del HBsAg			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del HBsAg			

### C. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben pruebas adicionales de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ellas, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben una prueba adicional de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ella, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal con un HBsAg positivo y que luego reciben pruebas de ADN del VHB y/o HBeAg			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que dan positivo al HBsAg			

**D. Porcentaje de mujeres elegibles que acuden a los servicios de atención prenatal y que fueron tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)**

	Todos	15-24	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que son tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)			
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal que cumplen los criterios de elegibilidad y reciben tratamiento antivírico			
<b>Denominador</b> : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que cumplen los requisitos para recibir tratamiento antivírico			

**4.1A Experiencia de violencia sexual y/o física entre los trabajadores del sexo**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Trabajadores del sexo que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de trabajadores del sexo encuestados						

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender - Numerator	Transgender - Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25) - Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25) - Denominator	Transgender (<25) - Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 4.1B Experiencia de violencia sexual y/o física entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que alguno de los incidentes les había ocurrido en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondieron			

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

## 4.1C Experiencia de violencia sexual y/o física entre las personas que se inyectan drogas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Personas que se inyectan drogas que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que se inyectan drogas encuestadas						

### Datos sub-nacionales

#### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender - Numerator	Transgender - Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25) - Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25) - Denominator	Transgender (<25) - Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 4.1D Experiencia de violencia sexual y/o física entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Personas transgénero que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero encuestadas						

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Disaggregated by sex

Nombre de área	Transmen - Numerator	Transmen - Denominator	Transwomen - Numerator	Transwomen - Denominator	Other - Numerator	Other - Denominator	Transmen (<25)- Numerator	Transmen (<25) - Denominator	Transwomen (<25) - Numerator	Transwomen (<25) - Denominator	Other (<25) - Numerator	Other (<25) - Denominator
Quito												

## 4.2 Actitudes hacia la violencia contra las mujeres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados									

## 6.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

**Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):**

**Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:**

**Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
<b>Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

**Indicador compuesto: Respondieron "No" a la pregunta 1, a la pregunta 2 o a ambas preguntas (solamente se debe completar esta tabla si los datos para la pregunta 1 y la pregunta 2 son de la misma fuente).**

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

## 6.2 Estigma interiorizado que declaran las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

## I. Encuesta de población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

## II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH

¿Ha elegido la Encuesta del Índice de Estigma de las Personas que Viven con el VIH como su herramienta/fuente de medición de datos?:

Disaggregated by gender and age

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación											
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación											
<b>Denominador :</b> Número de encuestados											

### Disaggregated by gender and age (continued)

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación							
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación							
<b>Denominador :</b> Número de encuestados							

### Disaggregated by key population

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación				
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación				
<b>Denominador :</b> Número de encuestados				

## 6.3 Estigma y discriminación que sufren las personas que viven con el VIH en entornos comunitarios

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

## I. Encuesta basada en la población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados (de 15 años o más) que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las experiencias									
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las tres experiencias que les han ocurrido por su condición de seropositivos en los últimos 12 meses									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

## II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH

Disaggregated by gender and age

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
<b>Porcentaje (%)</b>											
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses											
<b>Denominador</b> : Número de encuestados											

### Disaggregated by gender and age (continued)

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
<b>Porcentaje (%)</b>							
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses							
<b>Denominador</b> : Número de encuestados							

### Disaggregated by key population

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%)</b>				
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses				
<b>Denominador</b> : Número de encuestados				

## 6.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

### **Desagregados por tipo de servicio de salud**

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de encuestados			

### **Numerador - desglosado por tipo de estigma y discriminación experimentado**

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"			

### **Cualquier servicios de salud: desagregados por género y edad**

	Hombres	Mujeres	Transgénero (hombre y mujer)	18-19	20-24	25-49	50+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
<b>Numerador :</b> Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
<b>Denominador :</b> Número de encuestados							

### Disaggregated by key population

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses				
<b>Numerador :</b> Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses				
<b>Denominador :</b> Número de encuestados				

### All healthcare services - disaggregated by length of time knowing HIV-positive status

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15+ años
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
<b>Numerador :</b> Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
<b>Denominador :</b> Número de encuestados					

### LAC2.3.1bA Trabajadoras sexuales que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

## I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

### Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

### Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

### Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es profesional del sexo?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bB Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?"			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores			
<b>Numerador</b> : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
<b>Denominador</b> : Cantidad de encuestados			

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bC Personas que usan drogas inyectables que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

#### Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyectó drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

#### Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bD Personas transgénero que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

#### I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

#### Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

#### Tabla B. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de atención médica o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?"					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores					
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"					
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados					

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC2.3.1bE Miembros de una población vulnerable que experimentaron discriminación en servicios de salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Población vulnerable a la que se refiere la encuesta:

## I. Vigilancia del comportamiento o otros estudios especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo en un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que respondieron "Sí"						
<b>Denominador :</b> Cantidad de encuestados						

**Datos sub-nacionales - Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses**

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

### LAC4.1.1 Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos			
Lesbianas			
Hombres gay			
Hombres bisexuales			
Mujeres bisexuales			
Hombres trans			
Mujeres trans			
Personas intersexuales			

### Datos sub-nacionales

Sitio	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas intersexuales
-------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

### LAC5.1.1 Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses						

### **Datos sub-nacionales**

Sitio	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero

## **6.5A Estigma y discriminación que sufren las trabajadoras del sexo**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:**

**¿Los datos están ponderados?:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Trabajadoras del sexo que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de trabajadores del sexo encuestados						

### Datos sub-nacionales

#### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender - Numerator	Transgender - Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25) - Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25) - Denominator	Transgender (<25) - Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 6.5B Estigma y discriminación que sufren los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres encuestados			

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

## 6.5C Estigma y discriminación que sufren las personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de personas que se inyectan drogas encuestadas						

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender - Numerator	Transgender - Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25) - Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25) - Denominator	Transgender (<25) - Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 6.5D Estigma y discriminación que sufren las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

**Personas transgénero que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
<b>Denominador :</b> Número total de personas transgénero encuestadas						

### Datos sub-nacionales

#### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Disaggregated by sex

Nombre de área	Transmen - Numerator	Transmen - Denominator	Transwomen Numerator	Transwomen - Denominator	Other - Numerator	Other - Denominator	Transmen (<25)- Numerator	Transmen (<25) - Denominator	Transwomen (<25) - Numerator	Transwomen (<25) - Denominator	Other (<25) - Numerator	Other (<25) - Denominator
Quito												

## 6.6A Evitación de los servicios de salud por parte de los profesionales del sexo por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

#### Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### Evitación de las pruebas del VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### Evitación de la atención médica para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador</b>						
<b>Denominador (2) :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender- Numerator	Transgender- Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25)- Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25)- Denominator	Transgender (<25)- Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 6.6B Evitación de los servicios de salud por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

### Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de encuestados			

### Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

### Evitación de la atención médica para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			
<b>Denominador (2)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			
<b>Denominador (2)</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

## 6.6C Evitación de los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

### Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### Evitación de las pruebas del VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### Evitación de la atención médica para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas que usan drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
<b>Denominador (2) :</b> Número de personas que usan drogas inyectables y reportaron haber vivido con el VIH						

## Datos sub-nacionales

### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

### Disaggregated by sex

Nombre de área	Males - Numerator	Males - Denominator	Females - Numerator	Females - Denominator	Transgender - Numerator	Transgender - Denominator	Males (<25) - Numerator	Males (<25) - Denominator	Females (<25) - Numerator	Females (<25) - Denominator	Transgender (<25) - Numerator	Transgender (<25) - Denominator
Quito												

## 6.6D Evitación de los servicios de salud por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

### **Evitación de la atención sanitaria**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de encuestados						

### **Evitación de las pruebas del VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

### **Evitación de la atención médica para el VIH**

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						

### Evitación del tratamiento para el VIH

**Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:**

**Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
<b>Denominador :</b> Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						

### Datos sub-nacionales

#### Total and disaggregated by age

Tipo de área	Nombre de área	Sample size	Percentage (%)	All - Numerator	All - Denominator	<25 - Numerator	<25 - Denominator	25+ - Numerator	25+ - Denominator
Ciudad/Ciudad	Quito								

#### Disaggregated by sex

Nombre de área	Transmen - Numerator	Transmen - Denominator	Transwomen - Numerator	Transwomen - Denominator	Other - Numerator	Other - Denominator	Transmen (<25)- Numerator	Transmen (<25) - Denominator	Transwomen (<25) - Numerator	Transwomen (<25) - Denominator	Other (<25) - Numerator	Other (<25) - Denominator
Quito												

## 6.7 Personas que viven con el VIH que buscan reparación por la violación de sus derechos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que experimentaron abusos de derechos y buscaron reparación											
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación											
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados que sufrieron abusos de derechos											

### Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de encuestados que experimentaron abusos de derechos y buscaron reparación							
<b>Numerador :</b> Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación							
<b>Denominador :</b> Número total de encuestados que sufrieron abusos de derechos							

### Disaggregated by key population group

	Profesionales del sexo	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Transgénero (hombre y mujer)
<b>Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación</b>				

### Disaggregated by type of redress sought

	Formal (presentó una denuncia y/o contactó con un abogado)	Informal (contactó con un político se pronunció públicamente y/o se puso en contacto con una organización/red comunitaria de personas que viven con el VIH para obtener apoyo)	Otro
<b>Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación</b>			

## 7.1 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: No hay dato disponible, para el reporte de este indicador

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave									
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B									

## Hepatitis C

**Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:**

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
<b>Porcentaje (%) :</b> Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave									
<b>Numerador :</b> Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH									
<b>Denominador :</b> Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C									

## 7.2 Pruebas de hepatitis C

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos						
<b>Denominador :</b> Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

### 7.3 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** No hay datos disponibles para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

	Total	Personas que se inyectan drogas
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
<b>Numerador :</b> Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que inician el tratamiento para el VHC durante el periodo de referencia		
<b>Denominador :</b> Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que se inscribieron en la atención del VIH durante el periodo del informe		

### 7.4A Prevalencia de la sífilis entre profesionales del sexo

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición::**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:**

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa						
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa						

### **Prueba de diagnóstico**

Algoritmo de la prueba

## **7.4B Prevalencia de la sífilis entre hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:**

	Todos	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa			
<b>Numerador</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa			
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa			

### Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
------------------------

## 7.4D Prevalencia de la sífilis entre las personas transgénero

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**¿Los datos están ponderados?:**

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	Otro	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas transgénero con sífilis						
<b>Numerador</b> : Número de personas transgénero que dan positivo en las pruebas de sífilis						
<b>Denominador</b> : Número de personas transgénero que se someten a pruebas de sífilis						

### Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
------------------------

## 7.5 Hombres con secreción uretral

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) y Hosvital Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El reporte del indicador mide el Porcentaje de hombres con cuadros de secreción uretral en establecimientos de salud del MSP [Hombres de 15 años a más, 2022(p\*)]

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Notas: 1: La información 2022, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2022 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional. Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [R36X,N340, N342, N485]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye hosvital 10: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo rural y Psicólogo. 11: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. (\*) Información 2022 sujeta a variación

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:** MSP

	Total
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	0
<b>Numerador :</b> Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	273
<b>Denominador :</b> Número de hombres con 15 o más años de edad	4088754

## 7.6 Gonorrea entre la población masculina

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA 1.6 y RDACAA 2.0), Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) y Hosvital Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud - DNEAIS

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El reporte del indicador Porcentaje de gonorrea en población masculina en establecimientos de salud del MSP [Hombres de 15 años a más, 2022(p\*)]

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Notas: 1: La información 2022, se obtiene de la suma de las atenciones registradas en PRAS + RDACAA 2.0. 2: La información 2022 corresponde a las instituciones : MSP, SNAI y Fiscomisional. Numerador 3: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural. 4: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. 5: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de morbilidad según diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [A540, A542, A549,N518,N510 ]. 6: Tipo de diagnóstico: presuntivo, definitivo inicial y definitivo inicial por laboratorio. Denominador 7: Atenciones.- Corresponde a una consulta de prevención o morbilidad de primera o subsecuente 8: La información corresponde a hombres de 15 años a más 9: La información incluye hosvital 10: La información generada en RDACAA corresponde a atenciones brindadas por profesionales: Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo rural y Psicólogo. 11: La información generada en PRAS y RDACAA2.0 corresponde a atenciones brindadas por las especialidades excluyendo enfermería, enfermería rural, auxiliar de enfermería y vacunación. (\*) Información 2022 sujeta a variación

	Total
<b>Índice</b> : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	0
<b>Numerador</b> : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	611
<b>Denominador</b> : Número de hombres de 15 años de edad o más	4088754

## 7.7 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes con tratamiento antirretrovirales Registros de pacientes con tuberculosis: informes trimestrales de TB/registros administrativos ENPCTB

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Informes trimestrales de TB enviados desde el nivel primario en cascada al nivel nacional llega como dato agregado.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** El reporte del indicador corresponde a la Estrategia Nacional de Tuberculosis del MSP

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Numerador</b> : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	764	594	170	19	745

**Nota:** la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2021, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2020 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

## 7.8 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador y denominador)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes con antirretrovirales Registros de pacientes con tuberculosis: Informes trimestrales de TB/registros administrativos de la ENPCTB Otras herramientas (defina las fuentes de datos para el numerador a continuación)

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Informes trimestrales de TB enviados desde el nivel primario en cascada; al nivel nacional llega como dato agregado.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Informes trimestrales de TB enviados desde el nivel primario en cascada; al nivel nacional llega como dato agregado.

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Número total de personas con VIH con tuberculosis (TB) activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se incluyen por primera vez en el tratamiento para el VIH durante el periodo de notificación	14.9
<b>Numerador</b> : Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	764
<b>Denominador</b> : Número total de personas inscritas por primera vez en el tratamiento del VIH (es decir, las que se inscribieron en la terapia antirretrovírica durante el período del informe) <b>Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.9 para las personas que acaban de recibir terapia antirretroviral</b>	5142

## 7.9 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición:** Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador y denominador)

**Otra herramienta/fuente de medición:** Numerador: Registros administrativos de la ENTB Denominador: Sistema PRAS

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Numerador: Informes trimestrales de TB enviados desde el nivel primario en cascada; al nivel nacional llega como dato agregado. La información del numerador de este indicador, a la ENTB únicamente se recolecta el número de PVVS que han recibido TPT; no se recolecta el dato con información sobre inicio reciente o actual de ARV. Denominador: Sistema PRAS - Seguimiento de VIH

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:** Para el numerador no se cuenta con información desagregada por sexo y edad

**¿Se dispone de datos sobre las personas recién inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis?:** No

### Recién inscritos en la terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas recién inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia				
<b>Numerador</b> : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica y que también iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el mismo periodo de notificación				
<b>Denominador</b> : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica (es decir, las inscritas en la terapia antirretrovírica durante el periodo de notificación). Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.8				

**¿Se dispone de nuevos datos sobre las personas que están actualmente en terapia antirretroviral y que han iniciado un tratamiento preventivo contra la tuberculosis?:** Sí

### Actualmente en terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia	0.8			
<b>Numerador</b> : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo del informe	319			
<b>Denominador</b> : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral. Este valor debe ser mayor que el denominador del indicador 7.8	38270			

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
<b>Número total de personas actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que han comenzado el tratamiento preventivo de la tuberculosis antes del período de notificación</b>				

### 7.10 Personas que viven con el VIH y que reciben terapia antirretroviral que completaron un ciclo de tratamiento preventivo contra la tuberculosis

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** No

**Herramienta/fuente de medición:**

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Comenzó con ART en 2020	Comenzó con ART antes de 2020	Niños (0-5)	Niños (5-15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un curso de tratamiento preventivo de la tuberculosis entre los que iniciaron el TPT								
<b>Numerador :</b> Número de personas en terapia antirretroviral que completaron el TPT entre las que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior, p. ej., cohorte de 2021 para el informe de 2023								
<b>Denominador :</b> Número de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior (ingrese el mismo año de cohorte que en el numerador: p. ej., 2021 para informes de 2023)								

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)	Otro
<b>Adultos (15+)</b>								
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:								

	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	Otro
<b>Niños (0-14 )</b>						
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:						

**Datos específicos de ciudades**

	Ciudad 1	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

	Ciudad 2	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

	Ciudad 3	6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)	9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)	36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)	1 meses con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)	Otro
Porcentaje (%)									
Numerador									
Denominador									

## 7.11 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH que se han sometido a pruebas de detección del cáncer de cuello uterino

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado						
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de cribado de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado, y que se sometieron a una prueba de cribado por primera vez en su vida						

## 7.12 Tratamiento del precáncer de cuello uterino para mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para lesiones precancerosas después de un cribado positivo para cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, datos nacionales

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres que viven con el VIH, con resultado positivo en la prueba de detección de cáncer de cuello uterino, que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas en los últimos 12 meses						
<b>Numerador :</b> Número de mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas después de un cribado positivo para el precáncer de cuello de útero						
<b>Denominador :</b> Número de mujeres que viven con el VIH que dieron positivo en el cribado de precáncer de cuello de útero						

#### Desagregación del numerador

	Total
Número de mujeres para las que éste fue el primer episodio de tratamiento de lesiones precancerosas en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento de precáncer en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres que reciben tratamiento precanceroso con crioterapia	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con ablación térmica	
Número de mujeres que reciben tratamiento de las lesiones precancerosas con escisión de gran lazo de la zona de transformación (LLETZ / LEEP)	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con otros métodos de tratamiento	

### 7.13 Tratamiento para el cáncer de cuello de útero invasivo para las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
<b>Porcentaje (%)</b> : El porcentaje de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses						
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que recibieron tratamiento						
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y tuvieron sospechas de cáncer invasivo						

#### Desagregación del numerador

	Total
Número de mujeres para las que este fue el primer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento quirúrgico	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento médico	
Número de mujeres que recibieron tratamiento quirúrgico y médico	

### 7.14 Cobertura de la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (por favor, defina las fuentes de datos a continuación)

Otra herramienta/fuente de medición:: Herramienta de seguimiento para abastecimiento de TARV y sistema PRAS

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** No hay datos disponibles para el reporte de este indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Si el país puede informar del periodo de dispensación desglosado en 3 intervalos mensuales**

**Personas actualmente inscritas y que reciben < 3 meses de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben menos de 3 meses de dispensación de medicamentos antirretrovirales	9					
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron < 3 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita al consultorio, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.	3444					
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.	38270					
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**Personas actualmente inscritas y que reciben de 3 a < 6 meses de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 3 - <6 meses de dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales	91					
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 3 - < 6 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.	34826					
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.	38270					
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**Personas actualmente inscritas y que reciben 6 meses o más de terapia antirretroviral**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 6 meses o más de dispensación de medicamentos antirretrovirales						
<b>Numerador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 6 meses o más de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.						
<b>Denominador :</b> Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.						
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.						

**If the country is unable to report dispensing period disaggregated in 3 monthly intervals**

**People currently enrolled and receiving 3 months or more of antiretroviral therapy**

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
<b>Porcentaje (%)</b>						
<b>Numerador</b>						
<b>Denominador</b>						

**III Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales**

**¿Es el indicador/tema pertinente?:** Sí

**¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior):** Sí

**Herramienta/fuente de medición::** ICPN

**Otra herramienta/fuente de medición::**

**Desde la fecha:** 01/01/2022

**Hasta la fecha:** 31/12/2022

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Descargar este formato:** [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describa el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

## ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
---------	--------------------	--------------	-------	--------------------------	-------------

### A.1 Prevención combinada del VIH para todos

#### Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

**1. ¿Recomiendan las directrices nacionales de su país alguna de las siguientes modalidades/productos de profilaxis previa a la exposición (PrEP)? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** PrEP oral diaria

**1.1 ¿A qué poblaciones se suministra la profilaxis previa a la exposición (PrEP) según las directrices nacionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Profesionales del sexo, Personas transgénero, Parejas serodiscordantes

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**1.2 ¿Quién tiene la autoridad para prescribir la profilaxis previa a la exposición (PrEP) en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** Médicos

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**1.3 ¿Está disponible la profilaxis previa a la exposición (PrEP) a través de alguno de los siguientes medios en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.:** Otro

Si la respuesta es "Otro", especifique: Organizaciones de Sociedad Civil (KIMIRINA)

#### Preservativos

**2. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?:** Sí

**2.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?:** 434820003

**2.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año es la estimación de las necesidades del preservativo?:** 2022-2023

**2.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número estimado de preservativos necesarios?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**3. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento\* de preservativos en los últimos 12 meses?**

:

**3.a Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional:** No

**3.b Situaciones de desabastecimiento de alcance local:** Sí

### A.2 Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH

## **Pruebas sobre VIH**

**4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**5. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?:**

**6. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas de autodiagnóstico sobre VIH como política o plan nacional?:**

**6.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas de forma rutinaria las pruebas de autodiagnóstico del VIH en su país?:**

**6.1 Si la respuesta es negativa, ¿está en desarrollo una política o plan nacional con respecto a las pruebas de autodiagnóstico del VIH?:**

**6.2a Si la respuesta a la Pregunta 6.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas de autodiagnóstico::**

**7. ¿Ha incluido su país remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas) en su política nacional?:**

**7.1 Si la respuesta es negativa, ¿hay una política o plan nacional en desarrollo con respecto a las pruebas del proveedor (notificación asistida para parejas / pruebas para parejas de individuos diagnosticados)?:**

**7.1.a Si la respuesta es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas):**

**8. ¿Su país ha incluido enfoques de servicios de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional?:**

**8.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional en el futuro? :**

**8.1a Si la respuesta a la pregunta 8.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea completar una política nacional sobre enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de las redes sociales:**

**9. ¿Su país utiliza tres pruebas reactivas consecutivas (estrategia/algoritmo de 3 pruebas) para el diagnóstico de VIH positivo?:**

**9.1 En caso negativo, ¿tiene su país un plan para adoptar una estrategia/algoritmo de 3 pruebas para el diagnóstico del VIH?:**

**9.1a En caso afirmativo, indique el año en el que se prevé adoptar una política nacional sobre la estrategia de las tres pruebas para el diagnóstico del VIH.:**

**10. Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria tras un diagnóstico de VIH-positivo?:**

**11. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH tras un diagnóstico de VIH-negativo?:**

## Terapia antirretroviral

**12. Has your country adopted the recommendations on rapid initiation of antiretroviral therapy in the 2021 World Health Organization (WHO) Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach in the WHO 2017 Guidelines for managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**12.1 If your country has adopted a policy on rapid initiation of antiretroviral therapy, what is the status of implementation?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**12.2 Does your country have a policy to offer starting antiretroviral therapy on the same day as an HIV diagnosis, as part of the policy on rapid initiation of antiretroviral therapy?:**

**12.3 If your country has a policy on same day start, what is the status of implementation?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**13. Is CD4 testing for diagnosing advanced HIV disease available?:**

**13.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique (Seleccione todas las opciones que correspondan):

**13.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen acceso a los clientes a las pruebas y los resultados?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**13.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el tiempo promedio para que el paciente reciba los resultados de las pruebas CD4? :**

Especifique:

**14. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan):**

**15. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (externo a las instalaciones de salud)?:**

**15.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿la entrega comunitaria está implementada...:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**15.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué poblaciones se proporciona la terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como fuera de las instalaciones de salud) en su país?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**15.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios de atención diferenciados utiliza su país para la recogida de medicamentos antirretrovirales (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**16. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los adultos que están establecidos\* en la terapia antirretroviral?:**

**16.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::**

**16.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**17. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia con la que los adultos que están establecidos\* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?:**

**17.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**17.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**18. Do the country's national criteria for (or definition of) people established\* on antiretroviral therapy include the following elements defined in the 2021 World Health Organization (WHO) Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach? )Please select all that apply):**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**19. ¿Proporciona el país apoyo psicológico a los adolescentes que viven con el VIH?:**

**20. ¿Su país emplea intervenciones para rastrear a las personas que se han desvinculado de la asistencia y proporcionarles apoyo para que vuelvan a participar?:**

**21. Please provide the country's national criteria for (or definition of) "lost to follow-up". For guidance, the World Health Organization (WHO) defines "lost to follow-up" as a patient who has not received antiretroviral medicines within 28 days of their last missed drug collection appointment.:**

**22. Has your country adopted the recommendations in the 2021 World Health Organization (WHO) Consolidated guidelines on HIV prevention, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach to offer a package of interventions to all patients presenting with advanced HIV disease (defined by WHO as CD4<200)?:**

Especifique:

**22.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**23. ¿Cuáles de los siguientes componentes del paquete de intervenciones avanzadas contra la enfermedad del VIH para la tuberculosis (TB), las infecciones bacterianas graves y la meningitis criptocócica recomendadas en las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre la prevención, las pruebas, el tratamiento, la prestación de servicios y el seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública están incluidos en la política nacional sobre la terapia antirretrovírica para adultos, adolescentes y niños? Por favor, seleccione todo lo que corresponda.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**24. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**25. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan un centro de salud público?:**

**25.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una tasa formal específica o una tasa informal/variable para lo siguiente?:**

**25.1.a Pruebas sobre VIH:**

**25.1.b Dispensado de PrEP:**

**25.1.c Cita de atención primaria:**

**25.1.d Tarjetas de paciente:**

**25.1.e Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral):**

**25.1.f Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales):**

**25.1.g Dispensing of prevention and treatment of co-infections:**

**25.1.h Dispensing of other co--therapies (e.g., medicines for noncommunicable diseases, sexual and reproductive health or immunizations):**

## **Regímenes de terapia antirretroviral**

### **Adultos y adolescentes**

**26. En base a las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública, ¿es el TDF + 3TC (o FTC) + DTG la combinación antirretroviral de primera línea preferida para el inicio del tratamiento en las directrices nacionales para lo siguiente**

:

**26.a Adultos y adolescentes:**

**26.a.i. If yes, what is the status of implementation?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

26.a.ii. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

26.a.iii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC (o FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

26.b Mujeres en edad de procrear:

26.b.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

26.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

26.c Mujeres embarazadas y/o lactantes:

26.c.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

26.c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

27. Does your country use fixed-dose combination (FDC) antiretroviral therapy as the preferred first-line therapy (please select all that apply):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

28. ¿En las directrices nacionales se incluye un régimen basado en DTG como opción para la combinación antirretroviral de segunda línea para adultos y adolescentes con VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

29. Is an ATV/r-based (or LPV/r-based) regimen included in the national guidelines as an option for second-line antiretroviral combination for adults and adolescents with HIV?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

30. Is a DRV/r-based regimen included in the national guidelines as an option for second-line antiretroviral combination for adults and adolescents with HIV?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **Niños**

31. ¿Son los regímenes de DTG la opción preferida de inicio de tratamiento en las directrices nacionales para todos los bebés y niños con VIH?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**31.1 Si DTG no es la opción de tratamiento preferida para los lactantes y niños mayores de 4 semanas y que pesen más de 3 kg, ¿son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento preferida?:**

**32. ¿Cuál es la estructura central de INNTI\* recomendada para iniciar el tratamiento en niños en las directrices nacionales?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**33. Is DTG recommended as the preferred second-line option for children failing NNRTI-based regimens?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**34. Is DTG recommended as the preferred second-line option for children failing protease inhibiting-based regimens?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**35. ¿Se recomienda LPV/r (o ATV/r) como la opción de segunda línea de preferencia para los niños en los que fracasan los regímenes basados en DTG?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**36. ¿Se integra alguna de las siguientes actividades de desarrollo de la primera infancia en los programas de VIH? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

### **Carga viral**

**37. Please identify from national treatment guidelines the measured threshold at which viral load suppression in an individual is defined as suppressed.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**38. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre las pruebas de carga viral\* de rutina para el seguimiento de la terapia antirretroviral?**

:

**38.a Para adultos y adolescentes:**

**38.a.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Si la respuesta es negativa, ¿están disponibles pruebas de carga viral dirigidas?:

**38.b Para niños:**

**38.b.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**39. Does your country have a current national policy on Is point-of-care viral load testing?:**

**39.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**40. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?:**

**41. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y adolescentes)?:**

**41.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad**

**42. ¿Cuenta su país con un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales?:**

**42.1 Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan::**

**43. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:**

**43.a Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR):**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta de PDR:	

**43.b HIV drug resistance survey among individuals exposed to pre-exposure prophylaxis (PrEP) diagnosed with HIV infection:**

**43.b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

**43.c Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos:**

**43.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

**43.d Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil:**

**43.d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

**43.e Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano:**

**43.e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año se inició la última encuesta sobre recién nacidos:	

**43.f Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH:**

**43.f.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

	Valor de datos
Año en que se monitoreó por última vez:	
Cantidad de centros sanitarios monitoreados:	

**43.f.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaban de las siguientes maneras::**

**44. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de segunda línea?:**

**45. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?:**

**45.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::**

**46. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de DTG?:**

**46.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::**

**46.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de DTG?:**

## **Adherencia y retención**

**47. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?:**

**47.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**48. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**49. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?:**

**49.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**50. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**51. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?:**

## **Tuberculosis/HIV**

**52. Are the following screening tools recommended for people living with HIV in national strategies, policies, plans or guidelines related to tuberculosis (TB) and/or HIV? (Please select all age groups that apply):**

**53. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política The use of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis and screening of active tuberculosis in people living with HIV de la OMS de 2015?:**

**54. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan)**

:

**54.a Adultos y adolescentes que viven con el VIH:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**54.a.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**54.b Niños que viven con el VIH:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**54.b.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**55. Are the following required in national guidelines prior to initiating TB preventive treatment in people living with HIV?**

:

**55.a Prueba cutánea de tuberculosis o prueba de ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA):**

**55.b Rayos X:**

**56. En el último periodo del que se informa, ¿ha habido situaciones de desabastecimiento de...?**

:

**56.a Isoniacida:**

**56.b Vitamina B6:**

**56.c Rifapentine (including fixed-dose combinations with isoniazid):**

**57. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?**

:

**57.a Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por ejemplo: Xpert MTB/RIF):**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**57.b Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**57.c El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**57.d Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

### **A.3 Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical**

#### **Prevention of vertical transmission of HIV**

**58. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH-negativas durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia?:**

**58.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo se vuelve a realizar la prueba?:**

**58.1.a Durante el embarazo:**

**58.1.b En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo::**

**58.1.c En el parto:**

**58.1.d Posparto/lactancia:**

**58.1.c.i En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto::**

**59. Does your country have a policy on hepatitis B testing of women during pregnancy?:**

**60. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical del VIH?:**

**60.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:**

**Objetivo(s) de la tasa de transmisión vertical (%)::**

**Año:**

:

**Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos por 100 000 habitantes)::**

**Año:**

**61. ¿Está su país aplicando una política de tratamiento universal para las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH?:**

**62. ¿Cuál es el régimen actual recomendado a nivel nacional para los bebés expuestos al VIH para prevenir la transmisión vertical del VIH?**

:

**Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos::**

**Duración recomendada del régimen::**

**62.a ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?:**

**62.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes::**

**62.a.ii ¿Cómo define la política nacional el concepto de "bebé de alto riesgo"? Seleccione todas las opciones que correspondan:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**63. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil para recién nacidos expuestos al VIH?:**

**63.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?:**

**Si la respuesta es afirmativa, especifique la duración en meses:**

**64. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país a programas de prevención de la transmisión vertical?:**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**65. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto para mujeres que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?:**

**66. Does your country have a policy on viral load testing for women during pregnancy, delivery and/or the post-partum/ breastfeeding period?:**

**66.1 If yes, when is viral load testing done?:**

**66.1.a Durante el embarazo:**

**66.1.a En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo::**

**66.2 En el parto:**

**66.3 Posparto/lactancia:**

**66.3.a En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto::**

### **Eliminación de la transmisión vertical de la sífilis**

**67. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical de la sífilis?:**

**67.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se actualizó por última vez el plan nacional?:**

**68. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?:**

**68.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?::**

**69. ¿Cuenta su país con directrices nacionales para el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis?:**

**69.1 En caso afirmativo, ¿es la penicilina benzatina la primera línea de tratamiento recomendada en las directrices nacionales?:**

**69.2 En caso afirmativo, ¿permite su política el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis con penicilina benzatina en los centros de atención primaria, incluidas las clínicas prenatales, por cualquiera de los siguientes profesionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

**70. ¿Cuenta su país con una política nacional de seguimiento clínico de los bebés nacidos de madres seropositivas?:**

**71. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?:**

### **Diagnóstico infantil**

**72. ¿Recomiendan sus directrices nacionales que los bebés expuestos al VIH se sometan a las siguientes pruebas? Seleccione todas las opciones que correspondan. :**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**73. Además de los entornos de prevención de la transmisión maternoinfantil, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccione todas las opciones que correspondan):**

**Si la respuesta es "Otro", especifique:**

**74. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención sanitaria?:**

**74.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **Terapia antirretroviral para niños**

**75. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los niños que están establecidos\* en la terapia antirretroviral?:**

**75.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**75.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**76. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los niños que están establecidos\* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?:**

**76.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la recogida de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional::**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**76.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**77. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?:**

**78. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?:**

**79. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?:**

**80. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

## **A.4 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas**

### **Violencia**

**81. ¿Cuenta su país con, al menos, un punto de prestación de servicios que proporcione elementos de atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Los elementos son: (1) asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial; (2) anticoncepción de emergencia; (3) profilaxis o tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS); (4) profilaxis postexposición al VIH (PPE); y (5) aborto seguro con todo el rigor de la ley.:**

**81.1 En caso afirmativo, ¿qué proporción de centros sanitarios prestan cada uno de los siguientes servicios de la atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?:**

**81.1.a Asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial:**

**81.1.b Anticonceptivos de emergencia:**

**81.1.c Tratamiento o profilaxis de las infecciones de transmisión sexual (ITS):**

**81.1.d Profilaxis postexposición al VIH (PEP):**

**81.1.e Aborto seguro con todo el rigor de la ley:**

## **A.5 Liderazgo comunitario**

### **Liderazgo comunitario**

**82. ¿Existen leyes, reglamentos o políticas que contemplen el funcionamiento de las organizaciones comunitarias en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**83. ¿Existen leyes, políticas o reglamentos que permitan el acceso a la financiación de las organizaciones dirigidas por la comunidad? Seleccione todas las opciones que correspondan.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

### **Participación**

**84. ¿Participan las personas que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**85. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH\* en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la prevención de la transmisión de madre a hijo?:**

**86. ¿Participan los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres\* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**87. ¿Participan\* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**88. ¿Participan\* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**89. ¿Participan\* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**90. ¿Participan\* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:**

**91. ¿Participan\* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:**

**91.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan\* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?**

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?
--	----------	--

Otro, especifique:

**A.6 Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación**

**Leyes punitivas**

92. Si la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH están tipificadas como delito, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

93. Si las personas transgénero están criminalizadas, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar a las personas transgénero en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

94. Si el trabajo sexual está penalizado, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizarlo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

95. Si los actos sexuales entre personas del mismo sexo están penalizados, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

:

96. Si el consumo de drogas y/o la posesión para uso personal son delitos penales, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar el consumo de drogas o la posesión para uso personal en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

97. Si el consumo y/o la posesión de drogas son infracciones administrativas/no penales, ¿se aplica alguna de las siguientes medidas en su país para las personas que consumen drogas? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

**A.7 Cobertura sanitaria universal e integración**

**Cáncer de cuello de útero**

**98. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en los siguientes?**

:

a. La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables:

b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida:

c) Directrices nacionales sobre el tratamiento y/o las pruebas del VIH:

d) Otro documento político (especifique)::

especifique:

**99. Have the recommendations for women living with HIV in the 2021 World Health Organization (WHO) Guidelines for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention been adopted in your country's national guidelines?:**

**99.a En caso negativo, indique el año en el que está prevista la adopción de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021.:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**Politiques relatives aux co-infections**

**100. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:**

Si la respuesta es "Otro", especifique:

**Infecciones de transmisión sexual (ITS)**

**101. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones de tratamiento nacionales para infecciones de transmisión sexual (ITS)?:**

**101.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?:**

**102. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de ITS?:**

**103. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos gonocócicos?:**

**Protección social**

**104. Does the national social protection strategy, policy or framework::**

**104.1 Recognize people living with HIV as key beneficiaries?:**

**104.1.a En caso negativo, describa las condiciones en las que las personas que viven con el VIH pueden acceder a las prestaciones de protección social::**

**104.2 Recognize any key populations (sex workers, gay men and other men who have sex with men, people who inject drugs, transgender people or prisoners) as key beneficiaries?:**

**104.2.a Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan):**

**104.2.b Si la respuesta es negativa, describa las condiciones en las que las poblaciones clave pueden acceder a las prestaciones de protección social::**

**104.3 Recognize adolescent girls and young women as key beneficiaries?:**

**104.4 Recognize children affected by HIV as key beneficiaries?:**

**104.5 Recognize families affected by HIV as key beneficiaries?:**

**104.6 Address the issue of unpaid care work in the context of HIV?:**

**105. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre Sida o su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social\*?:**

**106. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo\* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?:**

## **Seguro médico universal**

**107. ¿Cuenta su país con un programa de seguro médico universal?:**

**107.1 En caso negativo, ¿su país está pasando a un programa de seguro médico universal?:**

**107.2 En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 107 o 107.1, ¿el paquete de prestaciones incluye lo siguiente?:**

**107.2.a Medicamentos antirretrovirales:**

**107.2.b Profilaxis previa a la exposición (PPRE):**

## **A.8 Datos, ciencia e innovación**

### **Sistema de Información sanitaria**

**108. ¿Se dispone de forma rutinaria de datos a nivel de paciente en el sistema de información sanitaria?:**

**108.1 Si existen datos a nivel de paciente, ¿se incluyen los datos de las pruebas de atención prenatal y del tratamiento en cascada en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito? (Seleccione todos los que correspondan):**

### **Vigilancia**

**109. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifican por ley?:**

**110. ¿Cuenta el país con un sistema nacional de vigilancia de casos de VIH\*?:**

**110.1 En caso afirmativo, ¿el sistema nacional de vigilancia de casos de VIH incluye alguno de los siguientes elementos? (Seleccione todos los que correspondan):**

## Sistemas de seguimiento de pacientes

111. ¿Ha actualizado el país los indicadores y herramientas de pruebas y tratamiento del VIH utilizando las Directrices consolidadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 sobre información estratégica del VIH centrada en la persona?:

### Códigos de identificación únicos para pacientes

112. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los siguientes servicios?

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
--	---	---	---

### Servicios de prevención de VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para rastrear la adopción de métodos de prevención combinados

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
--	---	---	---

"Si OTROS en los servicios de prevención del VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para el seguimiento de la aceptación de la prevención combinada, por favor, especifique":

112.1 En caso de respuesta afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, ¿la política de identificadores únicos también prevé protecciones de la privacidad de los datos legalmente exigibles?:

### 95-95-95

113. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional?:

113.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 2.2?:

114. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión más reciente de la calidad de los datos para determinar la exactitud del número de personas que, según los informes, tienen cargas víricas suprimidas?:

114.1 Si se ha llevado a cabo una revisión de la calidad de los datos en el último año, ¿se ha utilizado para ajustar el número de personas que tienen cargas víricas suprimidas notificadas en el indicador 2.3?:

### Uso de datos

115. ¿Se están realizando revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH?:

115.1 En caso afirmativo, seleccione la frecuencia con la que se realizan las revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

115.2 En caso afirmativo, ¿a qué nivel se realizan las revisiones de datos? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

## IV Encuesta del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del Sida (AMDS) sobre el uso de antirretrovirales (ARV) y de laboratorios, y aplicación de

## las guías de la OMS pertinentes

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario:

Cargo:

Institución:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono:

## 1A Visión general del tratamiento antirretroviral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Dirección Nacional de Estrategias Prevención y Control para Enfermedades Transmisibles / ENVIH Componente Abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos / Orden de compras y estimación de precios (OPS)

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Total de PVV con TARV en el MSP 36.187 Durante el año 2022, el MSP realizó compras de medicamentos antirretrovirales, dispositivos médicos e insumos a través de convenios internacionales con OPS (Fondo Estratégico) y Fondo Mundial (Wambo), mismo que ha permitido optimizar recursos económicos, obteniendo mayor cantidad a menor costo; así mismo permitir al Estado un ahorro significativo para el diagnóstico y tratamiento para VIH. El País inició el Plan de Transición de esquemas de tratamiento antirretroviral en el junio del 2022, y para el cierre del año 2022 el MSP alcanzó el 100% de la transición en sus unidades de atención integral El TARV en el Ecuador, es gratuito por mandato constitucional y tiene una cobertura universal y gratuita, incluyendo a personas en situación de movilidad humana o extranjeros residentes, así como el respaldo del abastecimiento de la TARV en los PVV que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: - El 24 de junio del 2019, con Acuerdo Ministerial Nro. 000374-2019, se emite la "Guía Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos 2019", en la cual se incluyen nuevos principios activos y formas farmacéuticas de los medicamentos antirretrovirales - ARVs. - El 09 de septiembre del 2019, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00038-2019 se publicó la Décima revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, en el cual se incluye el medicamento Dolutegravir 50 mg sólido oral. - El 04 de mayo del 2020, mediante MSP-SNGSP-2020-1162 la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de Salud Pública a través la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos - DNMDM, autoriza a la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control la adquisición del medicamento tenofovir disoproxil fumarato 300mg/ lamivudina 300mg/ dolutegravir 50 mg. - Plan de transición de fármacos antirretrovirales de la Guía Práctica Clínica de VIH 2019, emitido el 16 de abril de 2019. -Oficio Nro. MSP-MSP-2020-1842-O del 17 de julio de 2020, mediante el cual el Ministro de Salud Pública del Ecuador - MSP remitió a la Organización Panamericana de la Salud - OPS el requerimiento de los medicamentos antirretrovirales según los informes técnicos adjuntos, elaborados por la

Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control; y, la Dirección Nacional Medicamentos y Dispositivos Médicos. -Oficio Nro. ECU/AM/PRO/TW (287-20) del 27 de agosto de 2020, mediante el cual la OPS envió al MSP la estimación de precios de medicamentos antirretrovirales - ARVs mediante documento Nro. REQ20-00004702, para el año 2021

Question 1. Number of adults and children on ART at the end of 2022: 36187

## 1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) vih positivos, incluyendo embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Dirección Nacional de Estrategias Prevención y Control para Enfermedades Transmisibles / ENVIH / Componente de medicamentos y dispositivos médicos Los datos corresponden pacientes adultos y adolescentes ( $\geq 10$  años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2022 en unidades de atención integral del MSP

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: El País inició el Plan de Transición de Esquemas de Tratamiento Antirretroviral en el junio del 2020, y para el cierre del año 2022 el MSP alcanzó el 100% de la transición en sus unidades de atención integral

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

### Pregunta 2. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2022

	Número total de adultos y adolescentes ( $\geq 10$ años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2021
Primera línea	32169
Segunda línea	4977
Tercera línea/rescate	698
<b>TOTAL</b>	<b>37844</b>

### Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2022, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2022	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2022	TOTAL
TDF/3TC/DTG 300/300/50	32169	32169

**TOTAL: 32169**

### Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2022.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022.

Lista de esquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2022	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2022	TOTAL
ABC/3TC+DTG 600/300+50	1901	1901
TDF/FTC+DTG 300/200+50	1147	1147
TDF/FTC+ATZ/r 300/200+300/100	636	636
ABC/3TC+ATZ/r 600/300+300/100	369	369
ABC/3TC+DTG 600/300+50	264	264
AZT/3TC+ATZ/r 300/150+300/100	254	254
AZT/3TC+DTG 300/150+50	251	251
AZT/3TC+DTG 300/150+50	89	89
ABC+3TC+DTG 300+150+50	49	49
TDF/FTC+DTG+ATZ/r 300/200+50+300/100	7	7
ABC+3TC+ATZ/r 300+150+300/100	5	5
AZT+ABC+ATZ/r 300+300+300/100	5	5

**TOTAL: 4977**

**Pregunta 5 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes  $\geq 10$  años VIH positivos a fines del 2022.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022**

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea/rescate administrados adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos a fines del 2022	Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2022	TOTAL
TDF/FTC+DRV+RTV 300/200+600+100	301	301
ABC/3TC+DRV+RTV 600/300+600+100	133	133
AZT/3TC+DRV+RTV 300/150+600+100	72	72
DTG+DRV+RTV 50+600+100	64	64
DTG+ATZ/r 50+300/100	51	51
DRV+RTV+ETR+DTG 600+100+200+50	50	50
TDF/FTC+DTG+DRV+RTV 300/200+50+600+100	27	27

**TOTAL: 698**

## **2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Dirección Nacional de Estrategias Prevención y Control para Enfermedades Transmisibles / ENVIH / Componente de medicamentos y dispositivos médicos

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Los datos corresponden a PVV que recibieron tratamiento antirretroviral en unidades de atención integral del MSP [Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2022]

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Pregunta 6. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2022**

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2021
Primera línea	274
Segunda línea	144
Tercera línea/rescate	8
<b>TOTAL</b>	<b>426</b>

**Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2022.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022.**

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2022	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
TDF/3TC/DTG 300/300/50	0	263	263
AZT+3TC+LOP/RTV 50/5+50/5+80/20	11	0	11

**TOTAL**

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>263</b>	<b>274</b>

**Pregunta 8. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2022.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022.**

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2022.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2022
ABC/3TC+ATZ/r 600/300+300/100	144

**TOTAL**

	Valor de datos
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>

**Pregunta 9 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2022.**

**Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2022.**

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2022
DRV+RTV+ETR+DTG 600+100+200+50	8

**TOTAL**

	Valor de datos
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

### **3 Prevención de la transmisión materno-infantil**

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTRATEGIA NACIONAL DE VIH / ETMI - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COHERTE 2022 (12 MESES)

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 10: Número de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil y otras opciones de PTMI durante el 2022: 383

Pregunta 11. Por favor liste el número de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2022.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2022	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2022
ZIDOVUDINA - LIQUIDO ORAL - 50/5 mg/mL + LAMIVUDINA - LIQUIDO ORAL - 50/5 mg/mL + NEVIRAPINA - LIQUIDO ORAL - 50/5 mg/m	355

## TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

## 4 Servicios de laboratorio

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: SISTEMA PRAS [PLATAFORMA DE REGISTRO DE ATENCIONES EN SALUD] REPORTE DE LABORATORIO REGISTROS ADMINISTRATIVOS INSPI [INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICA]

Desde la fecha: 01/01/2022

Hasta la fecha: 31/12/2022

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: PARA EL CASO DEL REPORTE DE LINFOCITOS DE CD4, CORRESPONDE A LOS REPORTES PROPORCIONADOS POR INSPI. PRA EL AÑO 2022 EL INSPI SE CONSIDERABA EL LABORATORIO DE REFERENCIA PARA LAS PRUEBAS DE CD4, (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSP) EN EL DATO REPORTADO EXISTE INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL IESS QUE REPORTAN AL SISTEMA PRAS

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

## PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 12. Número total de pruebas rápidas de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2022:	907500
Pregunta 13. Número total de pruebas ELISA de VIH realizadas entre enero y diciembre del 2022: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	
Pregunta 14. Número total de pruebas de anticuerpos del VIH, incluidas las pruebas rápidas y ELISA realizadas entre enero y diciembre de 2022	907500

## PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2022:	50375
Pregunta 16. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2022:	31117
Pregunta 17. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2022:	292

## CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 18. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2022:	48906
Pregunta 19. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2022:	32278
Pregunta 20. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2022:	321

## DIAGNÓSTICO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
Pregunta 21. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2022:	1159
Pregunta 22. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2022:	582

## Pregunta 22: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

### Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida		1647			
DIAGNÓSTICO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES					
CD4	41	3	3		
Carga viral	51	40			
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH					
GeneXpert (prueba de tuberculosis)	1647	62			

## 5 Metas del país con fines de proyección

¿Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

**Pregunta 24. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.**

**Meta del país**

	A fines del 2023	A fines del 2024	A fines del 2025	A fines del 2026	A fines del 2027	A fines del 2028
<b>1. Número de adultos y niños que reciben TAR</b>						
<b>1.1 :</b> Número de adultos y adolescentes $\geq 10$ años que reciben TAR						
<b>1.2 :</b> Número de niños $< 10$ años que reciben TAR						
<b>1.2.1 :</b> Número de niños $< 3$ años que reciben TAR						
<b>1.2.2 :</b> Número de niños de 3 a $< 10$ años que reciben TAR						
<b>2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH</b>						
<b>3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH</b>						
<b>4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4</b>						
<b>5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral</b>						
<b>6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano</b>						
<b>7. Número total de pruebas serológicas del HIV</b>						
<b>8. Número de pruebas de CD4</b>						
<b>9. Número de pruebas de carga viral</b>						
<b>10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses</b>						

**Pregunta 25: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.**

**Adultos**

### Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
---------	---	---	---

#### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

### Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
---------	---	---	---

#### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

### Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
---------	---	---	---

#### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

**Pregunta 26. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.**

#### Tratamiento antirretroviral en niños

##### Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
---------	---	---	---

#### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

##### Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
---------	---	---	---

#### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
<b>Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral</b>			

### Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025

### Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
<b>Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral</b>			

**Question 27. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.**

### Número de pruebas realizadas en el 2022 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas previstas para 2023	Pruebas previstas para 2024	Pruebas previstas para 2025	Pruebas previstas para 2026
<b>Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)</b>				
<b>CD4 test</b>				
<b>Carga viral</b>				
<b>Diagnóstico temprano infantil de VIH</b>				