


SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONOTICAS Leptospira
ECUADOR 2024 SE 01-20

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género *Leptospira*. Existen 20 especies de *Leptospira*, tanto patógenas como no patógenas, con 300 serovariedades agrupadas en 26 serogrupos, que afectan principalmente a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. El periodo de incubación de la enfermedad varía entre 5 y 14 días, aunque puede extenderse hasta 30 días. La transmisión ocurre por contacto con mucosas o piel lesionada expuestas a tierra húmeda, vegetación contaminada con orina o tejidos de animales infectados, o agua contaminada.

La leptospirosis presenta diversas formas clínicas, desde un síndrome gripal leve hasta el síndrome de Weil, que se caracteriza por ictericia, insuficiencia renal, hemorragia y miocarditis con arritmia. También puede manifestarse como meningitis o meningoencefalitis, y en algunos casos, hemorragia pulmonar que lleva a insuficiencia respiratoria.

En el Ecuador la leptospirosis se monitorea debido a su potencial de causar enfermedad grave o muerte. En comparación a los tres años anteriores en el 2023, se ha observado un aumento en las notificaciones, mientras que en 2024 los casos disminuyeron en comparación con el año anterior, aunque se mantienen altos. La provincia de Guayas es la que reporta el mayor número de casos acumulados.


Casos de A270-A279 Leptospirisos por Semana Epidemiológica SE 01-20. Ecuador 2024




Casos de A270-A279 Leptospirisos por Provincia SE 01-20. Ecuador 2024

Prov Domic	SE 01- 19	SE 20	Total
GUAYAS	88	8	96
MANABI	45	3	48
LOS RIOS	11		11
SANTO DOMINGO	9		9
PICHINCHA	7	1	8
NAPO	8		8
MORONA SANTIAGO	7		7
ESMERALDAS	4	2	6
ORELLANA	5		5
LOJA	4		4
SUCUMBIOS	3		3
SANTA ELENA	2		2
EL ORO	2		2
BOLIVAR	2		2
AZUAY	2		2
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
TUNGURAHUA	1		1
PASTAZA	1		1
IMBABURA	1		1
COTOPAXI	1		1
CAÑAR	1		1
Total	205	14	219

Casos de A270-A279 Leptospirisos, por Provincia SE 01-20. Ecuador 2024



Casos de A270-A279 Leptospirisos, por grupos de edad y sexo SE 01-20 Ecuador 2024



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C.: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2024 SE 01-20


La Brucelosis es un enfermedad zoonótica, producida por varias especies de bacterias de género Brucella (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis, Brucella ceti y Brucella pinnipedialis, las tres primeras son las que principalmente afectan al hombre); en humanos puede ser de comienzo agudo o insidioso, se caracteriza por presentar fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable, "sudoración profusa, artralgia, mialgia (triada clásica)", cefalea, debilidad, fatiga, anorexia y pérdida de peso. Puede durar días, meses o más de un año si no es tratada adecuadamente.

El reservorio más común es el ganado vacuno, porcino, caprino y ovino; el período de incubación puede ser de cinco a 60 días, más comúnmente de uno a dos meses. Entre los mecanismos de transmisión están el contacto directo con el animal infectado a través de la mucosas o piel lesionada con tejidos, sangre, orina, secreciones vaginales, fetos abortados, especialmente placentas. Consumir alimentos o bebidas contaminadas como carne poco cocida, productos lácteos no pasteurizados. La inhalación de agentes transmitidos por el aire.

La prevención más importante es eliminar la infección de los animales contaminados, así como la capacitación y entrenamiento del personal expuesto; la búsqueda activa de casos, la vigilancia epidemiológica, esta vigilancia que debe ser coordinada en territorio con Agrocalidad.

En el Ecuador de acuerdo a las cifras ingresadas al Sistema de Vigilancia la incidencia de la enfermedad en humanos para el año 2022 es de 0.16 por 100.000 habitantes; hasta la SE 20 de 2024 se ha notificado 8 casos, la provincia con el mayor número de casos es de Imbabura


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 01-20. Ecuador 2024



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-20. Ecuador 2024


Prov Domic	SE 01- 19	SE 20	Total
IMBABURA	8		8
SANTO DOMINGO	1		1
NAPO		1	1
MANABI	1		1
GUAYAS	1		1
COTOPAXI		1	1
Total	11	2	13

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-20 Ecuador 2024



Los casos de la semana, 17, 18, 20 se encuentran estudio, por lo que este dato es susceptible de cambio

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo SE 01-20 Ecuador 2024




Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
 Bibliografía
 1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2024 SE 01-20

Aualmente se registran 10 millones de exposiciones en seres humanos y 55 defunciones por rabia, casi todas en los países en desarrollo, en particular en Asia y África. (2) La mayoría de muertes en seres humanos son secundarias a mordeduras de perro en las cuales no se brindó una profilaxis adecuada después de la exposición. (3) En Ecuador el primer caso de rabia se notificó en 1941, en 1996 el país registro la más grave epidemia de rabia con 65 personas fallecidas con una tasa de mortalidad de 0.58 por 100.000 mil habitantes, una de las más altas de los países de las Américas. (3) El último caso registrado de rabia en caninos fue en el 2006 y en el 2011 se registró un caso de rabia silvestre en humanos. En el país se ha diagnosticado rabia en otras especies, de animales que incluyen, felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, en zonas rurales y urbanas marginales, así como también rabia silvestre en murciélagos. (3) En el año 2024 la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumento en relación al año 2023. La provincia con mayor notificación en el año 2022 fue Pichincha con 1738 casos acumulados.


Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Semana Epidemiol gica SE 01-20. Ecuador 2024




Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Provincia SE 01-20. Ecuador 2024

Prov Domic	SE 01-19	SE 20	Total
PICHINCHA	1.685	53	1.738
GUAYAS	842	29	871
MANABI	594	24	618
TUNGURAHUA	457	20	477
AZUAY	273	6	279
COTOPAXI	228	20	248
LOS RIOS	234	8	242
BOLIVAR	197	10	207
ESMERALDAS	196	8	204
CHIMBORAZO	164	7	171
SANTO DOMINGO	164	6	170
ZAMORA CHINCHIPE	149	3	152
CA�NAR	128	4	132
SUCUMBIOS	126	5	131
SANTA ELENA	125	6	131
IMBABURA	118	10	128
MORONA SANTIAGO	125	1	126
LOJA	122	3	125
NAPO	112	1	113
PASTAZA	107	5	112
CARCHI	89	3	92
ORELLANA	62	2	64
EL ORO	51	1	52
Total	6.348	235	6.583

Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Provincia SE 01-20 Ecuador 2024



Caso de Mordedura de animales subseptibles a r bia, por grupos de edad y sexo SE 01-20 Ecuador 2024



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variaci n
Bibliograf a
 1. Ministerio de Salud P blica del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acci n SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edici n, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminaci n de la rabia humana transmitida por perros en Am rica Latina; An lisis de Situaci n, Washintong D.C: OPS 2005