



SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 INMUNOPREVENIBLES HEPATITIS B CIE - 10 B16.0 <-> B16.9
 Ecuador, SE 01-38 / 2024

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados. En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1). En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se la realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual. En el 2024 hasta la SE 38 se reporta 264 casos de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos es Pichincha con 56


Casos de Hepatitis B, por provincia. Ecuador, SE 01-38 año 2024		
PROVINCIA	SE 01-37	Total
PICHINCHA	56	56
ESMERALDAS	44	44
GUAYAS	26	26
MORONA SANTIAGO	26	26
MANABI	22	22
PASTAZA	13	13
LOS RIOS	11	11
SANTO DOMINGO	10	10
NAPO	9	9
COTOPAXI	8	8
AZUAY	6	6
ORELLANA	6	6
EL ORO	5	5
IMBABURA	5	5
SUCUMBIOS	5	5
CAÑAR	3	3
LOJA	3	3
TUNGURAHUA	3	3
BOLIVAR	2	2
CARCHI	1	1
Total	264	264



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2024 SE 01-38



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2024 (SE 01-38)



1. Chin J, American Public Health Association. El control de las enfermedades transmisibles. Decimonove. L HD, editor. ops: 2011. 748 p