


SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INMUNOPREVENIBLES HEPATITIS B CIE - 10 B16.0 <-> B16.9
Ecuador, SE 01-47 / 2024


La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados. En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1). En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se la realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual.

En el 2024 hasta la SE 47 se reporta 329 casos de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos es Pichincha con 70


Casos de Hepatitis B, por provincia. Ecuador, SE 01-47 año 2024			
PROVINCIA	SE 01- 46	SE 47	Total
PICHINCHA	70		70
ESMERALDAS	57		57
GUAYAS	33	3	36
MORONA SANTIAGO	28	2	30
MANABI	26		26
PASTAZA	15		15
LOS RIOS	12		12
SANTO DOMINGO	12		12
NAPO	11		11
COTOPAXI	9		9
IMBABURA	9		9
ORELLANA	9		9
AZUAY	7		7
EL ORO	6		6
LOJA	5		5
SUCUMBIOS	5		5
CAÑAR	4		4
TUNGURAHUA	2	1	3
BOLIVAR	2		2
CARCHI	1		1
Total	323	6	329



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2024 SE 01-47



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2024 (SE 01-47)



1. Chin J, American Public Health Association. El control de las enfermedades transmisibles. Decimonove. L HD, editor. ops; 2011. 748 p