


SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOOTICAS *Leptospira*
ECUADOR 2025 SE 01-04

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2023, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores, y en 2024 la tendencia se mantiene. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados.


Casos de A270-A279 Leptospirrosis por Semana Epidemiológica SE 01-04. Ecuador 2025




Casos de A270-A279 Leptospirrosis por Provincia SE01- 04 Ecuador 2025

Prov.Domic	SE 01-03	SE 04	Total
GUAYAS	12	5	17
NAPO	11	4	15
MANABI	1	2	3
ZAMORA CHINCHIPE	1	1	2
MORONA SANTIAGO	2		2
LOJA	1	1	2
SUCUMBIOS	1		1
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		1	1
SANTA ELENA	1		1
PICHINCHA		1	1
LOS RIOS	1		1
ESMERALDAS	1		1
CAÑAR		1	1
Total	32	16	48

Casos de A270-A279 Leptospirrosis, por Provincia SE 01-04 Ecuador 2025



Caso de A270-A279 Leptospirrosis, por grupos de edad y sexo SE 01-04 Ecuador 2025



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2025 SE 01-04


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, se cuenta con ocho casos; la provincia con mas casos es Guayas


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 01-04. Ecuador 2025



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-04. Ecuador 2025


Prov.Domic	SE 01-03	SE 04	Total
GUAYAS	4	3	7
ESMERALDAS	1	0	1
Total	5	3	8

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-04 Ecuador 2025



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados


Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo SE 01-04 Ecuador 2025



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
 Bibliografía
 1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2025 SE 01-04


Aualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificó un caso de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2025, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2024, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.




Casos de Mordedura de animales subseptibles a Rabia por Provincia SE 01-04. Ecuador 2025

Prov.Domic	SE 01-03	SE 04	Total
PICHINCHA	195	116	311
GUAYAS	136	52	188
MANABI	111	37	148
TUNGURAHUA	69	22	91
AZUAY	64	20	84
COTOPAXI	44	10	54
LOS RIOS	33	15	48
SANTO DOMINGO DE LOS TSAC..	27	13	40
BOLIVAR	26	12	38
LOJA	24	13	37
MORONA SANTIAGO	22	8	30
CHIMBORAZO	25	4	29
CAÑAR	20	8	28
ESMERALDAS	19	8	27
SUCUMBIOS	16	9	25
SANTA ELENA	18	7	25
IMBABURA	15	8	23
CARCHI	19	3	22
NAPO	16	5	21
ZAMORA CHINCHIPE	9	7	16
PASTAZA	2	13	15
ORELLANA	9	2	11
EL ORO	9	2	11
Total	928	394	1.322

Casos de Mordedura de animales subseptibles a Rabia por Provincia SE 01-04. Ecuador 2025



Caso de Mordedura de animales subseptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 01-04. Ecuador 2025



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsisema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005